Juillet 2013
Guide des produits nutritionnels pour enfants

Vous l'aiderez à réaliser ses rêves.
Nous l'aiderons à bien grandir.

NOURRIR CHAQUE ÉTAPE DE LA VIE

Abbott
A Promise for Life*

*Une promesse pour la vie

GUIDE DES PRODUITS NUTRITIONNELS POUR ENFANTS D'ABBOTT NUTRITION

BIENVENUE À ABBOTT NUTRITION – PRODUITS NUTRITIONNELS POUR ENFANTS

Ce guide vise à vous donner les renseignements nutritionnels les plus exacts sur les produits pour nourrissons et pour enfants (et certains produits pour adultes) d'Abbott Nutrition. Il est conçu pour vous aider à donner à vos patients les meilleurs soins possible, en vous aidant à choisir les produits qui leur conviennent. Une version électronique du guide mise à jour périodiquement est publiée au **www.AbbottNutrition.ca**.

Veuillez consulter l'étiquette du produit pour obtenir l'information la plus à jour. Bien que tous les efforts soient déployés pour assurer que les renseignements sur les produits sont corrects au moment de leur publication, les valeurs et autres indications sont sujettes à des changements.

COMMANDES

Pour commander des produits nutritionnels d'Abbott Nutrition, appelez au **1-800-567-2226**.

QUESTIONS OU COMMENTAIRES

Les professionnels de la santé peuvent communiquer avec Communications Abbott Nutrition pour parler à un membre de l'équipe de spécialistes en nutrition qui pourra répondre à leurs questions sur les produits.

Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h, heure normale de l'Est. Par téléphone au **1-866-767-7411** (option 1) ou par courriel à **canada.nutrition@abbott.com**

Merci d'avoir choisi Abbott Nutrition, un chef de file mondial dans le domaine des produits nutritionnels pour les nourrissons, les enfants et les adultes.

TABLE DES MATIÈRES

INFORMATION MÉDICALE

Produits du système d'alimentation pour hôpitaux (SAH) 6

Indications d'emploi 8

Mode d'emploi et tableaux de dilution des préparations pour nourrissons 12

Allergènes 13

Lignes directrices recommandées pour la conservation des produits nutritionnels d'Abbott Nutrition 14

Temps de suspension des produits nutritionnels pour nourrissons et enfants d'Abbott Nutrition 15

Dates de péremption 15

Mises en garde 15

Au sujet des GOS et de la lutéine 45

Au sujet des FOScc 83

Table posologique 95

PRODUITS

Femmes enceintes ou qui allaitent

Similac® Mom 20

Préparations pour nourrissons prématurés

Similac® Advance® Neosure® 26

Similac® Advance® Neosure® (SAH) 28

Similac® Special Care® 20 (faible teneur en fer) (SAH) 30

Similac® Special Care® 20 (avec fer) (SAH) 32

Similac® Special Care® 24 (faible teneur en fer) (SAH) 34

Similac® Special Care® 24 (avec fer) (SAH) 36

Supplément au lait humain Similac® (SAH) 38

Supplément au lait maternel - Composition nutritionnelle du lait maternel 40

Supplément au lait maternel - Manipulation du lait maternel 41

Préparations pour nourrissons nés à terme

Similac® Advance® avec oméga-3 et oméga-6 46

Similac® Advance® avec oméga-3 et oméga-6 (SAH) 48

Similac® Go & Grow® avec oméga-3 et oméga-6† 50

Similac® Go & Grow®† 52

Similac® avec fer 54

Similac® plus faible en fer 56

Similac® pour bébés sensibles au lactose 58

Similac® pour bébés sensibles au lactose (SAH) 60

† Les préparations de 2e étape peuvent être données aux nourrissons à partir de l'âge de 6 mois.
Comprend aussi certains produits pour adultes.

Suite à la page suivante

TABLE DES MATIÈRES

Préparations pour nourrissons nés à terme (suite)

Similac® Isomil® avec oméga-3 et oméga-6 62
Similac® Isomil® avec oméga-3 et oméga-6 (SAH) 64
Similac® Isomil® 66
Similac® Isomil® (2e Étape)† 68
Similac® PM 60/40 (SAH) 70
Similac® 24 avec fer (SAH) 72
Similac® 27 avec fer (SAH) 74
Alimentum® 76
Alimentum® Advance® avec oméga-3 et oméga-6 (SAH) 78

Préparations pour tout-petits et enfants

PediaSure® 84
PediaSure® Fibre 86
PediaSure® Plus (avec fibres) 88
PediaSure Complete® 90

Produits spécialisés

Pedialyte® et bâtons glacés Pedialyte® 96
Pedialyte® (SAH) 98
Polycose® 100
Eau glucosée à 5 % Similac® (SAH) 102
Eau stérilisée Similac® (SAH) 103

Accessoires

Tétines 107
Biberon et bouchon de plastique 108
Biberon Volu-Feed® et bouchon distributeur Volu-Feed® 109

Système d'alimentation entérale

Dispositifs pour l'alimentation par gravité 113
Pompes et dispositifs pour l'alimentation 114
Contenants pour l'alimentation entérale 116
Sondes pour l'alimentation entérale et raccords Flexiflo® 117

† Les préparations de 2e étape peuvent être données aux nourrissons à partir de l'âge de 6 mois. Comprend aussi certains produits pour adultes.

SYSTÈME D'ALIMENTATION POUR HÔPITAUX (SAH) D'ABBOTT NUTRITION

Abbott Nutrition propose une vaste gamme de produits de haute qualité pour hôpitaux, composée notamment d'une variété de préparations pour nourrissons, de produits spécialisés et de divers accessoires.

RÉSERVÉ AUX HÔPITAUX ET AUTRES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ.

CARACTÉRISTIQUES

- **Prêt à servir :** Préparations et produits spécialisés offerts dans des bouteilles jetables prêtes à utiliser.
- **Commodité :** Élimine le lavage des biberons, ainsi que le besoin de mélanger, de stériliser, de réfrigérer et de chauffer les préparations.
- **Innocuité :** Contrôle de la qualité exceptionnel – plus de 2 000 vérifications relatives à la qualité sont effectuées sur chaque lot.
- **Graduation du volume** (approximatif) en **mL.**
- **Agencement des couleurs :** Cet agencement pour les étiquettes des biberons, les plateaux intérieurs et les emballages d'expédition permettent une identification rapide et précise des produits.
- **Économies :** Réduit les besoins en travail, en espace et en équipement.

PRÉSENTATION

Voir la liste des produits.

Préparations pour nourrissons prématurés

Similac® Advance® Neosure®
N° 59649-871
(page 28)

Similac® Special Care® 20 (faible teneur en fer)
N° 0E392-806
(page 30)

Similac® Special Care® 20 (avec fer)
N° 0G815-806
(page 32)

Similac® Special Care® 24 (faible teneur en fer)
N° 0E393-806
(page 34)

Similac® Special Care® 24 (avec fer)
N° 00478-806
(page 36)

Supplément au lait humain Similac®
N° 54598-934
(page 38)

Préparations pour nourrissons nés à terme

Similac® Advance® avec oméga-3 et oméga-6
N° 0S177-A28
(page 48)

Similac® pour bébés sensibles au lactose
N° 0L239-806
(page 60)

Suite à la page suivante

Préparations pour nourrissons nés à terme (suite)

Similac® Isomil® avec oméga-3 et oméga-6
N° 0P744-806
(page 64)

Similac® PM 60/40
N° 0M476-806
(page 70)

Similac® 24 avec fer
N° 00403-748
(page 72)

Similac® 27 avec fer
N° 0G817-748
(page 74)

Alimentum® Advance® avec oméga-3 et oméga-6
N° 59738-871
(page 78)

Produits spécialisés

Pedialyte®
N° 50851-871
(page 98)

Eau glucosée à 5 % Similac®
N° 51002-871
(page 102)

Eau stérilisée Similac®
N° 51000-871
(page 103)

Accessoires

Tétine et bague pour nourrissons Similac® Infant
N° 00079-125
(page 107)

Tétine orthodontique et bague Similac® Orthodontic
N° 50512-125
(page 107)

Tétine pour prématurés et bague Similac® Premature
N° 00094-125
(page 107)

Tétine à débit lent et bague Similac® Slow Flow
N° 53894-125
(page 107)

Biberon de plastique
N° 00875-114
(page 108)

Bouchon de plastique
N° 54080-125
(page 108)

Biberon Volu-Feed®
N° 00180-099
(page 109)

Bouchon distributeur Volu-Feed®
N° 00081-125
(page 109)

INDICATIONS D'EMPLOI

Les indications d'emploi suggérées ne remplacent pas le jugement clinique du professionnel de la santé qui connaît les antécédents médicaux complets du patient.

Veuillez noter que cette liste ne contient pas tous les produits ni toutes les indications d'emploi possibles et que les produits de chacune des catégories ne sont pas présentés par ordre de préférence.

Allergies et sensibilités aux protéines du lait

Alimentum® 76
Alimentum® Advance®
avec oméga-3 et oméga-6 (SAH) 78

Lorsque la tolérance au soya a été établie :

Similac® Isomil® avec oméga-3 et oméga-6 62
Similac® Isomil® avec oméga-3 et oméga-6 (SAH) 64
Similac® Isomil® 66
Similac® Isomil® (2e Étape) 68

Solution de rechange et supplément au lait maternel

Similac® Advance® Neosure® 26
Similac® Advance® Neosure® (SAH) 28
Similac® Advance® avec oméga-3 et oméga-6 46
Similac® Advance® avec oméga-3 et oméga-6 (SAH) 48
Similac® avec fer 54
Similac® plus faible en fer 56
Similac® pour bébés sensibles au lactose 58
Similac® pour bébés sensibles au lactose (SAH) 60
Similac® Isomil® avec oméga-3 et oméga-6 62
Similac® Isomil® avec oméga-3 et oméga-6 (SAH) 64
Similac® Isomil® 66
Alimentum® 76
Alimentum® Advance®
avec oméga-3 et oméga-6 (SAH) 78

Supplément au lait maternel

Supplément au lait humain Similac® (SAH) 38

Brûlures (enfants de 1 à 10 ans)

PediaSure® 84
PediaSure® Fibre 86
PediaSure® Plus (avec fibres) 88

Maladie cœliaque

Tous les produits nutritionnels pour enfants d'Abbott Nutrition sont sans gluten, à l'exception de PediaSure® Plus (avec fibres).

Symptômes de coliques (causés par une sensibilité aux protéines du lait de vache)

Alimentum® 76
Alimentum® Advance®
avec oméga-3 et oméga-6 (SAH) 78

Colite

Alimentum® 76
Alimentum® Advance®
avec oméga-3 et oméga-6 (SAH) 78

Réhydratation par voie orale

Pedialyte® et bâtons glacés Pedialyte® 96
Pedialyte® (SAH) 98

Suite à la page suivante

INDICATIONS D'EMPLOI

Diarrhée

Similac® pour bébés sensibles au lactose 58
Similac® pour bébés sensibles au lactose (SAH) 60
Similac® Isomil® avec oméga-3 et oméga-6 62
Similac® Isomil® avec oméga-3 et oméga-6 (SAH) 64
Similac® Isomil® 66
Similac® Isomil® (2e Étape) 68
Alimentum® 76
Alimentum® Advance®
avec oméga-3 et oméga-6 (SAH) 78
Pedialyte® 96
Pedialyte® (SAH) 98

Retard de croissance

PediaSure® 84
PediaSure® Fibre 86
PediaSure® Plus (avec fibres) 88

Antécédents familiaux d'allergies

Alimentum® 76
Alimentum® Advance®
avec oméga-3 et oméga-6 (SAH) 78

Intolérance et malabsorption des lipides

Alimentum® 76
Alimentum® Advance®
avec oméga-3 et oméga-6 (SAH) 78

Irritabilité, gaz et régurgitations

Similac® pour bébés sensibles au lactose 58
Similac® pour bébés sensibles au lactose (SAH) 60
Similac® Isomil® avec oméga-3 et oméga-6 62
Similac® Isomil® avec oméga-3 et oméga-6 (SAH) 64
Similac® Isomil® 66
Similac® Isomil® (2e Étape) 68
Alimentum® 76
Alimentum® Advance®
avec oméga-3 et oméga-6 (SAH) 78

Galactosémie

Similac® Isomil® avec oméga-3 et oméga-6 62
Similac® Isomil® avec oméga-3 et oméga-6 (SAH) 64
Similac® Isomil® 66
Similac® Isomil® (2e Étape) 68

Les préparations en poudre sont les présentations de choix pour les nourrissons atteints de galactosémie.

Hypercalcémie

Similac® PM 60/40 (SAH) 70

Hypoallergène

Alimentum® 76
Alimentum® Advance®
avec oméga-3 et oméga-6 (SAH) 78

Erreurs innées du métabolisme

Similac® Isomil® avec oméga-3 et oméga-6 62
Similac® Isomil® avec oméga-3 et oméga-6 (SAH) 64
Similac® Isomil® 66
Similac® Isomil® (2e Étape) 68

Suite à la page suivante

INDICATIONS D'EMPLOI

Cascher
Les produits nutritionnels pour enfant d'Abbott Nutrition qui sont certifiés cascher portent, le cas échéant, sur l'étiquette du produit ou dans la liste des ingrédients l'une des mentions suivantes : (Ⓤ-D) ou MKD pour les produits cascher à base de lait, MK pour les produits cascher et Ⓤ Pareve pour les produits pareve. Cette information apparaît également dans la section DONNÉES TECHNIQUES pour chaque produit dans le présent guide.

Intolérance et sensibilité au lactose
Tous les produits d'Abbott Nutrition, à l'exception de Similac® Isomil® et des produits spécialisés contiennent une certaine quantité de protéines de lait. Grâce à l'amélioration des méthodes de dosage, il est maintenant possible de déceler de faibles taux de lactose dans les produits.

La plupart des personnes intolérantes au lactose peuvent tolérer une certaine quantité de lactose dans leur alimentation. Une revue de la littérature médicale et scientifique[1,2] suggère que la plupart des personnes intolérantes au lactose pourraient tolérer **jusqu'à 6 g** de lactose par portion.

Mis à part les produits comme Similac®, qui contiennent du lactose comme source de glucides, les produits nutritionnels d'Abbott Nutrition contiennent moins de 500 mg de lactose par portion et par conséquent **conviennent à la plupart des personnes intolérantes au lactose**. Cependant, de tels produits ne conviennent pas aux personnes atteintes de galactosémie. La mention « Non recommandé en cas de galactosémie » figurera clairement sur l'étiquette.

On peut obtenir des renseignements supplémentaires sur les produits d'Abbott Nutrition en communiquant avec l'équipe de diététistes d'Abbott Nutrition au **1-866-767-7411,** option 1.

Similac® pour bébés sensibles au lactose 58
Similac® pour bébés sensibles au lactose (SAH) 60
Similac® Isomil® avec oméga-3 et oméga-6 62
Similac® Isomil® avec oméga-3 et oméga-6 (SAH) 64
Similac® Isomil® 66
Similac® Isomil® (2e Étape) 68
Alimentum® 76
Alimentum® Advance®
avec oméga-3 et oméga-6 (SAH) 78
PediaSure® 84
PediaSure® Fibre 86
PediaSure® Plus (avec fibres) 88
PediaSure Complete® 90

Difficultés d'alimentation (c.-à-d. enfants difficiles à l'égard de la nourriture)

PediaSure Complete® 90

Soins postopératoires (enfants de 1 à 10 ans)

PediaSure® 84
PediaSure® Fibre 86
PediaSure® Plus (avec fibres) 88

RÉFÉRENCES :
1. Suarez F. *Abbott Nutrition Medical assessment of lactose tolerance in the lactose maldigesters population.* Avril 2007.
2. Hertzler SR, Huynh BC, Savaiano DA: How much lactose is low lactose? *J Am Diet Assoc* 1996; 96:243-6.

Suite à la page suivante

INDICATIONS D'EMPLOI

Nourrissons prématurés ou de faible poids à la naissance

Similac® Advance® Neosure® 26
Similac® Advance® Neosure® (SAH) 28
Similac® Special Care® 20 (faible teneur en fer) (SAH) 30
Similac® Special Care® 20 (avec fer) (SAH) 32
Similac® Special Care® 24 (faible teneur en fer) (SAH) 34
Similac® Special Care® 24 (avec fer) (SAH) 36
Supplément au lait humain Similac® 38

Maldigestion des protéines

Alimentum® 76
Alimentum® Advance® avec oméga-3 et oméga-6 (SAH) 78

Troubles de la fonction rénale

Similac® PM 60/40 (SAH) 70

Préparations à base de protéines de soya

Similac® Isomil® avec oméga-3 et oméga-6 62
Similac® Isomil® avec oméga-3 et oméga-6 (SAH) 64
Similac® Isomil® 66
Similac® Isomil® (2e Étape) 68

Tout-petits et enfants

Similac® Go & Grow® avec oméga-3 et oméga-6 50
Similac® Go & Grow® 52
Similac® Isomil® (2e Étape) 68
PediaSure® 84
PediaSure® Fibre 86
PediaSure® Plus (avec fibres) 88
PediaSure Complete® 90
Pedialyte® 96

MODE D'EMPLOI ET TABLEAUX DE DILUTION DES PRÉPARATIONS POUR NOURRISSONS

RÉSERVÉ À L'USAGE EXCLUSIF DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

Les préparations hypocaloriques et hypercaloriques doivent être utilisées sous la supervision d'un médecin.

- Il faut tenir compte des modifications (diminution et augmentation) des quantités de minéraux et de vitamines. Une surveillance étroite peut être requise.
- Il est possible qu'une préparation à 27 Cal/30 mL ou plus ne fournisse pas suffisamment d'eau chez certains nourrissons. Il convient donc de surveiller l'hydratation du bébé et de lui administrer de l'eau provenant d'une autre source au besoin.
- La tolérance gastro-intestinale des préparations hypo- et hypercaloriques peut différer des préparations à dilution normale. Une surveillance étroite peut être requise.
- Afin d'améliorer la tolérance des bébés à la préparation, il est préférable d'accroître lentement la densité calorique, par paliers de 2 à 4 Cal/30 mL.

Prêt à servir (boîtes et bouteilles du SAH)

- Ne pas diluer.

Liquide concentré (40 Cal/30 mL)

Pour obtenir une dilution standard (20 Cal/30 mL), ajouter une partie de liquide concentré à une partie d'eau. Voir le mode d'emploi détaillé au verso de l'étiquette.

Densité calorique[1] (Cal/30 mL)	**Liquide concentré** (mL)	+	**Eau** (mL)	=	**Volume final** (mL)
20	30		30		60
24	90		60		150
27	60		30		90

Poudre

Pour obtenir la dilution normale (20 Cal/30 mL), ajouter une mesurette rase de poudre non tassée pour 60 mL d'eau chaude. Voir le mode d'emploi détaillé au verso de l'étiquette.

Densité calorique[1] (Cal/30 mL)	**Mesurette(s)**† **rase(s) et non tassée(s)**	+	**Eau** (mL)	=	**Volume approximatif obtenu**‡ (mL)
20	1		60		60
24	3		150		180
27	3		130		150

Quantités par mesurette et volumes de déplacement pour les préparations pour enfants en poudre

Produit	**Grammes de poudre par mesurette**	**Par mesurette**‡ (mL)	**Par gramme de poudre**‡ (mL)
Préparations pour nourrissons prématurés			
Similac® Advance® Neosure®	9,6	7,3	0,76
Supplément au lait humain Similac®	S. O.	S. O.	0,69§
Préparations pour nourrissons nés à terme			
Similac® Advance® avec oméga-3 et oméga-6	8,8	6,8	0,77
Similac® avec fer	8,8	6,8	0,77
Similac® plus faible en fer	8,8	6,8	0,77
Similac® pour bébés sensibles au lactose	8,6	6,7	0,78
Similac® Go & Grow® avec oméga-3 et oméga-6	8,8	6,8	0,77
Similac® Go & Grow®	8,8	6,8	0,77
Similac® Isomil®	8,7	6,7	0,77
Similac® Isomil® avec oméga-3 et oméga-6	8,9	6,8	0,76
Similac® Isomil® (2e Étape)	8,7	6,7	0,77
Produits spécialisés			
Polycose®	S. O.	S. O.	0,63

† N'utiliser que la mesurette fournie dans la boîte.

‡ Les valeurs sont approximatives.

§ Par sachet de 0,9 g.

RÉFÉRENCE :

1. D'après Young T, Mangum B. Dilution Tables Neofax 17e éd. Raleigh NC 2004:232.

ALLERGÈNES

Abbott Nutrition reconnaît l'importance des renseignements sur les produits pour vous et vos patients, particulièrement en cas d'allergies et d'intolérances. Les allergènes alimentaires prioritaires et les ingrédients associés à des intolérances et (ou) à des sensibilités alimentaires sont dorénavant énumérés à la suite de la liste des ingrédients de chaque produit d'Abbott Nutrition dans ce guide.

Les aliments suivants ou les protéines qui en sont dérivées sont considérés comme des **allergènes alimentaires prioritaires** au Canada :

- Arachides
- Œufs
- Lait
- Noix
- Blé
- Soya
- Graines de sésame
- Fruits de mer (poisson, crustacés et mollusques)
- Sulfites

Les ingrédients suivants peuvent être associés **à des intolérances et (ou) à des sensibilités alimentaires :**

- Autres composants du soya (composants autres que les protéines, y compris l'huile de soya, la lécithine de soya et les fibres de soya)
- Maïs (sous la forme de maltodextrine, de dextrose, de sirop de maïs, de fécule de maïs et d'huile de maïs)
- Gluten
- Colorants
- Arômes (naturels et artificiels)
- Acide citrique
- Huile de copra
- Lactose

Les renseignements contenus dans ce guide étaient exacts au moment de la publication. Veuillez consulter l'étiquette du produit pour obtenir les renseignements les plus à jour.

Pour des renseignements supplémentaires sur les ingrédients contenus dans les produits, qui sont associés à des allergies ou à des intolérances alimentaires, veuillez communiquer avec notre équipe de spécialistes en nutrition :

Communications Abbott Nutrition
1-866-767-7411, option 1
canada.nutrition@abbott.com

RÉFÉRENCE :
Santé Canada. Allergies alimentaires (www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/allerg/fa-aa/index-fra.php).

LIGNES DIRECTRICES RECOMMANDÉES POUR LA CONSERVATION DES PRODUITS NUTRITIONNELS D'ABBOTT NUTRITION

TEMPÉRATURES D'ENTREPOSAGE RECOMMANDÉES POUR LES PRODUITS NON OUVERTS



Prêt à servir (boîtes et bouteilles du SAH) et liquide concentré

- Température idéale† : **entre 13 et 24 °C.**
- Température acceptable : entre 0 et 35 °C.
- **Ne pas congeler** – la congélation peut rendre les liquides inutilisables.

Une exposition prolongée à des températures inférieures à 0 °C ou à une chaleur directe supérieure à 35 °C risque d'affecter la consistance du produit et, par conséquent, pourrait en altérer l'apparence, la saveur et d'autres qualités organoleptiques. Le produit est stérile et devrait conserver ses qualités nutritionnelles.

Poudre

- Conserver dans un endroit sec et frais.
- Ne pas réfrigérer.

LIGNES DIRECTRICES POUR LA PRÉPARATION ET LA CONSERVATION

Prêt à servir (boîtes et bouteilles du SAH)

Une fois la boîte ou la bouteille ouverte, la couvrir, la conserver au réfrigérateur et en utiliser le contenu dans les 48 heures.

Liquide concentré

- Une fois la boîte ouverte, la couvrir, la conserver au réfrigérateur et en utiliser le contenu dans les 48 heures.
- Reconstituer selon les instructions sur l'étiquette.
- Verser dans des biberons ou des tasses, les recouvrir et les conserver au réfrigérateur.
- Utiliser la préparation reconstituée dans les 48 heures.

Poudre

- Reconstituer selon les instructions sur l'étiquette.
- Verser dans des biberons ou des tasses, les recouvrir et les conserver au réfrigérateur.
- Utiliser dans les 24 heures.
- Une fois la boîte ouverte, la recouvrir après chaque utilisation.
- **Utiliser le produit dans le mois qui suit l'ouverture de la boîte.**

Si la préparation prête à servir, non diluée ou reconstituée est laissée à la **température ambiante,** il faut **l'utiliser dans les 2 heures**[1,2].

Si le produit est consommé **directement à partir de la bouteille** (SAH ou plastique) ou **avec une paille**‡ :

Préparations pour nourrissons

- Jeter toute quantité de préparation laissée plus d'**une heure** dans le biberon suivant le contact de la bouche du bébé avec la tétine.
- Ne pas réutiliser un biberon prérempli.

Suite à la page suivante

LIGNES DIRECTRICES RECOMMANDÉES POUR LA CONSERVATION DES PRODUITS NUTRITIONNELS D'ABBOTT NUTRITION

LIGNES DIRECTRICES POUR LA PRÉPARATION ET LA CONSERVATION (suite)

Produits PediaSure® et Similac® Mom (produit nutritionnel pour adultes)

- Utiliser ou réfrigérer dans l'heure qui suit l'ouverture de la bouteille.
- Utiliser le produit réfrigéré dans les 24 heures suivantes.

TEMPS DE SUSPENSION DES PRODUITS NUTRITIONNELS POUR NOURRISSONS ET ENFANTS D'ABBOTT NUTRITION

Prêt à servir (forme commerciale stérile)

- De 4 à 8 heures lorsque le produit est soigneusement versé de la bouteille ou de la boîte d'origine dans le dispositif d'alimentation entérale‡.

Produits reconstitués

Comprend : les préparations en liquide concentré ou en poudre ou toute autre préparation à laquelle un composant modulaire (p. ex., Polycose®) a été ajouté, ou le lait maternel auquel on a ajouté le Supplément au lait humain Similac®.

- Préparer selon une technique aseptique.
- Ne pas suspendre pendant plus de 4 heures.

Chaque établissement de soins de santé est responsable de mettre de l'avant ou de suivre des techniques sûres de préparation et d'utilisation de l'alimentation par sonde et de mettre en œuvre des protocoles d'assurance de la qualité visant à contrôler ces techniques.

DATES DE PÉREMPTION

- Pour une qualité optimale, utiliser la préparation avant la date de péremption indiquée sur le produit.
- Il est impossible de garantir la teneur en vitamines indiquée sur l'étiquette et l'excellence de la consistance des produits au-delà de la date de péremption (Utiliser avant le) puisque ces deux paramètres peuvent se dégrader avec le temps.

MISES EN GARDE

- **Ne jamais utiliser de four à micro-ondes pour chauffer une préparation,** car il y a risque de brûlures graves.
- Les produits nutritionnels d'Abbott Nutrition ne sont pas conçus pour une administration par voie parentérale.

† Pour assurer la qualité optimale des produits.

‡ Cette pratique expose le produit à des quantités importantes de bactéries.

RÉFÉRENCES :
1. Agence canadienne d'inspection des aliments (www.inspection.gc.ca) : Entreposage sans risque des aliments (P0234E-01). Septembre 2001. **2.** Santé Canada (www.hc-sc.gc.ca). Décembre 2007. American Dietetic Association: Infant Feedings: Guidelines for Preparation of Formula and Breastmilk in Health Care Facilities. Chicago: American Dietetic Association, 2004. Campbell SM: Preventing Microbial Contamination of Enteral Formulas and Delivery Systems. Columbus, Ohio: Ross Products Division, Abbott Laboratories, 2003. Lemons PK: Breast milk and the hospitalized infant: Guideline for practice. Neonatal Network 2001;20(7):47-52.

NOTES :

FEMMES ENCEINTES OU QUI ALLAITENT

DANS CETTE SECTION

Similac® Mom 20

FEMMES ENCEINTES OU QUI ALLAITENT

LE LAIT MATERNEL EST L'ALIMENT IDÉAL POUR LES BÉBÉS[1]

ABBOTT NUTRITION VOTRE PARTENAIRE EN NUTRITION[MC]

Le lait maternel est l'aliment idéal pour les bébés[1].

La Société canadienne de pédiatrie recommande l'allaitement exclusif pendant les 6 premiers mois de vie des nourrissons nés à terme et en santé. Le lait maternel est l'aliment qui convient le mieux aux nourrissons. L'allaitement peut se poursuivre jusqu'à 2 ans, voire au-delà.

Les préparations pour nourrissons d'Abbott Nutrition sont conçues pour les mères qui décident de ne pas allaiter ou qui cessent d'allaiter ou lorsqu'un supplément au lait maternel est nécessaire.

Outre la gamme complète de produits nutritionnels pour enfants que vous trouverez dans ce guide, Abbott Nutrition propose une gamme complète de produits nutritionnels pour adultes.

Nous désirons attirer votre attention sur notre plus récent produit nutritionnel pour adultes, **Similac® Mom,** conçu pour aider les femmes enceintes ou qui allaitent à satisfaire leurs besoins nutritionnels.

Pour de plus amples renseignements sur la gamme complète des produits nutritionnels pour adultes d'Abbott Nutrition, visitez notre site Web au **www.AbbottNutrition.ca** ou appelez au **1-866-767-7411,** option 1, pour parler à l'une de nos diététistes.

RÉFÉRENCE :
1. Société canadienne de pédiatrie, Les diététistes du Canada et Santé Canada. *La nutrition du nourrisson né à terme et en santé*. Ministre des Approvisionnements et Services Canada, Ottawa, 2005.

SIMILAC® MOM

ALIMENTATION COMPLÈTE ET ÉQUILIBRÉE

Pour les femmes enceintes ou qui allaitent

INDICATIONS D'EMPLOI

- Pour les femmes enceintes ou qui allaitent qui pourraient retirer des bienfaits d'une collation nutritive.
- Pour les femmes enceintes ou qui allaitent qui ont des besoins énergétiques accrus.
- Pour les femmes enceintes ou qui allaitent qui ont besoin d'un apport accru en protéines, en vitamines et en minéraux.
- Pour l'alimentation par voie orale seulement (non destiné à l'alimentation par sonde).
- À utiliser dans le cadre d'une saine alimentation et selon les recommandations du médecin pour ce qui est des suppléments de vitamines prénatales.
- Peut être utilisé comme collation, supplément aux repas ou, si pris en quantité suffisante, comme substitut de repas.

Mises en garde :

- Non indiqué pour administration par voie parentérale.
- Non indiqué chez les personnes atteintes de galactosémie.
- Non indiqué chez les nourrissons ou les enfants.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Procure 26 vitamines et minéraux essentiels.
- Contient 1 166 UI de vitamine A par bouteille.
- Contient 12 g de protéines par portion de 235 mL.
- Alimentation complète et équilibrée.
- Contient du calcium, de la vitamine D, du fer, de l'acide folique et d'autres vitamines et minéraux essentiels.
- Source pratique de protéines et d'énergie pour aider à satisfaire les besoins accrus des femmes enceintes ou qui allaitent.
- Bouteille refermable pratique.
- Deux délicieuses saveurs : vanille et chocolat.

DONNÉES TECHNIQUES

	Prêt à servir Bouteille
Densité calorique (Cal/mL)	0,96
Protéines (% de l'énergie totale)	21
Lipides (% de l'énergie totale)	24
Glucides (% de l'énergie totale)	55
Rapport Cal totales:g d'azote	122:1
Rapport Cal non protéiques:g d'azote	96:1
Eau (g/L)	837
Osmolalité (mOsm/kg d'eau)	546
Charge osmotique rénale (mOsm/L)	417
Viscosité à la température ambiante/lorsque refroidi	Clair/clair
Diamètre minimal de la sonde pour l'alimentation par gravité/pompe (Fr)	S. O.
Hyporésiduel	Oui
Sans gluten	Oui
Cascher	Oui
Halal	Oui

PRÉSENTATION

Prêt à servir

56583-848	Similac® Mom, vanille	Bouteilles de 235 mL	4 emballages de 6/carton
56584-848	Similac® Mom, chocolat	Bouteilles de 235 mL	4 emballages de 6/carton

ÉNERGIE

	Par 235 mL	Par 100 mL
ÉNERGIE (Cal [kJ])	225 (945)	96 (402)
PROTÉINES (g)	12,0	5,02
% de l'énergie totale	21	
Arginine (mg)	-	-
Taurine (mg)	-	-
Carnitine (mg)	-	-
Source	Caséinates de sodium et de calcium, isolat de protéines de soya	
LIPIDES (g)	6,0	2,55
% de l'énergie totale	24	
Acides gras polyinsaturés (g)	1,2	0,5
Acide linoléique (g)	1,0	0,43
Acide arachidonique (ARA) (g)	-	-
Acide linolénique (g)	0,18	0,08
Acide docosahexanoïque (DHA) (g)	-	-
Rapport oméga-6:oméga-3	7,4:1	
Acides gras monoinsaturés (g)	2,3	1,0
Acides gras saturés (g)	0,5	0,2
Cholestérol (mg)	1,4	0,6
Source	Huile de carthame riche en acide oléique, huile de canola, huile de maïs, lécithine de soya	
Huile de TCM (% des lipides totaux)	0	
GLUCIDES (g)	31,0	13,2
% de l'énergie totale	55	
Fibres alimentaires (g)	-	-
Fructooligosaccharides à chaîne courte (FOScc) (g)	-	-
Galactooligosaccharides (GOS) (g)	-	-
Source	Saccharose, maltodextrine de maïs	
Acésulfame-potassium (mg)	-	-
Sucralose (mg)	-	-

VITAMINES

Vitamine A (ER [UI])	350 (1166)	149 (496)
Vitamine D_3 (mcg [UI])	1,25 (50)	0,53 (21,3)
Vitamine E (UI)	3,38	1,45
Vitamine K_1 (mg)	-	-
Vitamine C (mg)	15,0	6,4
Thiamine (mg)	0,325	0,138
Riboflavine (mg)	0,432	0,184
Niacine (mg)	6,00	2,55
Vitamine B_6 (mg)	0,47	0,20
Acide folique (mg)	0,060	0,026
Vitamine B_{12} (mg)	0,00050	0,00021
Acide pantothénique (mg)	1,75	0,74
Biotine (mg)	0,035	0,0149
Choline (mg)	-	-

MINÉRAUX

Sodium (mg [mmol])	290 (12,6)	123 (5,3)
Potassium (mg [mmol])	428 (11,0)	182 (4,7)
Chlorure (mg [mmol])	251 (7,1)	107 (3,0)
Calcium (mg)	275	117
Phosphore (mg)	275	117
Magnésium (mg)	65	27,7
Fer (mg)	3,50	1,49
Zinc (mg)	4,00	1,70
Iodide (mg)	0,040	0,017
Cuivre (mg)	0,50	0,21
Manganèse (mg)	1,30	0,55
Sélénium (mg)	0,012	0,0051
Chrome (mg)	0,010	0,0043
Molybdène (mg)	0,028	0,0119

Information nutritionnelle pour Similac® Mom, vanille, bouteille de 235 mL.

COMPOSITION

Similac® Mom, vanille :
Eau, sucre, caséinates de sodium et de calcium, maltodextrine de maïs, huile de carthame riche en acide oléique, huile de canola, isolat de protéines de soya, huile de maïs, citrate de potassium, citrate de sodium, phosphate calcique, phosphate de magnésium, arômes naturel et artificiel, chlorure de magnésium, sel, lécithine de soya, phosphate de potassium, carraghénine, acide ascorbique, sulfate de zinc, sulfate ferreux, nicotinamide, acétate de *dl*-α-tocophéryle, sulfate de manganèse, sulfate de cuivre, pantothénate de calcium, palmitate de vitamine A, chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate de chlorure de thiamine, riboflavine, acide folique, iodure de potassium, molybdate de sodium, biotine, sélénate de sodium, chlorure de chrome, vitamine D_3, cyanocobalamine.
CONTIENT : Allergènes alimentaires prioritaires : Lait, soya. **Ingrédients associés à des intolérances et (ou) à des sensibilités alimentaires :** Maïs, huile de copra, arômes naturel et artificiel, lactose, autres composants du soya.

Ingrédients supplémentaires pour la saveur de chocolat : Poudre de cacao, colorant.

Les valeurs sont sujettes à changement. Pour connaître la liste la plus récente des ingrédients, des allergènes et l'information nutritionnelle, consulter l'étiquette ou l'emballage du produit.

SIMILAC® MOM
ALIMENTATION COMPLÈTE ET ÉQUILIBRÉE
Pour les femmes enceintes ou qui allaitent

NOTES :

PRÉPARATIONS POUR NOURRISSONS PRÉMATURÉS

DANS CETTE SECTION

Similac® Advance® Neosure® 26
Similac® Advance® Neosure® (SAH) 28
Similac® Special Care® 20 (faible teneur en fer) 30
Similac® Special Care® 20 (avec fer) 32
Similac® Special Care® 24 (faible teneur en fer) 34
Similac® Special Care® 24 (avec fer) 36

Suite à la page suivante

PRÉPARATIONS POUR NOURRISSONS PRÉMATURÉS

DANS CETTE SECTION (suite)

Supplément au lait humain Similac® 38

Supplément au lait maternel - Composition nutritionnelle du lait maternel 40

Supplément au lait maternel - Manipulation du lait maternel 41

PARCE QUE LA CROISSANCE, C'EST BIEN PLUS QUE SIMPLEMENT GRANDIR

LES NOURRISSONS PRÉMATURÉS CONTINUENT D'AVOIR DES BESOINS NUTRITIONNELS ACCRUS, MÊME APRÈS LEUR CONGÉ DE L'HÔPITAL[1]

Similac® Advance® Neosure® est spécialement conçu pour répondre aux besoins nutritionnels de ces nourrissons prématurés jusqu'à l'âge de 9 à 12 mois.

- 33 % plus de protéines que les préparations pour nourrissons nés à terme : les protéines semblent avoir l'influence la plus considérable sur le développement des fonctions neurologiques[2].
- 35 % plus de calcium* pour la croissance des os.
- 0,25 % de DHA†, un acide gras oméga-3 qui contribue au développement normal du cerveau et des yeux.

Bienfaits sur la croissance

- Augmentations supérieures du poids, de la taille et du périmètre crânien, comparativement aux préparations pour nourrissons nés à terme[1].
- Amélioration de la composition corporelle : masse corporelle maigre significativement plus élevée et masse grasse inférieure à 12 mois[3].

Une étude sur l'utilisation d'une préparation enrichie de nutriments chez les nourrissons prématurés après leur sortie de l'hôpital suggère qu'il y a eu un rattrapage du retard de croissance plus sain et également plus complet durant la première année de vie[4‡].

***** Comparativement à une préparation pour nourrissons nés à terme.

† En tant que pourcentage des acides gras totaux.

‡ Comparativement aux prématurés qui ont reçu une préparation pour nourrissons nés à terme.

RÉFÉRENCES :
1. Lucas A *et al.* Randomized Trial of Nutrient Enriched Formula Versus Standard Formula for Post-discharge Preterm Infants. *Pediatrics* 2001;108:703-11. **2.** Morgane PJ *et al.* Effects of prenatal protein malnutrition on the hippocampal formation. *Neuroscience Biobehav Rev* 2002;26:471-83. **3.** Groh-wargo S *et al.* Body Composition in Preterm Infants Who Are fed Long-Chain Polyunsaturated Fatty Acids: A Prospective, Randomized, Controlled Trial. *Pediatr Res* 2005;57:712-8. **4.** Cooke RJ *et al.* Adiposity Is Not Altered in Preterm Infants Fed With a Nutrient-Enriched Formula After Hospital Discharge. *Pediatr Res* 2010;67:660-4.

SIMILAC® ADVANCE® NEOSURE®

Préparation enrichie de DHA et d'ARA

Pour les nourrissons prématurés, de la naissance à 12 mois

INDICATIONS D'EMPLOI

- Pour les nourrissons prématurés qui ont des besoins nutritionnels accrus non comblés in utero.
- Pour les nourrissons prématurés qui obtiennent leur congé de l'hôpital.
- L'*American Academy of Pediatrics* et l'*American College of Obstetricians and Gynecologists* reconnaissent que « … les petits prématurés peuvent bénéficier de l'utilisation de ces préparations jusqu'à neuf mois après leur sortie de l'hôpital »[1].
- « Les nourrissons de 34 et de 35 semaines d'âge gestationnel peuvent profiter d'une préparation enrichie de protéines et de minéraux pour accélérer leur croissance »[2].

Mises en garde :

- Non indiqué pour administration par voie parentérale.
- À utiliser sous supervision médicale.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Densité calorique élevée. Procure 75 Cal par 100 mL (22 Cal/30 mL).
- Teneur plus élevée en protéines, électrolytes, vitamines et minéraux par 100 Cal que les préparations ordinaires pour nourrissons nés à terme afin de procurer aux prématurés les nutriments dont ils ont besoin pour leur croissance et leur développement.
- Renferme plus de calcium et de phosphore que les préparations ordinaires pour les bébés nés à terme.
- Augmentations supérieures du poids, de la taille et du périmètre crânien, comparativement aux préparations pour nourrissons nés à terme[3,4].
- Amélioration de la composition corporelle : masse corporelle maigre significativement plus élevée et masse grasse inférieure à 12 mois[5,6].
- Contient du DHA (0,15 %†), un acide gras oméga-3, et de l'ARA (0,4 %†), un acide gras oméga-6, qui contribuent au développement normal du cerveau et des yeux.
- Environ 24,4 % de lipides sous forme de triglycérides à chaîne moyenne, source de lipides faciles à digérer et bien absorbés[7].
- Enrichi de taurine et de carnitine pour aider à fournir les quantités normalement présentes dans le lait maternel.
- Contient un mélange breveté de nucléotides, conçu pour être semblable à celui du lait maternel (72 mg/L).
- Ne contient pas d'oléine d'huile de palme.
- Facile à digérer, comme toutes les préparations pour nourrissons.

DONNÉES TECHNIQUES

	Poudre (dilution normale)
Densité calorique (Cal/mL)	0,75
Protéines (% de l'énergie totale)	11
Lipides (% de l'énergie totale)	49
Glucides (% de l'énergie totale)	40
Rapport Cal totales:g d'azote	228:1
Rapport Cal non protéiques:g d'azote	203:1
Eau (g/L)	893
Osmolalité (mOsm/kg d'eau)	250
Charge osmotique rénale (mOsm/L)	187,4
Viscosité à la température ambiante/lorsque refroidi	S. O.
Diamètre minimal de la sonde pour l'alimentation par gravité/pompe (Fr)	S. O.
Hyporésiduel	Oui
Sans gluten	Oui
Cascher	Oui
Halal	Oui

PRÉSENTATION

Poudre

57430-718	Similac® Advance® Neosure®	Boîtes de 363 g	6/carton

Les lignes directrices pour la préparation se trouvent à la page 12.

† Des acides gras totaux.

RÉFÉRENCES :

1. Lockwood CJ et Lemons JA. Guidelines for Perinatal Care. American Academy of Pediatrics and The American College of Obstetricians and Gynecologists. 6e éd. 2009:280. **2.** Whyte RK. Safe Discharge of Late Preterm Infants. Canadian Paediatric Society, Fetus and Newborn Committee Position Statement. *Paediatr Child Health*. 2010;15(10):655-60. **3.** Lucas A *et al.* Randomized Trial of Nutrient-Enriched Formula Versus Standard Formula for Postdischarge Preterm Infants. *Pediatrics* 2001;108:703-11. **4.** Carver JD *et al.* Growth of Preterm Infants Fed Nutrient-Enriched or Term Formula After Hospital Discharge. *Pediatrics* 2001;107:683-9. **5.** Cooke RJ *et al.* Adiposity Is Not Altered in Preterm Infants Fed With a Nutrient-Enriched Formula After Hospital Discharge. *Pediatr Res* 2010;67:660-4. **6.** Groh-wargo S *et al.* Body Composition in Preterm Infants Who Are Fed Long-Chain Polyunsaturated Fatty Acids: A Prospective, Randomized, Controlled Trial. *Pediatr Res* 2005;57:712-8. **7.** Duggan C, Watkins JB et Walker WA. Nutrition in Pediatrics: Standard and Specialized Enteral Formulas. BC Decker Inc. Hamilton. 2008.

INFORMATION NUTRITIONNELLE

Tableau de mélange pour Similac® Advance® Neosure®, en poudre

Densité calorique (Cal/30 mL)	Mesurette(s)† rase(s) et non tassée(s)	Eau (mL)	Volume approximatif obtenu‡ (mL)
20	2	135	150
22 (standard)	1	60	67
24	3	165	187
27	5	240	277

† N'utiliser que la mesurette fournie dans la boîte.
‡ Calculé en tenant compte du volume de déplacement et arrondi au nombre entier le plus proche.

ÉNERGIE

	Par 100 g Poudre	Par 100 mL (dilution normale)	Par 100 Cal
ÉNERGIE (Cal [kJ])	515 (2154)	75 (314)	100 (418)
PROTÉINES (g)	14,4	2,1	2,8
% de l'énergie totale		11	
Arginine (mg)	435	65	87
Cystine (mg)	225	32	43
Histidine (mg)	335	47	63
Isoleucine (mg)	780	110	147
Leucine (mg)	1525	217	289
Lysine (mg)	1265	176	235
Méthionine (mg)	380	54	72
Phénylalanine (mg)	640	91	121
Tryptophane (mg)	205	33	44
Thréonine (mg)	825	118	157
Valine (mg)	860	123	164
Taurine (mg)	31	4,5	6,0
Carnitine (mg)	28	4,1	5,4
Nucléotides (mg)	49	7,2	9,6
Source	Lait écrémé, concentré de protéines de lactosérum		
LIPIDES (g)	28,3	4,1	5,5
% de l'énergie totale		49	
Acides gras polyinsaturés (g)	6,64	0,97	1,229
Acide linoléique (g)	3,86	0,564	0,750
Acide arachidonique (ARA) (g)	0,10	0,015	0,0194
Acide linolénique (g)	0,515	0,075	0,100
Acide docosahexanoique (DHA) (g)	0,038	0,006	0,008
Rapport oméga-6:oméga-3		6,5:1	
Acides gras monoinsaturés (g)	8,39	1,22	1,63
Acides gras saturés (g)	13,75	2,00	2,67
Cholestérol (mg)	-	-	-
Source	Huile de carthame riche en acide oléique, huile de soya, huile de copra, huile de triglycérides à chaîne moyenne (TCM), ARA et DHA		
Huile de TCM (% des lipides totaux)		24,4	
GLUCIDES (g)	52,0	7,6	10,1
% de l'énergie totale		40	
Fibres alimentaires (g)	-	-	-
Fructooligosaccharides à chaîne courte (FOScc) (g)	-	-	-
Galactooligosaccharides (GOS) (g)	-	-	-
Source	Extrait sec de sirop de maïs, lactose		
Acésulfame-potassium (mg)	-	-	-
Sucralose (mg)	-	-	-

VITAMINES

Vitamine A (ER [UI])	710 (2368)	104 (346)	138 (460)
Vitamine D_3 (mcg [UI])	9 (360)	1,3 (53)	1,8 (70)
Vitamine E (UI)	19	2,7	3,6
Vitamine K_1 (mg)	0,057	0,0083	0,011
Vitamine C (mg)	77	11	15
Thiamine (mg)	1,13	0,165	0,220
Riboflavine (mg)	0,772	0,113	0,150
Niacine (mg)	10	1,47	1,95
Vitamine B_6 (mg)	0,515	0,075	0,100
Acide folique (mg)	0,129	0,0188	0,025
Vitamine B_{12} (mg)	0,00206	0,0003	0,0004
Acide pantothénique (mg)	4,12	0,601	0,80
Biotine (mg)	0,0463	0,0068	0,009
Choline (mg)	82	12	16
Inositol (mg)	180	26	35

MINÉRAUX

Sodium (mg [mmol])	170 (7,39)	25 (1,09)	33 (1,43)
Potassium (mg [mmol])	731 (18,74)	107 (2,74)	142 (3,64)
Chlorure (mg [mmol])	386 (10,89)	56 (1,58)	75 (2,12)
Calcium (mg)	541	79	105
Phosphore (mg)	319	47	62
Magnésium (mg)	46	7	9
Fer (mg)	9,3	1,4	1,8
Zinc (mg)	6,2	0,9	1,2
Iode (mg)	0,0772	0,0113	0,015
Cuivre (mg)	0,618	0,0902	0,120
Manganèse (mg)	0,0515	0,0075	0,010
Sélénium (mg)	0,0107	0,00156	0,0021
Chrome (mg)	-	-	-
Molybdène (mg)	-	-	-

COMPOSITION

Similac® Advance® Neosure®, en poudre :
Lait écrémé, extrait sec de sirop de maïs, lactose, huile de soya, huile de carthame riche en acide oléique, concentré de protéines de lactosérum, triglycérides à chaîne moyenne (huiles de copra et [ou] de palmiste fractionnées), huile de copra, citrate de potassium, phosphate calcique, acide ascorbique, huile de *M. alpina*, m-inositol, carbonate de calcium, chlorure de magnésium, huile de **C. cohnii*, chlorure de potassium, taurine, sulfate ferreux, bitartrate de choline, chlorure de choline, palmitate d'ascorbyle, L-carnitine, cytidine-5'-monophosphate, acétate de *d*-α-tocophéryle, guanosine-5'-monophosphate disodique, sulfate de zinc, uridine-5'-monophosphate disodique, nicotinamide, mélange de tocophérols, adénosine-5'-monophosphate, pantothénate de calcium, sulfate de cuivre, palmitate de vitamine A, chlorhydrate de chlorure de thiamine, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, β-carotène, acide folique, sulfate de manganèse, phylloquinone, biotine, sélénate de sodium, vitamine D_3, cyanocobalamine.
* Source d'acide arachidonique (ARA).
** Source d'acide docosahexanoïque (DHA).
CONTIENT : Allergènes alimentaires prioritaires : Lait. **Ingrédients associés à des intolérances et (ou) à des sensibilités alimentaires :** Maïs, huile de copra, lactose, autres composants du soya.

Les valeurs sont sujettes à changement. Pour connaître la liste la plus récente des ingrédients, des allergènes et l'information nutritionnelle, consulter l'étiquette ou l'emballage du produit.

SIMILAC® ADVANCE® NEOSURE®
Préparation enrichie de DHA et d'ARA
Pour les nourrissons prématurés, de la naissance à 12 mois

SIMILAC® ADVANCE® NEOSURE®

Préparation enrichie de DHA et d'ARA

Pour les nourrissons prématurés, de la naissance à 12 mois

INDICATIONS D'EMPLOI

- Pour les nourrissons prématurés qui ont des besoins nutritionnels accrus non comblés in utero.
- Pour les nourrissons prématurés qui obtiennent leur congé de l'hôpital.
- L'*American Academy of Pediatrics* et l'*American College of Obstetricians and Gynecologists* reconnaissent que « … les petits prématurés peuvent bénéficier de l'utilisation de ces préparations jusqu'à neuf mois après leur sortie de l'hôpital »[1].
- « Les nourrissons de 34 et de 35 semaines d'âge gestationnel peuvent profiter d'une préparation enrichie de protéines et de minéraux pour accélérer leur croissance »[2].

Mises en garde :

- Non indiqué pour administration par voie parentérale.
- À utiliser sous supervision médicale.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Densité calorique élevée. Procure 74 Cal par 100 mL (22 Cal/30 mL).
- Teneur plus élevée en protéines, électrolytes, vitamines et minéraux par 100 Cal que les préparations ordinaires pour nourrissons nés à terme afin de procurer aux prématurés les nutriments dont ils ont besoin pour leur croissance et leur développement.
- Renferme plus de calcium et de phosphore que les préparations ordinaires pour les bébés nés à terme.
- Augmentations supérieures du poids, de la taille et du périmètre crânien, comparativement aux préparations pour nourrissons nés à terme[3,4].
- Amélioration de la composition corporelle : masse corporelle maigre significativement plus élevée et masse grasse inférieure à 12 mois[5,6].
- Contient du DHA (0,15 %†), un acide gras oméga-3, et de l'ARA (0,4 %†), un acide gras oméga-6, qui contribuent au développement normal du cerveau et des yeux.
- Environ 24,4 % de lipides sous forme de triglycérides à chaîne moyenne, source de lipides faciles à digérer et bien absorbés[7].
- Enrichi de taurine et de carnitine pour aider à fournir les quantités normalement présentes dans le lait maternel.
- Contient un mélange breveté de nucléotides, conçu pour être semblable à celui du lait maternel (72 mg/L).
- Ne contient pas d'oléine d'huile de palme.
- Facile à digérer, comme toutes les préparations pour nourrissons.

DONNÉES TECHNIQUES

	Prêt à servir
Densité calorique (Cal/mL)	0,74
Protéines (% de l'énergie totale)	11,2
Lipides (% de l'énergie totale)	48,4
Glucides (% de l'énergie totale)	40,4
Rapport Cal totales:g d'azote	223:1
Rapport Cal non protéiques:g d'azote	198:1
Eau (g/L)	890
Osmolalité (mOsm/kg d'eau)	250
Charge osmotique rénale (mOsm/L)	187,2
Viscosité à la température ambiante/lorsque refroidi	S. O.
Diamètre minimal de la sonde pour l'alimentation par gravité/pompe (Fr)	S. O.
Hyporésiduel	Oui
Sans gluten	Oui
Cascher	Oui
Halal	Oui

PRÉSENTATION

Prêt à servir

59649-871	Similac® Advance® Neosure®	Bouteilles de plastique de 59 mL	48/carton

Les lignes directrices pour la préparation se trouvent à la page 12.

† Des acides gras totaux.

RÉFÉRENCES :

1. Lockwood CJ et Lemons JA. Guidelines for Perinatal Care. American Academy of Pediatrics and The American College of Obstetricians and Gynecologists. 6e éd. 2009:280. **2.** Whyte RK. Safe Discharge of Late Preterm Infants. Canadian Paediatric Society, Fetus and Newborn Committee Position Statement. *Paediatr Child Health*. 2010;15(10):655-60. **3.** Lucas A *et al.* Randomized Trial of Nutrient-Enriched Formula Versus Standard Formula for Postdischarge Preterm Infants. *Pediatrics* 2001;108:703-11. **4.** Carver JD *et al.* Growth of Preterm Infants Fed Nutrient-Enriched or Term Formula After Hospital Discharge. *Pediatrics* 2001;107:683-9. **5.** Cooke RJ *et al.* Adiposity Is Not Altered in Preterm Infants Fed With a Nutrient-Enriched Formula After Hospital Discharge. *Pediatr Res* 2010;67:660-4. **6.** Groh-wargo S *et al.* Body Composition in Preterm Infants Who Are Fed Long-Chain Polyunsaturated Fatty Acids: A Prospective, Randomized, Controlled Trial. *Pediatr Res* 2005;57:712-8. **7.** Duggan C, Watkins JB et Walker WA. Nutrition in Pediatrics: Standard and Specialized Enteral Formulas. BC Decker Inc. Hamilton. 2008.

INFORMATION NUTRITIONNELLE

ÉNERGIE

	Par 100 mL	Par 100 Cal	Par 59 mL
ÉNERGIE (Cal [kJ])	74 (311)	100 (418)	44 (183)
PROTÉINES (g)	2,1	2,8	1,2
% de l'énergie totale		11,2	
Arginine (mg)	65	88	38
Cystine (mg)	32	43	19
Histidine (mg)	47	64	28
Isoleucine (mg)	110	149	65
Leucine (mg)	217	293	128
Lysine (mg)	176	238	104
Méthionine (mg)	54	73	32
Phénylalanine (mg)	91	123	54
Tryptophane (mg)	33	45	19
Thréonine (mg)	118	159	70
Valine (mg)	123	166	73
Taurine (mg)	4,5	6,1	2,7
Carnitine (mg)	4,0	5,4	2,4
Nucléotides (mg)	7,2	9,7	4,2
Source	Lait écrémé, concentré de protéines de lactosérum		
LIPIDES (g)	4,1	5,5	2,4
% de l'énergie totale		48,4	
Acides gras polyinsaturés (g)	1,050	1,419	0,620
Acide linoléique (g)	0,558	0,754	0,329
Acide arachidonique (ARA) (g)	0,014	0,019	0,008
Acide linolénique (g)	0,074	0,100	0,044
Acide docosahexanoïque (DHA) (g)	0,006	0,008	0,004
Rapport oméga-6:oméga-3		6,5:1	
Acides gras monoinsaturés (g)	0,474	0,641	0,280
Acides gras saturés (g)	2,223	3,004	1,312
Cholestérol (mg)	2,8	3,8	1,7
Source	Huile de soya, huile de copra, huile de triglycérides à chaîne moyenne (TCM), ARA et DHA		
Huile de TCM (% des lipides totaux)		24,4	
GLUCIDES (g)	7,5	10,1	4,4
% de l'énergie totale		40,4	
Fibres alimentaires (g)	-	-	-
Fructooligosaccharides à chaîne courte (FOScc) (g)	-	-	-
Galactooligosaccharides (GOS) (g)	-	-	-
Source	Extrait sec de sirop de maïs, lactose		
Acésulfame-potassium (mg)	-	-	-
Sucralose (mg)	-	-	-

VITAMINES

Vitamine A (ER [UI])	103 (342)	138 (460)	61 (202)
Vitamine D_3 (mcg [UI])	1,3 (52)	1,8 (70)	0,77 (31)
Vitamine E (UI)	2,7	3,6	1,6
Vitamine K_1 (mg)	0,0083	0,0112	0,0049
Vitamine C (mg)	11	15	7
Thiamine (mg)	0,164	0,222	0,097
Riboflavine (mg)	0,112	0,151	0,066
Niacine (mg)	1,45	1,96	0,86
Vitamine B_6 (mg)	0,074	0,10	0,04
Acide folique (mg)	0,019	0,025	0,011
Vitamine B_{12} (mg)	0,0003	0,00041	0,00018
Acide pantothénique (mg)	0,60	0,80	0,40
Biotine (mg)	0,007	0,009	0,004
Choline (mg)	12	16	7
Inositol (mg)	26	35	15

MINÉRAUX

Sodium (mg [mmol])	25 (1,09)	33 (1,43)	15 (0,64)
Potassium (mg [mmol])	106 (2,72)	142 (3,64)	63 (1,60)
Chlorure (mg [mmol])	56 (1,58)	75 (2,12)	33 (0,93)
Calcium (mg)	78	105	46
Phosphore (mg)	46	62	27
Magnésium (mg)	7	9	4
Fer (mg)	1,3	1,8	0,8
Zinc (mg)	0,89	1,2	0,53
Iode (mg)	0,011	0,015	0,006
Cuivre (mg)	0,0893	0,12	0,053
Manganèse (mg)	0,007	0,010	0,0041
Sélénium (mg)	0,0016	0,0021	0,0009
Chrome (mg)	-	-	-
Molybdène (mg)	-	-	-

COMPOSITION

Similac® Advance® Neosure®, prêt à servir :
Eau, lait écrémé, extrait sec de sirop de maïs, huile de soya, lactose, huile de copra, concentré de protéines de lactosérum, triglycérides à chaîne moyenne (huiles de copra et [ou] de palmiste modifiées), hydroxyde de potassium, citrate de potassium, acide ascorbique, monoglycérides, lécithine de soya, carbonate de calcium, huile de **M. alpina*, phosphate calcique, m-inositol, chlorure de magnésium, huile de ***C. cohnii*, carraghénine, taurine, chlorure de choline, sulfate ferreux, chlorure de potassium, bitartrate de choline, L-carnitine, acétate de *d*-α-tocophéryle, cytidine-5'-monophosphate, sulfate de zinc, guanosine-5'-monophosphate disodique, uridine-5'-monophosphate disodique, nicotinamide, adénosine-5'-monophosphate, pantothénate de calcium, sulfate de cuivre, palmitate de vitamine A, chlorhydrate de chlorure de thiamine, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, β-carotène, acide folique, sulfate de manganèse, phylloquinone, biotine, sélénate de sodium, vitamine D_3, cyanocobalamine.
* Source d'acide arachidonique (ARA).
** Source d'acide docosahexanoïque (DHA).
CONTIENT : Allergènes alimentaires prioritaires : Lait. **Ingrédients associés à des intolérances et (ou) à des sensibilités alimentaires :** Maïs, huile de copra, lactose, autres composants du soya.

Les valeurs sont sujettes à changement. Pour connaître la liste la plus récente des ingrédients, des allergènes et l'information nutritionnelle, consulter l'étiquette ou l'emballage du produit.

SIMILAC® ADVANCE® NEOSURE®
Préparation enrichie de DHA et d'ARA
Pour les nourrissons prématurés, de la naissance à 12 mois

SIMILAC® SPECIAL CARE® 20 (FAIBLE TENEUR EN FER)

Préparation enrichie de DHA et d'ARA

Pour les nourrissons prématurés

INDICATIONS D'EMPLOI

- Pour les nourrissons prématurés qui ont des besoins nutritionnels accrus non comblés in utero.
- Recommandé jusqu'à ce que le nourrisson atteigne un poids de 3 600 g (environ 8 lb). Similac® Advance® Neosure® (préparation pour les prématurés qui rentrent à la maison) est alors recommandé jusqu'à 9 mois d'âge corrigé[1].
- Pour l'alimentation par voie orale ou par sonde.

Mises en garde :

- **Non indiqué pour les nourrissons de faible poids à la naissance qui sont nés à terme,** car la concentration en nutriments de Similac® Special Care® 20 vise à permettre au nourrisson une assimilation des nutriments similaire à celle observée dans l'utérus durant la grossesse. Les bébés de faible poids à la naissance qui sont nés à terme pourraient bénéficier des préparations hypercaloriques pour nourrissons nés à terme Similac® 24 ou Similac® 27 offertes dans les bouteilles du Système d'alimentation pour hôpitaux d'Abbott Nutrition.
- Les nourrissons de très faible poids à la naissance sont particulièrement susceptibles de présenter des complications gastro-intestinales; il est donc recommandé de commencer l'alimentation entérale avec prudence. Confirmer la tolérance à l'alimentation entérale en commençant par de petites quantités de préparation hypocalorique, puis passer prudemment à des préparations plus riches en calories. Les signes suivants sont associés à l'administration d'une alimentation entérale avant que le tractus intestinal ne soit prêt : régurgitations, résidus gastriques excessifs, distension abdominale, selles anormales ou autres signes de troubles intestinaux. Dès que l'un de ces symptômes survient, diminuer ou cesser l'alimentation entérale.
- Non indiqué pour administration par voie parentérale.
- À utiliser sous supervision médicale.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Teneur plus élevée en protéines, électrolytes, vitamines et minéraux par 100 Cal que les préparations ordinaires pour nourrissons nés à terme afin de procurer aux prématurés les nutriments dont ils ont besoin pour leur croissance et leur développement.
- Calcium et phosphore aux concentrations nécessaires pour atteindre des taux sériques de ces minéraux semblables aux taux intra-utérins.
- Teneurs équivalentes en lactose et en polymères de glucose.
- Environ 49 % de lipides sous forme de triglycérides à chaîne moyenne, source de lipides faciles à digérer et bien absorbés[2].
- Contient du DHA (0,25 %†), un acide gras oméga-3, et de l'ARA (0,4 %†), un acide gras oméga-6, qui contribuent au développement normal du cerveau et des yeux.
- Enrichi de taurine et de carnitine pour aider à fournir les quantités normalement présentes dans le lait maternel[3-5].
- Faible teneur en fer offrant la possibilité d'ajouter la quantité de fer requise selon les besoins.
- Contient un mélange breveté de nucléotides, conçu pour être semblable à celui du lait maternel (72 mg/L).
- Ne contient pas d'oléine d'huile de palme.
- Facile à digérer, comme toutes les préparations pour nourrissons.

DONNÉES TECHNIQUES

	Prêt à servir
Densité calorique (Cal/mL)	0,68
Protéines (% de l'énergie totale)	12,0
Lipides (% de l'énergie totale)	46,9
Glucides (% de l'énergie totale)	41,1
Rapport Cal totales:g d'azote	213:1
Rapport Cal non protéiques:g d'azote	188:1
Eau (g/L)	901
Osmolalité (mOsm/kg d'eau)	225
Charge osmotique rénale (mOsm/L)	190
Viscosité à la température ambiante/lorsque refroidi	S. O.
Diamètre minimal de la sonde pour l'alimentation par gravité/pompe (Fr)	S. O.

† Des acides gras totaux.

RÉFÉRENCES : 1. Lockwood CJ et Lemons JA. Guidelines for Perinatal Care. American Academy of Pediatrics and The American College of Obstetricians and Gynecologists. *6e* éd. 2009:280. **2.** Duggan C, Watkins JB et Walker WA. Nutrition in Pediatrics: Standard and Specialized Enteral Formulas. BC Decker Inc. Hamilton. 2008. **3.** Feller AG *et al.* Subnormal concentrations of serum selenium and plasma carnitine in chronically tube-fed patients. *Am J Clin Nutr* 1987;45:476-83. **4.** Fischer MH *et al.* Improved Selenium, Carnitine and Taurine Status in an Enterally Fed Population. *JPEN* 1990;14:270-4. **5.** Bourdet B *et al.* Plasma Free Carnitine Depletion in Polytrauma Patients. *J Nutr Health Aging* 2010;14(3):253.

	Prêt à servir
Hyporésiduel	Oui
Sans gluten	Oui
Cascher	Oui
Halal	Oui

PRÉSENTATION

Prêt à servir

0E392-806	Similac® Special Care® 20 (faible teneur en fer)	Bouteilles de verre de 120 mL	48/carton

Les lignes directrices pour la préparation se trouvent à la page 12.

ÉNERGIE

	Par 100 mL	Par 100 Cal	Par 120 mL
ÉNERGIE (Cal [kJ])	68 (285)	100 (418)	82 (342)
PROTÉINES (g)	2,04	3,0	2,45
% de l'énergie totale		12	
Arginine (mg)	58	85	70
Cystine (mg)	31	46	37
Histidine (mg)	46	68	55
Isoleucine (mg)	116	171	139
Leucine (mg)	204	300	245
Lysine (mg)	172	253	206
Méthionine (mg)	46	68	55
Phénylalanine (mg)	79	116	95
Tryptophane (mg)	28	41	34
Thréonine (mg)	103	151	124
Valine (mg)	126	185	151
Taurine (mg)	4,5	6,6	5,4
Carnitine (mg)	1,15	1,7	1,38
Nucléotides	7,2	10,6	8,6
Source	Lait écrémé sec, concentré de protéines de lactosérum		
LIPIDES (g)	3,7	5,4	4,4
% de l'énergie totale		46,9	
Acides gras polyinsaturés (g)	0,646	0,950	0,775
Acide linoléique (g)	0,45	0,66	0,54
Acide arachidonique (ARA) (g)	0,015	0,022	0,018
Acide linolénique (g)	0,065	0,096	0,078
Acide docosahexanoïque (DHA) (g)	0,008	0,012	0,010
Rapport oméga-6:oméga-3		8:1	
Acides gras monoinsaturés (g)	0,348	0,512	0,418
Acides gras saturés (g)	2,520	3,706	3,024
Cholestérol (mg)	3,0	4,0	4,0
Source	Huile de triglycérides à chaîne moyenne (TCM), huile de soya, huile de copra, ARA et DHA		
Huile de TCM (% des lipides totaux)		49,1	
GLUCIDES (g)	7,0	10,3	8,4
% de l'énergie totale		41,1	
Fibres alimentaires (g)	-	-	-
Fructooligosaccharides à chaîne courte (FOScc) (g)	-	-	-
Galactooligosaccharides (GOS) (g)	-	-	-
Source	Maltodextrine, lactose		
Acésulfame-potassium (mg)	-	-	-
Sucralose (mg)	-	-	-

VITAMINES

Vitamine A (ER [UI])	206 (686)	303 (1009)	247 (823)
Vitamine D_3 (mcg [UI])	3,3 (133)	4,9 (196)	4,0 (160)
Vitamine E (UI)	2,1	3,1	2,5
Vitamine K_1 (mg)	0,0083	0,0122	0,010
Vitamine C (mg)	25	37	30
Thiamine (mg)	0,17	0,25	0,20
Riboflavine (mg)	0,42	0,62	0,50
Niacine (mg)	3,4	5,0	4,1
Vitamine B_6 (mg)	0,067	0,10	0,080
Acide folique (mg)	0,029	0,043	0,035
Vitamine B_{12} (mg)	0,00037	0,00054	0,00044
Acide pantothénique (mg)	1,3	1,9	1,6
Biotine (mg)	0,025	0,037	0,030
Choline (mg)	8,2	12,1	9,8
Inositol (mg)	22	32	26

MINÉRAUX

Sodium (mg [mmol])	35 (1,52)	52 (2,24)	42 (1,83)
Potassium (mg [mmol])	83 (2,13)	122 (3,13)	100 (2,55)
Chlorure (mg [mmol])	64 (1,81)	94 (2,65)	77 (2,17)
Calcium (mg)	101	149	121
Phosphore (mg)	60	88	72
Magnésium (mg)	7,5	11	9
Fer (mg)	0,25	0,37	0,30
Zinc (mg)	0,72	1,1	0,9
Iode (mg)	0,015	0,022	0,018
Cuivre (mg)	0,09	0,13	0,11
Manganèse (mg)	0,005	0,0074	0,006
Sélénium (mg)	0,00155	0,00228	0,00186
Chrome (mg)	-	-	-
Molybdène (mg)	-	-	-

COMPOSITION

Similac® Special Care® 20 (faible teneur en fer), prêt à servir :
Eau, maltodextrine, lait écrémé sec, triglycérides à chaîne moyenne (huiles de copra et [ou] de palmiste modifiées), lactose, concentré de protéines de lactosérum, huile de soya, huile de copra, phosphate tricalcique, citrate de sodium, acide ascorbique, citrate de potassium, huile de **M. alpina*, mono- et diglycérides, lécithine de soya, chlorure de magnésium, chlorure de sodium, m-inositol, huile de ***C. cohnii*, carraghénine, taurine, nicotinamide, chlorure de choline, sulfate de zinc, cytidine-5'-monophosphate, guanosine-5'-monophosphate disodique, uridine-5'-monophosphate disodique, pantothénate de calcium, acétate de *d*-α-tocophéryle, sulfate ferreux, adénosine-5'-monophosphate, L-carnitine, riboflavine, palmitate de vitamine A, sulfate de cuivre, chlorhydrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, bicarbonate de sodium, β-carotène, acide folique, biotine, phylloquinone, iodure de potassium, vitamine D_3, sélénate de sodium, cyanocobalamine.
* Source d'acide arachidonique (ARA). ** Source d'acide docosahexanoïque (DHA).
CONTIENT : Allergènes alimentaires prioritaires : Lait. **Ingrédients associés à des intolérances et (ou) à des sensibilités alimentaires :** Maïs, huile de copra, lactose, autres composants du soya.

Les valeurs sont sujettes à changement. Pour connaître la liste la plus récente des ingrédients, des allergènes et l'information nutritionnelle, consulter l'étiquette ou l'emballage du produit.

SIMILAC® SPECIAL CARE® 20
(FAIBLE TENEUR EN FER)
Préparation enrichie de DHA et d'ARA
Pour les nourrissons prématurés

SIMILAC® SPECIAL CARE® 20 (AVEC FER)

Préparation enrichie de DHA et d'ARA

Pour les nourrissons prématurés

INDICATIONS D'EMPLOI

- Pour les nourrissons prématurés qui ont des besoins nutritionnels accrus non comblés in utero.
- Recommandé jusqu'à ce que le nourrisson atteigne un poids de 3 600 g (environ 8 lb). Similac® Advance® Neosure® (préparation pour les prématurés qui rentrent à la maison) est alors recommandé jusqu'à 9 mois d'âge corrigé[1].
- Pour l'alimentation par voie orale ou par sonde.

Mises en garde :

- **Non indiqué pour les nourrissons de faible poids à la naissance qui sont nés à terme,** car la concentration en nutriments de Similac® Special Care® 20 vise à permettre au nourrisson une assimilation des nutriments similaire à celle observée dans l'utérus durant la grossesse. Les bébés de faible poids à la naissance qui sont nés à terme pourraient bénéficier des préparations hypercaloriques pour nourrissons nés à terme Similac® 24 ou Similac® 27 offertes dans les bouteilles du Système d'alimentation pour hôpitaux d'Abbott Nutrition.
- Les nourrissons de très faible poids à la naissance sont particulièrement susceptibles de présenter des complications gastro-intestinales; il est donc recommandé de commencer l'alimentation entérale avec prudence. Confirmer la tolérance à l'alimentation entérale en commençant par de petites quantités de préparation hypocalorique, puis passer prudemment à des préparations plus riches en calories. Les signes suivants sont associés à l'administration d'une alimentation entérale avant que le tractus intestinal ne soit prêt : régurgitations, résidus gastriques excessifs, distension abdominale, selles anormales ou autres signes de troubles intestinaux. Dès que l'un de ces symptômes survient, diminuer ou cesser l'alimentation entérale.
- Non indiqué pour administration par voie parentérale.
- À utiliser sous supervision médicale.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Teneur plus élevée en protéines, électrolytes, vitamines et minéraux par 100 Cal que les préparations ordinaires pour nourrissons nés à terme afin de procurer aux prématurés les nutriments dont ils ont besoin pour leur croissance et leur développement.
- Calcium et phosphore aux concentrations nécessaires pour atteindre des taux sériques de ces minéraux semblables aux taux intra-utérins.
- Teneurs équivalentes en lactose et en polymères de glucose.
- Environ 49 % de lipides sous forme de triglycérides à chaîne moyenne, source de lipides faciles à digérer et bien absorbés[2].
- Contient du DHA (0,25 %†), un acide gras oméga-3, et de l'ARA (0,4 %†), un acide gras oméga-6, qui contribuent au développement normal du cerveau et des yeux.
- Enrichi de taurine et de carnitine pour aider à fournir les quantités normalement présentes dans le lait maternel[3-5].
- Contient un mélange breveté de nucléotides, conçu pour être semblable à celui du lait maternel (72 mg/L).
- Ne contient pas d'oléine d'huile de palme.
- Facile à digérer, comme toutes les préparations pour nourrissons.

DONNÉES TECHNIQUES

	Prêt à servir
Densité calorique (Cal/mL)	0,68
Protéines (% de l'énergie totale)	12,0
Lipides (% de l'énergie totale)	46,9
Glucides (% de l'énergie totale)	41,1
Rapport Cal totales:g d'azote	213:1
Rapport Cal non protéiques:g d'azote	188:1
Eau (g/L)	901
Osmolalité (mOsm/kg d'eau)	225
Charge osmotique rénale (mOsm/L)	190
Viscosité à la température ambiante/lorsque refroidi	S. O.
Diamètre minimal de la sonde pour l'alimentation par gravité/pompe (Fr)	S. O.

† Des acides gras totaux.

RÉFÉRENCES : 1. Lockwood CJ et Lemons JA. Guidelines for Perinatal Care. American Academy of Pediatrics and The American College of Obstetricians and Gynecologists. 6e éd. 2009:280. **2.** Duggan C, Watkins JB et Walker WA. Nutrition in Pediatrics: Standard and Specialized Enteral Formulas. BC Decker Inc. Hamilton. 2008. **3.** Feller AG *et al.* Subnormal concentrations of serum selenium and plasma carnitine in chronically tube-fed patients. *Am J Clin Nutr* 1987;45:476-83. **4.** Fischer MH *et al.* Improved Selenium, Carnitine and Taurine Status in an Enterally Fed Population. *JPEN* 1990;14:270-4. **5.** Bourdet B *et al.* Plasma Free Carnitine Depletion in Polytrauma Patients. *J Nutr Health Aging* 2010;14(3):253.

	Prêt à servir
Hyporésiduel	Oui
Sans gluten	Oui
Cascher	Oui
Halal	Oui

PRÉSENTATION

Prêt à servir

0G815-806	Similac® Special Care® 20 (avec fer)	Bouteilles de verre de 120 mL	48/carton

Les lignes directrices pour la préparation se trouvent à la page 12.

ÉNERGIE

	Par 100 mL	Par 100 Cal	Par 120 mL
ÉNERGIE (Cal [kJ])	68 (285)	100 (418)	82 (342)
PROTÉINES (g)	2,04	3,0	2,45
% de l'énergie totale		12,0	
Arginine (mg)	58	85	70
Cystine (mg)	31	46	37
Histidine (mg)	46	68	55
Isoleucine (mg)	116	171	139
Leucine (mg)	204	300	245
Lysine (mg)	172	253	206
Méthionine (mg)	46	68	55
Phénylalanine (mg)	79	116	95
Tryptophane (mg)	28	41	34
Thréonine (mg)	103	151	124
Valine (mg)	126	185	151
Taurine (mg)	4,5	6,6	5,4
Carnitine (mg)	1,15	1,7	1,38
Nucléotides	7,2	10,6	8,6
Source	Lait écrémé sec, concentré de protéines de lactosérum		
LIPIDES (g)	3,7	5,4	4,4
% de l'énergie totale		46,9	
Acides gras polyinsaturés (g)	0,646	0,950	0,775
Acide linoléique (g)	0,45	0,66	0,54
Acide arachidonique (ARA) (g)	0,015	0,022	0,018
Acide linolénique (g)	0,065	0,096	0,078
Acide docosahexanoïque (DHA) (g)	0,008	0,012	0,010
Rapport oméga-6:oméga-3		8:1	
Acides gras monoinsaturés (g)	0,348	0,512	0,418
Acides gras saturés (g)	2,520	3,706	3,042
Cholestérol (mg)	3,0	4,0	4,0
Source	Huile de triglycérides à chaîne moyenne (TCM), huile de soya, huile de copra, ARA et DHA		
Huile de TCM (% des lipides totaux)		49,1	
GLUCIDES (g)	7,0	10,3	8,4
% de l'énergie totale		41,1	
Fibres alimentaires (g)	-	-	-
Fructooligosaccharides à chaîne courte (FOScc) (g)	-	-	-
Galactooligosaccharides (GOS) (g)	-	-	-
Source	Maltodextrine, lactose		
Acésulfame-potassium (mg)	-	-	-
Sucralose (mg)	-	-	-

VITAMINES

Vitamine A (ER [UI])	206 (686)	303 (1009)	247 (823)
Vitamine D_3 (mcg [UI])	3,3 (133)	4,9 (196)	4,0 (160)
Vitamine E (UI)	2,1	3,1	2,5
Vitamine K_1 (mg)	0,0083	0,0122	0,010
Vitamine C (mg)	25	37	30
Thiamine (mg)	0,17	0,25	0,20
Riboflavine (mg)	0,42	0,62	0,50
Niacine (mg)	3,4	5,0	4,1
Vitamine B_6 (mg)	0,067	0,10	0,080
Acide folique (mg)	0,029	0,043	0,035
Vitamine B_{12} (mg)	0,00037	0,00054	0,00044
Acide pantothénique (mg)	1,3	1,9	1,6
Biotine (mg)	0,025	0,037	0,030
Choline (mg)	8,2	12,1	9,8
Inositol (mg)	22	32	26

MINÉRAUX

Sodium (mg [mmol])	35 (1,52)	52 (2,24)	42 (1,83)
Potassium (mg [mmol])	83 (2,13)	122 (3,13)	100 (2,55)
Chlorure (mg [mmol])	64 (1,81)	94 (2,65)	77 (2,17)
Calcium (mg)	101	149	121
Phosphore (mg)	60	88	72
Magnésium (mg)	7,5	11	9
Fer (mg)	1,2	1,8	1,4
Zinc (mg)	0,72	1,1	0,9
Iode (mg)	0,015	0,022	0,018
Cuivre (mg)	0,09	0,13	0,11
Manganèse (mg)	0,012	0,018	0,014
Sélénium (mg)	0,00155	0,00228	0,00186
Chrome (mg)	-	-	-
Molybdène (mg)	-	-	-

COMPOSITION

Similac® Special Care® 20 (avec fer), prêt à servir :
Eau, maltodextrine, lait écrémé sec, triglycérides à chaîne moyenne (huiles de copra et [ou] de palmiste modifiées), lactose, concentré de protéines de lactosérum, huile de soya, huile de copra, phosphate tricalcique, citrate de sodium, acide ascorbique, citrate de potassium, huile de **M. alpina*, mono- et diglycérides, lécithine de soya, chlorure de magnésium, chlorure de sodium, m-inositol, huile de ***C. cohnii*, carraghénine, sulfate ferreux, taurine, nicotinamide, chlorure de choline, sulfate de zinc, cytidine-5'-monophosphate, guanosine-5'-monophosphate disodique, uridine-5'-monophosphate disodique, pantothénate de calcium, acétate de *d-α*-tocophéryle, adénosine-5'-monophosphate, L-carnitine, riboflavine, palmitate de vitamine A, sulfate de cuivre, chlorhydrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, bicarbonate de sodium, β-carotène, acide folique, biotine, phylloquinone, iodure de potassium, vitamine D_3, sélénate de sodium, cyanocobalamine.
* Source d'acide arachidonique (ARA). ** Source d'acide docosahexanoïque (DHA).
CONTIENT : Allergènes alimentaires prioritaires : Lait. **Ingrédients associés à des intolérances et (ou) à des sensibilités alimentaires :** Maïs, huile de copra, lactose, autres composants du soya.

Les valeurs sont sujettes à changement. Pour connaître la liste la plus récente des ingrédients, des allergènes et l'information nutritionnelle, consulter l'étiquette ou l'emballage du produit.

SIMILAC® SPECIAL CARE® 20
(AVEC FER)
Préparation enrichie de DHA et d'ARA
Pour les nourrissons prématurés

SIMILAC® SPECIAL CARE® 24 (FAIBLE TENEUR EN FER)

Préparation enrichie de DHA et d'ARA

Pour les nourrissons prématurés

INDICATIONS D'EMPLOI

- Pour les nourrissons prématurés qui ont des besoins nutritionnels accrus non comblés in utero.
- Recommandé jusqu'à ce que le nourrisson atteigne un poids de 3 600 g (environ 8 lb). Similac® Advance® Neosure® (préparation pour les prématurés qui rentrent à la maison) est alors recommandé jusqu'à 9 mois d'âge corrigé[1].
- Pour l'alimentation par voie orale ou par sonde.

Mises en garde :

- **Non indiqué pour les nourrissons de faible poids à la naissance qui sont nés à terme,** car la concentration en nutriments de Similac® Special Care® 24 vise à permettre au nourrisson une assimilation des nutriments similaire à celle observée dans l'utérus durant la grossesse. Les bébés de faible poids à la naissance qui sont nés à terme pourraient bénéficier des préparations hypercaloriques pour nourrissons nés à terme Similac® 24 ou Similac® 27 offertes dans les bouteilles du Système d'alimentation pour hôpitaux d'Abbott Nutrition.
- Les nourrissons de très faible poids à la naissance sont particulièrement susceptibles de présenter des complications gastro-intestinales; il est donc recommandé de commencer l'alimentation entérale avec prudence. Confirmer la tolérance à l'alimentation entérale en commençant par de petites quantités de préparation hypocalorique, puis passer prudemment à des préparations plus riches en calories. Les signes suivants sont associés à l'administration d'une alimentation entérale avant que le tractus intestinal ne soit prêt : régurgitations, résidus gastriques excessifs, distension abdominale, selles anormales ou autres signes de troubles intestinaux. Dès que l'un de ces symptômes survient, diminuer ou cesser l'alimentation entérale.
- Non indiqué pour administration par voie parentérale.
- À utiliser sous supervision médicale.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Densité calorique élevée : procure 81 Cal par 100 mL (24 Cal par 30 mL).
- Teneur plus élevée en protéines, électrolytes, vitamines et minéraux par 100 Cal que les préparations ordinaires pour nourrissons nés à terme afin de procurer aux prématurés les nutriments dont ils ont besoin pour leur croissance et leur développement.
- Calcium et phosphore aux concentrations nécessaires pour atteindre des taux sériques de ces minéraux semblables aux taux intra-utérins.
- Teneurs équivalentes en lactose et en polymères de glucose.
- Environ 49 % de lipides sous forme de triglycérides à chaîne moyenne, source de lipides faciles à digérer et bien absorbés[2].
- Contient du DHA (0,25 %†), un acide gras oméga-3, et de l'ARA (0,4 %†), un acide gras oméga-6, qui contribuent au développement normal du cerveau et des yeux.
- Enrichi de taurine et de carnitine pour aider à fournir les quantités normalement présentes dans le lait maternel[3-5].
- Faible teneur en fer offrant la possibilité d'ajouter la quantité de fer requise selon les besoins.
- Contient un mélange breveté de nucléotides, conçu pour être semblable à celui du lait maternel (72 mg/L).
- Ne contient pas d'oléine d'huile de palme.
- Facile à digérer, comme toutes les préparations pour nourrissons.

DONNÉES TECHNIQUES

	Prêt à servir
Densité calorique (Cal/mL)	0,81
Protéines (% de l'énergie totale)	11,8
Lipides (% de l'énergie totale)	46,9
Glucides (% de l'énergie totale)	41,3
Rapport Cal totales:g d'azote	215:1
Rapport Cal non protéiques:g d'azote	191:1
Eau (g/L)	882
Osmolalité (mOsm/kg d'eau)	285
Charge osmotique rénale (mOsm/L)	226
Viscosité à la température ambiante/lorsque refroidi	S. O.
Diamètre minimal de la sonde pour l'alimentation par gravité/pompe (Fr)	S. O.

† Des acides gras totaux.

RÉFÉRENCES : 1. Lockwood CJ et Lemons JA. Guidelines for Perinatal Care. American Academy of Pediatrics and The American College of Obstetricians and Gynecologists. *6e* éd. 2009:280. **2.** Duggan C, Watkins JB et Walker WA. Nutrition in Pediatrics: Standard and Specialized Enteral Formulas. BC Decker Inc. Hamilton. 2008. **3.** Feller AG *et al.* Subnormal concentrations of serum selenium and plasma carnitine in chronically tube-fed patients. *Am J Clin Nutr* 1987;45:476-83. **4.** Fischer MH *et al.* Improved Selenium, Carnitine and Taurine Status in an Enterally Fed Population. *JPEN* 1990;14:270-4. **5.** Bourdet B *et al.* Plasma Free Carnitine Depletion in Polytrauma Patients. *J Nutr Health Aging* 2010;14(3):253.

	Prêt à servir
Hyporésiduel	Oui
Sans gluten	Oui
Cascher	Oui
Halal	Oui

PRÉSENTATION

Prêt à servir

0E393-806	Similac® Special Care® 24 (faible teneur en fer)	Bouteilles de verre de 120 mL	48/carton

Les lignes directrices pour la préparation se trouvent à la page 12.

ÉNERGIE

	Par 100 mL	Par 100 Cal	Par 120 mL
ÉNERGIE (Cal [kJ])	81 (340)	100 (418)	97 (408)
PROTÉINES (g)	2,4	3,0	2,9
% de l'énergie totale		11,8	
Arginine (mg)	68	84	82
Cystine (mg)	36	44	43
Histidine (mg)	54	67	65
Isoleucine (mg)	137	169	164
Leucine (mg)	239	295	287
Lysine (mg)	202	249	242
Méthionine (mg)	54	67	65
Phénylalanine (mg)	93	115	112
Tryptophane (mg)	34	42	41
Thréonine (mg)	122	151	146
Valine (mg)	148	183	178
Taurine (mg)	4,9	6,0	5,9
Carnitine (mg)	1,4	1,7	1,66
Nucléotides	7,2	10,6	8,6
Source	Lait écrémé sec, concentré de protéines de lactosérum		
LIPIDES (g)	4,4	5,4	5,3
% de l'énergie totale		46,9	
Acides gras polyinsaturés (g)	0,649	0,801	0,779
Acide linoléique (g)	0,54	0,67	0,65
Acide arachidonique (ARA) (g)	0,018	0,022	0,022
Acide linolénique (g)	0,078	0,096	0,094
Acide docosahexanoïque (DHA) (g)	0,01	0,012	0,012
Rapport oméga-6:oméga-3		6:1	
Acides gras monoinsaturés (g)	0,415	0,512	0,498
Acides gras saturés (g)	3,116	3,847	3,739
Cholestérol (mg)	4,0	5,0	5,0
Source	Huile de triglycérides à chaîne moyenne (TCM), huile de soya, huile de copra, ARA et DHA		
Huile de TCM (% des lipides totaux)		49,3	
GLUCIDES (g)	8,4	10,4	10,1
% de l'énergie totale		41,3	
Fibres alimentaires (g)	-	-	-
Fructooligosaccharides à chaîne courte (FOScc) (g)	-	-	-
Galactooligosaccharides (GOS) (g)	-	-	-
Source	Maltodextrine, lactose		
Acésulfame-potassium (mg)	-	-	-
Sucralose (mg)	-	-	-

VITAMINES

Vitamine A (ER [UI])	244 (814)	302 (1005)	293 (977)
Vitamine D_3 (mcg [UI])	3,95 (158)	4,88 (195)	4,75 (190)
Vitamine E (UI)	2,5	3,1	3,0
Vitamine K_1 (mg)	0,01	0,012	0,012
Vitamine C (mg)	30	37	36
Thiamine (mg)	0,2	0,25	0,24
Riboflavine (mg)	0,5	0,62	0,6
Niacine (mg)	4,0	4,9	4,8
Vitamine B_6 (mg)	0,08	0,10	0,10
Acide folique (mg)	0,035	0,043	0,042
Vitamine B_{12} (mg)	0,00045	0,00056	0,00054
Acide pantothénique (mg)	1,5	1,9	1,8
Biotine (mg)	0,03	0,037	0,036
Choline (mg)	9,9	12,2	11,9
Inositol (mg)	26	32	31

MINÉRAUX

Sodium (mg [mmol])	42 (1,83)	52 (2,25)	50 (2,17)
Potassium (mg [mmol])	99 (2. 54)	122 (3,13)	119 (3,05)
Chlorure (mg [mmol])	77 (2,17)	95 (2,68)	92 (2,61)
Calcium (mg)	122	151	146
Phosphore (mg)	72	89	86
Magnésium (mg)	9	11	11
Fer (mg)	0,30	0,37	0,36
Zinc (mg)	0,9	1,1	1,1
Iode (mg)	0,018	0,022	0,022
Cuivre (mg)	0,11	0,14	0,13
Manganèse (mg)	0,0060	0,0074	0,0072
Sélénium (mg)	0,0018	0,0022	0,0022
Chrome (mg)	-	-	-
Molybdène (mg)	-	-	-

COMPOSITION

Similac® Special Care® 24 (faible teneur en fer), prêt à servir :
Eau, maltodextrine, lait écrémé sec, triglycérides à chaîne moyenne (huiles de copra et [ou] de palmiste modifiées), lactose, concentré de protéines de lactosérum, huile de soya, huile de copra, phosphate tricalcique, citrate de sodium, acide ascorbique, citrate de potassium, huile de **M. alpina*, mono- et diglycérides, lécithine de soya, chlorure de magnésium, chlorure de sodium, m-inositol, huile de ***C. cohnii*, carraghénine, taurine, nicotinamide, chlorure de choline, sulfate de zinc, cytidine-5'-monophosphate, guanosine-5'-monophosphate disodique, pantothénate de calcium, acétate de *d*-α-tocophéryle, sulfate ferreux, uridine-5'-monophosphate disodique, adénosine-5'-monophosphate, L-carnitine, riboflavine, palmitate de vitamine A, sulfate de cuivre, chlorhydrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, bicarbonate de sodium, acide folique, β-carotène, biotine, phylloquinone, iodure de potassium, vitamine D_3, sélénate de sodium, cyanocobalamine.
* Source d'acide arachidonique (ARA). ** Source d'acide docosahexanoïque (DHA).
CONTIENT : Allergènes alimentaires prioritaires : Lait. **Ingrédients associés à des intolérances et (ou) à des sensibilités alimentaires :** Maïs, huile de copra, lactose, autres composants du soya.

Les valeurs sont sujettes à changement. Pour connaître la liste la plus récente des ingrédients, des allergènes et l'information nutritionnelle, consulter l'étiquette ou l'emballage du produit.

SIMILAC® SPECIAL CARE® 24
(FAIBLE TENEUR EN FER)
Préparation enrichie de DHA et d'ARA
Pour les nourrissons prématurés

SIMILAC® SPECIAL CARE® 24 (AVEC FER)

Préparation enrichie de DHA et d'ARA

Pour les nourrissons prématurés

INDICATIONS D'EMPLOI

- Pour les nourrissons prématurés qui ont des besoins nutritionnels accrus non comblés in utero.
- Recommandé jusqu'à ce que le nourrisson atteigne un poids de 3 600 g (environ 8 lb). Similac® Advance® Neosure® (préparation pour les prématurés qui rentrent à la maison) est alors recommandé jusqu'à 9 mois d'âge corrigé[1].
- Pour l'alimentation par voie orale ou par sonde.

Mises en garde :

- **Non indiqué pour les nourrissons de faible poids à la naissance qui sont nés à terme,** car la concentration en nutriments de Similac® Special Care® 24 vise à permettre au nourrisson une assimilation des nutriments similaire à celle observée dans l'utérus durant la grossesse. Les bébés de faible poids à la naissance qui sont nés à terme pourraient bénéficier des préparations hypercaloriques pour nourrissons nés à terme Similac® 24 ou Similac® 27 offertes dans les bouteilles du Système d'alimentation pour hôpitaux d'Abbott Nutrition.
- Les nourrissons de très faible poids à la naissance sont particulièrement susceptibles de présenter des complications gastro-intestinales; il est donc recommandé de commencer l'alimentation entérale avec prudence. Confirmer la tolérance à l'alimentation entérale en commençant par de petites quantités de préparation hypocalorique, puis passer prudemment à des préparations plus riches en calories. Les signes suivants sont associés à l'administration d'une alimentation entérale avant que le tractus intestinal ne soit prêt : régurgitations, résidus gastriques excessifs, distension abdominale, selles anormales ou autres signes de troubles intestinaux. Dès que l'un de ces symptômes survient, diminuer ou cesser l'alimentation entérale.
- Non indiqué pour administration par voie parentérale.
- À utiliser sous supervision médicale.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Densité calorique élevée : procure 81 Cal par 100 mL (24 Cal par 30 mL).
- Teneur plus élevée en protéines, électrolytes, vitamines et minéraux par 100 Cal que les préparations ordinaires pour nourrissons nés à terme afin de procurer aux prématurés les nutriments dont ils ont besoin pour leur croissance et leur développement.
- Calcium et phosphore aux concentrations nécessaires pour atteindre des taux sériques de ces minéraux semblables aux taux intra-utérins.
- Teneurs équivalentes en lactose et en polymères de glucose.
- Environ 49 % de lipides sous forme de triglycérides à chaîne moyenne, source de lipides faciles à digérer et bien absorbés[2].
- Contient du DHA (0,25 %†), un acide gras oméga-3, et de l'ARA (0,4 %†), un acide gras oméga-6, qui contribuent au développement normal du cerveau et des yeux.
- Enrichi de taurine et de carnitine pour aider à fournir les quantités normalement présentes dans le lait maternel[3-5].
- Contient un mélange breveté de nucléotides, conçu pour être semblable à celui du lait maternel (72 mg/L).
- Ne contient pas d'oléine d'huile de palme.
- Facile à digérer, comme toutes les préparations pour nourrissons.

DONNÉES TECHNIQUES

	Prêt à servir
Densité calorique (Cal/mL)	0,81
Protéines (% de l'énergie totale)	11,8
Lipides (% de l'énergie totale)	46,9
Glucides (% de l'énergie totale)	41,3
Rapport Cal totales:g d'azote	215:1
Rapport Cal non protéiques:g d'azote	191:1
Eau (g/L)	882
Osmolalité (mOsm/kg d'eau)	285
Charge osmotique rénale (mOsm/L)	226
Viscosité à la température ambiante/lorsque refroidi	S. O.
Diamètre minimal de la sonde pour l'alimentation par gravité/pompe (Fr)	S. O.

† Des acides gras totaux.

RÉFÉRENCES : 1. Lockwood CJ et Lemons JA. Guidelines for Perinatal Care. American Academy of Pediatrics and The American College of Obstetricians and Gynecologists. 6e éd. 2009:280. **2.** Duggan C, Watkins JB et Walker WA. Nutrition in Pediatrics: Standard and Specialized Enteral Formulas. BC Decker Inc. Hamilton. 2008. **3.** Feller AG *et al.* Subnormal concentrations of serum selenium and plasma carnitine in chronically tube-fed patients. *Am J Clin Nutr* 1987;45:476-83. **4.** Fischer MH *et al.* Improved Selenium, Carnitine and Taurine Status in an Enterally Fed Population. *JPEN* 1990;14:270-4. **5.** Bourdet B *et al.* Plasma Free Carnitine Depletion in Polytrauma Patients. *J Nutr Health Aging* 2010;14(3):253.

	Prêt à servir
Hyporésiduel	Oui
Sans gluten	Oui
Cascher	Oui
Halal	Oui

PRÉSENTATION

Prêt à servir

00478-806	Similac® Special Care® 24 avec fer	Bouteilles de verre de 120 mL	48/carton

Les lignes directrices pour la préparation se trouvent à la page 12.

ÉNERGIE

	Par 100 mL	Par 100 Cal	Par 120 mL
ÉNERGIE (Cal [kJ])	81 (340)	100 (418)	97 (408)
PROTÉINES (g)	2,4	3,0	2,9
% de l'énergie totale		11,8	
Arginine (mg)	68	84	82
Cystine (mg)	36	44	43
Histidine (mg)	54	67	65
Isoleucine (mg)	137	169	164
Leucine (mg)	239	295	287
Lysine (mg)	202	249	242
Méthionine (mg)	54	67	65
Phénylalanine (mg)	93	115	112
Tryptophane (mg)	34	42	41
Thréonine (mg)	122	151	146
Valine (mg)	148	183	178
Taurine (mg)	4,9	6,0	5,9
Carnitine (mg)	1,4	1,7	1,66
Nucléotides	7,2	10,6	8,6
Source	Lait écrémé sec, concentré de protéines de lactosérum		
LIPIDES (g)	4,4	5,4	5,3
% de l'énergie totale		46,9	
Acides gras polyinsaturés (g)	0,649	0,801	0,779
Acide linoléique (g)	0,54	0,67	0,65
Acide arachidonique (ARA) (g)	0,018	0,022	0,022
Acide linolénique (g)	0,078	0,096	0,094
Acide docosahexanoïque (DHA) (g)	0,01	0,012	0,012
Rapport oméga-6:oméga-3		6:1	
Acides gras monoinsaturés (g)	0,415	0,512	0,498
Acides gras saturés (g)	3,116	3,847	3,739
Cholestérol (mg)	4,0	5,0	5,0
Source	Huile de triglycérides à chaîne moyenne (TCM), huile de soya, huile de copra, ARA et DHA		
Huile de TCM (% des lipides totaux)		49,3	
GLUCIDES (g)	8,4	10,4	10,1
% de l'énergie totale		41,3	
Fibres alimentaires (g)	-	-	-
Fructooligosaccharides à chaîne courte (FOScc) (g)	-	-	-
Galactooligosaccharides (GOS) (g)	-	-	-
Source	Maltodextrine, lactose		
Acésulfame-potassium (mg)	-	-	-
Sucralose (mg)	-	-	-

VITAMINES

Vitamine A (ER [UI])	244 (814)	302 (1005)	293 (977)
Vitamine D_3 (mcg [UI])	3,95 (158)	4,88 (195)	4,75 (190)
Vitamine E (UI)	2,5	3,1	3,0
Vitamine K_1 (mg)	0,01	0,012	0,012
Vitamine C (mg)	30	37	36
Thiamine (mg)	0,2	0,25	0,24
Riboflavine (mg)	0,5	0,62	0,6
Niacine (mg)	4,0	4,9	4,8
Vitamine B_6 (mg)	0,08	0,10	0,10
Acide folique (mg)	0,035	0,043	0,042
Vitamine B_{12} (mg)	0,00045	0,00056	0,00054
Acide pantothénique (mg)	1,5	1,9	1,8
Biotine (mg)	0,03	0,037	0,036
Choline (mg)	9,9	12,2	11,9
Inositol (mg)	26	32	31

MINÉRAUX

Sodium (mg [mmol])	42 (1,83)	52 (2,25)	50 (2,17)
Potassium (mg [mmol])	99 (2. 54)	122 (3,13)	119 (3,05)
Chlorure (mg [mmol])	77 (2,17)	95 (2,68)	92 (2,61)
Calcium (mg)	122	151	146
Phosphore (mg)	72	89	86
Magnésium (mg)	9	11	11
Fer (mg)	1,5	1,9	1,8
Zinc (mg)	0,9	1,1	1,1
Iode (mg)	0,018	0,022	0,022
Cuivre (mg)	0,11	0,14	0,13
Manganèse (mg)	0,014	0,017	0,017
Sélénium (mg)	0,0018	0,0022	0,0022
Chrome (mg)	-	-	-
Molybdène (mg)	-	-	-

COMPOSITION

Similac® Special Care® 24 (avec fer), prêt à servir :
Eau, maltodextrine, lait écrémé sec, triglycérides à chaîne moyenne (huiles de copra et [ou] de palmiste modifiées), lactose, concentré de protéines de lactosérum, huile de soya, huile de copra, phosphate tricalcique, citrate de sodium, acide ascorbique, citrate de potassium, huile de **M. alpina*, mono- et diglycérides, lécithine de soya, chlorure de magnésium, chlorure de sodium, m-inositol, huile de ***C. cohnii*, carraghénine, sulfate ferreux, taurine, nicotinamide, chlorure de choline, sulfate de zinc, cytidine-5'-monophosphate, guanosine-5'-monophosphate disodique, pantothénate de calcium, acétate de *dl*-α-tocophéryle, uridine-5'-monophosphate disodique, adénosine-5'-monophosphate, L-carnitine, riboflavine, palmitate de vitamine A, sulfate de cuivre, chlorhydrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, bicarbonate de sodium, acide folique, β-carotène, biotine, phylloquinone, iodure de potassium, vitamine D_3, sélénate de sodium, cyanocobalamine.
* Source d'acide arachidonique (ARA). ** Source d'acide docosahexanoïque (DHA).
CONTIENT : Allergènes alimentaires prioritaires : Lait. **Ingrédients associés à des intolérances et (ou) à des sensibilités alimentaires :** Maïs, huile de copra, lactose, autres composants du soya.

Les valeurs sont sujettes à changement. Pour connaître la liste la plus récente des ingrédients, des allergènes et l'information nutritionnelle, consulter l'étiquette ou l'emballage du produit.

SIMILAC® SPECIAL CARE® 24
(AVEC FER)
Préparation enrichie de DHA et d'ARA
Pour les nourrissons prématurés

SUPPLÉMENT AU LAIT HUMAIN SIMILAC®

Pour les nourrissons de faible poids à la naissance

INDICATIONS D'EMPLOI

- Pour les nourrissons prématurés ou de faible poids à la naissance qui sont allaités et qui ont des besoins nutritionnels accrus.
- Supplément nutritionnel à ajouter au lait maternel.
- Peut servir de supplément.
- Pour l'alimentation par voie orale ou par sonde.

Mises en garde :

- Le Supplément au lait humain Similac® est incomplet sur le plan nutritionnel et est conçu pour être ajouté au lait maternel.
- À utiliser sous supervision médicale.
- Bien que cette préparation en poudre soit conçue pour les nourrissons prématurés, elle n'est pas stérile et ne doit pas être donnée aux nourrissons prématurés ou aux nourrissons pouvant présenter des troubles immunitaires, sauf selon les indications et sous la supervision d'un médecin.
- Il faut suivre les procédures de l'hôpital concernant la manipulation sécuritaire du lait maternel.
- Une hygiène, une reconstitution, une dilution, une utilisation ou une conservation inadéquates pourraient entraîner des complications graves.
- Il faut confirmer que le bébé tolère bien l'alimentation entérale en lui donnant de petites quantités de lait maternel non enrichi. Lorsque la tolérance à l'alimentation entérale est établie, ajouter le Supplément au lait humain Similac® au lait maternel.
- Non destiné à l'alimentation des nourrissons de faible poids à la naissance qui ont atteint un poids de 3 600 g (environ 8 lb) ou à utiliser selon les directives d'un médecin.
- Non indiqué pour administration par voie parentérale.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Excellentes augmentations du poids, de la taille et du périmètre crânien, d'après les résultats d'une étude clinique revue par des pairs[1].
- Préservation des effets antibactériens du lait maternel contre *Escherichia coli*, les staphylocoques, les streptocoques du groupe B et *Enterobacter sakazakii* d'après les résultats d'une étude clinique revue par des pairs[2].
- Procure des nutriments supplémentaires (micro- et macronutriments) en complément au lait maternel afin de satisfaire les besoins nutritionnels accrus.
- Faible teneur en fer offrant la possibilité d'ajouter la quantité de fer requise selon les besoins.
- Facile à adapter à la croissance et aux besoins nutritionnels changeants du nourrisson.
- Emballage petit et pratique pour faciliter la préparation.
- Se mélange bien au lait maternel.

DONNÉES TECHNIQUES

	Lait de mère de prématuré + Supplément au lait humain Similac® (50 mL + 0,9 g de poudre)
Densité calorique (Cal/mL)	0,73
Protéines (% de l'énergie totale)	10
Lipides (% de l'énergie totale)	49
Glucides (% de l'énergie totale)	41
Rapport Cal totales:g d'azote	250:1
Rapport Cal non protéiques:g d'azote	57:43
Eau (g/L)	867
Osmolalité (mOsm/kg d'eau)	343
Charge osmotique rénale (mOsm/L)	179,2
Viscosité à la température ambiante/lorsque refroidi	S. O.
Diamètre minimal de la sonde pour l'alimentation par gravité/pompe (Fr)	S. O.
Hyporésiduel	S. O.
Sans gluten	Oui
Cascher	Oui
Halal	Oui

PRÉSENTATION

Poudre

54598-934	Supplément au lait humain Similac®	50 sachets de 0,9 g/boîte	3 boîtes/carton

PRÉPARATION

La poudre doit être mélangée à des quantités mesurées de lait maternel afin de procurer 2 ou 4 Cal supplémentaires par 30 mL, comme indiqué à la page suivante.

RÉFÉRENCES : 1. Barrett-Reis B *et al.* Enhanced Growth of Preterm Infants Fed a New Powdered Human Milk Fortifier: A Randomized, Controlled Trial. *Pediatrics* 2000; 106:581-8. **2.** Chan GM. Effects of Powdered Human Milk Fortifiers on the Antibacterial Actions of Human Milk. *J Perinatol* 2003;23:620-3. **3.** Robbins ST, Meyers R dir. Infant Feedings: Guidelines for Preparation of Human Milk and Formula in Health Care Facilities, 2e éd. Chicago, Ill: American Dietetic Association; 2011:47-51. **4.** Telang S *et al.* Fortifying fresh human milk with commercial powdered milk fortifiers does not affect bacterial growth during 6 hours at room temperature. *J Am Diet Assoc* 2005;105:1567-72.

Tableau de mélange du Supplément au lait humain Similac®

	Calories supplémentaires désirées	Lait de mère de prématuré	Supplément au lait humain Similac®
Concentration initiale	2 Cal/30 mL	50 mL	1 sachet (0,9 g)
Pleine concentration	4 Cal/30 mL	25 mL	1 sachet (0,9 g)

1. Agiter le contenant de lait maternel. Si le lait est congelé, suivre la procédure de l'hôpital ou consulter les suggestions pour décongeler le lait maternel (Biberons de lait maternel, page 41).
2. Si le lait doit être chauffé, il faut le chauffer **avant** d'ajouter le supplément au lait humain Similac®. Pour que la poudre se mélange bien au lait maternel, ce dernier doit être à une température légèrement supérieure à la température ambiante.
3. Verser la quantité désirée de lait maternel dans un contenant stérile.
4. Ajouter le Supplément au lait humain Similac® au lait maternel (selon le tableau de mélange).
5. Agiter doucement et donner au bébé.
6. Pour de meilleurs résultats, on recommande d'ajouter le supplément au lait maternel juste avant le boire. Si l'on prépare des volumes plus importants, il faut suivre les instructions relatives à la conservation ci-dessous.
7. Si le nourrisson est alimenté par sonde, le lait maternel auquel on a ajouté le supplément peut être conservé à la température ambiante (25 °C) de façon sécuritaire pendant un maximum de 4 heures[3,4].

CONSERVATION

- Couvrir immédiatement le lait maternel après l'ajout du supplément.
- Réfrigérer et utiliser dans les 24 heures ou conformément aux procédures normales de l'hôpital pour ce qui est de la conservation du lait maternel.
- Amener à la température ambiante – Ne pas chauffer à nouveau. Le mélange pourrait se séparer; dans ce cas, agiter légèrement.
- Conserver les sachets non utilisés à la température ambiante : craint les températures extrêmes (pour plus de renseignements, consulter les lignes directrices recommandées quant à la conservation des produits nutritionnels d'Abbott Nutrition à la page 14).

ÉNERGIE

	Par 1 sachet (0,9 g)	Par 4 sachets (3,6 g)
ÉNERGIE (Cal [kJ])	3,5 (14,7)	14 (59)
PROTÉINES (g)	0,25	1,00
Arginine (mg)	7,2	28,8
Cystine (mg)	4,4	17,6
Histidine (mg)	6,0	24
Isoleucine (mg)	14,3	57,2
Leucine (mg)	26,7	106,8
Lysine (mg)	22,4	89,6
Méthionine (mg)	6,7	26,8
Phénylalanine (mg)	9,9	39,6
Tryptophane (mg)	4,3	17,2
Thréonine (mg)	15,7	62,8
Valine (mg)	14,7	58,8
Taurine (mg)	-	-
Carnitine (mg)	-	-
Source	Lait écrémé, concentré de protéines de lactosérum	
LIPIDES (g)	0,09	0,36
Acide linoléique (g)	-	-
Source	Huile de triglycérides à chaîne moyenne (TCM)	
GLUCIDES (g)	0,45	1,8
Source	Extrait sec de sirop de maïs	

VITAMINES

Vitamine A (ER [UI])	47 (155)	186 (620)
Vitamine D_3 (mcg [UI])	0,75 (30)	3 (120)
Vitamine E (UI)	0,8	3,2
Vitamine K_1 (mg)	0,002	0,0083
Vitamine C (mg)	6,25	25
Thiamine (mg)	0,058	0,233
Riboflavine (mg)	0,104	0,417
Niacine (mg)	0,89	3,57
Vitamine B_6 (mg)	0,053	0,211
Acide folique (mg)	0,0058	0,023
Vitamine B_{12} (mg)	0,00016	0,00064
Acide pantothénique (mg)	0,375	1,5
Biotine (mg)	0,0065	0,026
Choline (mg)	0,45	1,8
Inositol (mg)	0,96	3,85

MINÉRAUX

Sodium (mg [mmol])	3,8 (0,16)	15 (0,65)
Potassium (mg [mmol])	15,8 (0,4)	63 (1,62)
Chlorure (mg [mmol])	9,5 (0,27)	38 (1,07)
Calcium (mg)	29,3	117
Phosphore (mg)	16,8	67
Magnésium (mg)	1,75	7,0
Fer (mg)	0,08	0,35
Zinc (mg)	0,25	1,0
Iode (mg)	-	-
Cuivre (mg)	0,043	0,170
Manganèse (mg)	0,0018	0,0072
Sélénium (mg)	0,0001	0,0005
Chrome (mg)	-	-
Molybdène (mg)	-	-

COMPOSITION

Supplément au lait humain Similac®, en poudre : Lait écrémé, extrait sec de sirop de maïs, concentré de protéines de lactosérum, huile de triglycérides à chaîne moyenne (TCM) (huile de copra ou de palmiste fractionnée), phosphate tricalcique, citrate de potassium, acide ascorbique, chlorure de magnésium, lécithine de soya, chlorure de sodium, sulfate de zinc, m-inositol, nicotinamide, citrate de sodium, acétate d'α-tocophéryle, pantothénate de calcium, sulfate ferreux, palmitate de vitamine A, sulfate de cuivre, riboflavine, chlorhydrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, vitamine D_3, biotine, acide folique, phylloquinone, sulfate de manganèse, cyanocobalamine, séléniate de sodium.
CONTIENT : Allergènes alimentaires prioritaires : Lait. **Ingrédients associés à des intolérances et (ou) à des sensibilités alimentaires :** Huile de copra, lactose, autres composants du soya.

Les valeurs sont sujettes à changement. Pour connaître la liste la plus récente des ingrédients, des allergènes et l'information nutritionnelle, consulter l'étiquette ou l'emballage du produit.

SUPPLÉMENT AU LAIT HUMAIN SIMILAC®
Pour les nourrissons de faible poids à la naissance

SUPPLÉMENT AU LAIT MATERNEL - COMPOSITION NUTRITIONNELLE ET MANIPULATION DU LAIT MATERNEL†

Par 100 Cal

ÉNERGIE

	Lait de mère de prématuré‡	Supplément au lait humain Similac® + lait de mère de prématuré‡	
		1 sachet + 50 mL	1 sachet + 25 mL
ÉNERGIE (Cal)	100	100	100
Volume (mL)	149	137	127
PROTÉINES (g)	2,10	2,58	2,97
% de l'énergie totale	8	10	12
Source	Lait de mère de prématuré	Lait de mère de prématuré, lait écrémé, concentré de protéines de lactosérum	
LIPIDES (g)	5,80	5,50	5,24
% de l'énergie totale	52	49	47
Source	Lait de mère de prématuré	Lait de mère de prématuré, triglycérides à chaîne moyenne	
Acide linoléique (g)	0,55	0,498	0,455
GLUCIDES (g)	9,9	10,2	10,4
% de l'énergie totale	40	41	42
Source	Lactose	Lactose, extrait sec de sirop de maïs	

VITAMINES

Vitamine A (ER [UI])	174 (581)	283 (944)	374 (1245)
Vitamine D_3 (mcg [UI])	0,08 (3)	2,1 (84)	3,75 (150)
Vitamine E (UI)	1,6	3,6	5,3
Vitamine K_1 (mg)	0,0003	0,006	0,010
Vitamine C (mg)	16	31	44
Thiamine (mg)	0,031	0,185	0,313
Riboflavine (mg)	0,072	0,347	0,574
Niacine (mg)	0,224	2,611	4,587
Vitamine B_6 (mg)	0,022	0,162	0,278
Acide folique (mg)	0,005	0,020	0,032
Vitamine B_{12} (mg)	0,00007	0,0005	0,00085
Acide pantothénique (mg)	0,269	1,256	2,072
Biotine (mg)	0,0006	0,0181	0,0326
Choline (mg)	14	14	14
Inositol (mg)	22,0	22,5	22,9

MINÉRAUX

Sodium (mg [mmol])	37 (1,6)	44 (1,9)	49 (2,1)
Potassium (mg [mmol])	85 (2,2)	119 (3,1)	148 (3,8)
Chlorure (mg [mmol])	82 (2,3)	100 (2,8)	115 (3,2)
Calcium (mg)	37	112	175
Phosphore (mg)	19	62	98
Magnésium (mg)	4,6	8,9	12,4
Fer (mg)	0,18	0,40	0,6
Zinc (mg)	0,51	1,14	1,65
Iode (mg)	0,016	0,014	0,013
Cuivre (mg)	0,096	0,202	0,289
Manganèse (mg)	0,001	0,006	0,010
Sélénium (mg)	0,0022	0,0023	0,0024

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Charge osmotique rénale potentielle (mOsm/L)	18,7	24,5	29,3
Eau (g)	131	119	108
Osmolalité (mOsm/kg d'eau)	290	343	385

Par 1000 mL

ÉNERGIE

	Lait de mère de prématuré‡	Supplément au lait humain Similac® + lait de mère de prématuré‡	
		1 sachet + 50 mL	1 sachet + 25 mL
ÉNERGIE (Cal)	671	731	790
Volume (mL)	1000	1000	1000
PROTÉINES (g)	14,09	18,84	23,46
% de l'énergie totale	8	10	12
Source	Lait de mère de prématuré	Lait de mère de prématuré, lait écrémé, concentré de protéines de lactosérum	
LIPIDES (g)	38,93	40,18	41,41
% de l'énergie totale	52	49	47
Source	Lait de mère de prématuré	Lait de mère de prématuré, triglycérides à chaîne moyenne	
Acide linoléique (g)	3,691	3,642	3,594
GLUCIDES (g)	66,4	74,4	82,2
% de l'énergie totale	40	41	42
Source	Lactose	Lactose, extrait sec de sirop de maïs	

VITAMINES

Vitamine A (ER [UI])	1170 (3899)	2072 (6906)	2950 (9834)
Vitamine D_3 (mcg [UI])	0,5 (20)	15,3 (612)	29,7 (1188)
Vitamine E (UI)	10,7	26,4	41,6
Vitamine K_1 (mg)	0,002	0,0429	0,0828
Vitamine C (mg)	107	229	348
Thiamine (mg)	0,208	1,355	2,471
Riboflavine (mg)	0,483	2,534	4,531
Niacine (mg)	1,503	19,096	36,225
Vitamine B_6 (mg)	0,148	1,187	2,198
Acide folique (mg)	0,033	0,146	0,256
Vitamine B_{12} (mg)	0,00047	0,00362	0,00669
Acide pantothénique (mg)	1,805	9,181	16,364
Biotine (mg)	0,0040	0,1322	0,2571
Choline (mg)	94	102	109
Inositol (mg)	147,7	164,7	181,3

Par 1000 mL

MINÉRAUX

	Lait de mère de prématuré‡	Supplément au lait humain Similac® + lait de mère de prématuré‡	
		1 sachet + 50 mL	1 sachet + 25 mL
Sodium (mg [mmol])	248 (10,8)	319 (13,9)	388 (16,9)
Potassium (mg [mmol])	570 (14,6)	874 (22,4)	1169 (30)
Chlorure (mg [mmol])	550 (15,5)	730 (20,6)	906 (25,6)
Calcium (mg)	248	822	1381
Phosphore (mg)	128	456	777
Magnésium (mg)	30,9	65,0	98,2
Fer (mg)	1,21	2,92	4,58
Zinc (mg)	3,42	8,31	13,07
Iode (mg)	0,107	0,106	0,105
Cuivre (mg)	0,644	1,474	2,283
Manganèse (mg)	0,006	0,041	0,076
Sélénium (mg)	0,0148	0,0170	0,0192

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Charge osmotique rénale potentielle (mOsm/L)	125,6	179,2	231,5
Eau (g)	879	867	856
Osmolalité (mOsm/kg d'eau)	290	343	385

DIRECTIVES CONCERNANT LA MANIPULATION DU LAIT MATERNEL†

EXTRACTION ET TRANSPORT DU LAIT MATERNEL

- Commencer l'extraction mécanique du lait dès que possible après l'accouchement, à l'aide d'un tire-lait électrique de qualité hôpital propre.
- Se laver les mains avant d'extraire ou de pomper le lait.
- Utiliser des contenants et du matériel d'extraction qui ont été préalablement lavés à l'eau savonneuse chaude et rincés. Il est également acceptable de laver l'équipement dans un lave-vaisselle.
- Conserver le lait maternel dans des contenants de plastique de qualité alimentaire (contenants de polypropylène) ou des contenants de verre. Ces contenants doivent être hermétiques.
- Identifier de façon claire et précise le lait maternel remis à l'hôpital, en indiquant notamment le nom du nourrisson, le numéro de dossier médical ainsi que la date et l'heure d'extraction du lait afin de prévenir toute erreur lors de la livraison du lait maternel.
- Conserver le lait maternel lors du transport à une température adéquate (de 2 °C à 6 °C ou 35 °F à 42 °F) pour prévenir la dégradation des éléments nutritifs et minimiser la prolifération des bactéries.

ENTREPOSAGE DU LAIT MATERNEL

- Fournir des congélateurs et des réfrigérateurs réservés à l'entreposage du lait maternel. Garder la nourriture dans un réfrigérateur distinct.
- Conserver le lait en petites quantités pour réduire au minimum le gaspillage. Recommander les quantités à conserver selon l'horaire des boires du bébé.
- Maintenir la température du réfrigérateur entre 2 °C et 4 °C (35 °F et 40 °F) et celle du congélateur à -20 °C (-4 °F).
- Le lait maternel frais peut être conservé en toute sécurité au réfrigérateur pendant une période de 48 heures.
- Le lait maternel auquel on a ajouté un supplément doit être conservé au réfrigérateur et utilisé dans les 24 heures.
- Le lait maternel congelé peut être conservé en toute sécurité dans un congélateur domestique pendant 3 mois et pendant 12 mois dans un congélateur maintenu à une température de -20 °C (-4 °F).
- Le lait maternel décongelé doit être utilisé dans les 24 heures.

BIBERONS DE LAIT MATERNEL

- Les bouteilles, tétines et bouteilles graduées sont destinées à un usage unique.
- Le lait maternel n'étant pas homogénéisé, il est normal que le gras se sépare du reste. La crème, plus épaisse et blanche, montera à la surface.
- Avant de donner le biberon au bébé, faire tourner légèrement le biberon pour mélanger la crème et le lait. Éviter de secouer vigoureusement.
- La couleur du lait varie d'un jour à l'autre, selon l'alimentation de la mère. Il peut être bleuté, jaunâtre ou brunâtre. Le lait maternel décongelé peut avoir une odeur différente du lait maternel frais.
- Utiliser le lait maternel en fonction de la date d'extraction (le lait le plus ancien d'abord).
- Décongeler le lait maternel en le mettant au réfrigérateur ou sous l'eau courante tiède. **Ne jamais** utiliser de four à micro-ondes ou d'eau chaude pour réchauffer ou décongeler le lait maternel.
- Ne pas ajouter de lait maternel chaud à du lait maternel congelé, car cela ferait décongeler partiellement le lait congelé.
- Il n'est pas recommandé de réchauffer le lait maternel destiné à l'alimentation par sonde continue. Il ne faut pas réchauffer le lait pendant plus de 15 minutes s'il est destiné à l'alimentation par voie orale ou par bolus.
- Les méthodes acceptables pour réchauffer les biberons sont le chauffe-biberon électrique et l'eau courante tiède. Le niveau de l'eau ne doit pas dépasser la bague de la tétine ni couvrir le bouchon.
- Jeter toute quantité de lait laissée dans le biberon plus d'une heure après le début de la tétée.

† D'après : Academy of Breastfeeding Medicine, Clinical Protocol 8, Human Milk Storage, 2004. Lawrence RA *et al.* Breastfeeding: A Guide for the Medical Profession, 6e éd. Philadelphie: Elsevier Mosby, 2005. Robbins ST dir. Infant Feedings: Guidelines for Preparation of Formula and Breastmilk in Health Care Facilities. Chicago: American Dietetic Association, 2004.

‡ La composition du lait de mère de prématuré varie selon l'alimentation de la mère, le stade de la lactation et l'heure de la tétée, d'un boire à l'autre et d'une mère à l'autre[1]. Les valeurs pour le lait de mère de nourrisson né à terme ont été utilisées pour l'acide linoléique, la biotine, la choline, l'inositol, le manganèse, l'iode et le sélénium[2]. Les valeurs représentent celles du lait mature de mère de prématuré (et non pas celles du colostrum ou du lait de transition).

RÉFÉRENCES :
1. Meeting the Special Nutrient Needs of Low-Birth-Weight and Premature Infants in the Hospital (A8100). Columbus, Ohio: Abbott Nutrition, Abbott Laboratories, janvier 1998, p 56. **2.** American Academy of Pediatrics Committee on Nutrition: Pediatric Nutrition Handbook, 4e éd. Elk Grove Village: American Academy.

NOTES :

PRÉPARATIONS POUR NOURRISSONS NÉS À TERME

DANS CETTE SECTION

Similac® Advance® avec oméga-3 et oméga-6	46
Similac® Advance® avec oméga-3 et oméga-6 (SAH)	48
Similac® Go & Grow® avec oméga-3 et oméga-6†	50
Similac® Go & Grow®†	52
Similac® avec fer	54
Similac® plus faible en fer	56
Similac® pour bébés sensibles au lactose	58
Similac® pour bébés sensibles au lactose (SAH)	60
Similac® Isomil® avec oméga-3 et oméga-6	62

Suite à la page suivante

PRÉPARATIONS POUR NOURRISSONS NÉS À TERME

DANS CETTE SECTION (suite)

Similac® Isomil® avec oméga-3 et oméga-6 (SAH)	64
Similac® Isomil®	66
Similac® Isomil® (2e Étape)†	68
Similac® PM 60/40	70
Similac® 24 avec fer	72
Similac® 27 avec fer	74
Alimentum®	76
Alimentum® Advance® avec oméga-3 et oméga-6 (SAH)	78

† Les préparations de 2e étape peuvent être données aux nourrissons à partir de l'âge de 6 mois.

AU SUJET DES GOS ET DE LA LUTÉINE

SIMILAC® ADVANCE® EST LA SEULE PRÉPARATION POUR NOURRISSONS ENRICHIE DE GALACTOOLIGOSACCHARIDES (GOS) ET DE LUTÉINE‡

GALACTOOLIGOSACCHARIDES (GOS)

Les galactooligosaccharides (GOS) sont un type d'oligosaccharides. Les oligosaccharides constituent le troisième composant le plus abondant dans le lait maternel[1,2]. Les GOS sont des glucides indigestibles[3] généralement classés comme des prébiotiques.

- Peuvent favoriser la croissance des bonnes bactéries dans l'intestin[4].
- Peuvent favoriser des selles plus molles, semblables à celles des bébés allaités[5].

LUTÉINE

La lutéine est un caroténoïde que l'on trouve couramment dans certains aliments et que le nourrisson obtient du lait maternel[6]. Elle est présente en concentration élevée dans les yeux. De plus, des recherches récentes ont révélé que la lutéine se retrouve dans quatre régions du cerveau[7]. La première année de vie est une étape critique pour le développement du cerveau et des yeux.

- Absorbe la lumière potentiellement dommageable[8,9].
- Peut protéger les yeux contre les dommages causés par le stress oxydatif[8,9].

Jusqu'à ce que les bébés commencent à manger des aliments solides, ils ne pourront obtenir de lutéine que par le lait maternel ou Similac® Advance®‡.

Produits nutritionnels pour enfants d'Abbott Nutrition contenant des GOS et de la lutéine :
Similac® Advance® avec oméga-3 et oméga-6,
Similac® Advance® avec oméga-3 et oméga-6 (SAH),
Similac® Go & Grow® avec oméga-3 et oméga-6.

‡ Excluant la lutéine naturellement présente.

RÉFÉRENCES :
1. Boehm G *et al.* Oligosaccharides from Milk. *J Nutr* 2007;137(suppl 2):847S-9S. **2.** Coppa G *et al.* The first prebiotics in humans: human milk oligosaccharides. *J Clin Gastroenterol* 2004;38(suppl 6):S80-S83. **3.** Gibson GR *et al.* Dietary Modulation of the Human Colonie Microbiota: Introducing the Concept of Prebiotics. *J Nutr* 1995;125:1401-12. **4.** Ben XM *et al.* Supplementation of milk formula with galacto-oligosaccharides improves intestinal micro-flora and fermentation in term infants. *Chin Med J (Engl)* 2004;117:927-31. **5.** Williams T *et al.* Safety and Tolerance of Infant Formulas Containing Prebiotics in Healthy Term Infants. *Microb Ecol* 2009;57:584-5. Abstract. **6.** Canfield LM *et al.* Multinational study of major breast milk carotenoids of healthy mothers. *Eur J Nutr* 2003;42:133-41. **7.** Vishwanathan R *et al.* Lutein is the predominant carotenoid in the infant brain: Proceedings 16th International Symposium on Carotenoids, Krakow, Pologne, 17-22 juillet 2011. Affiche 1.23. **8.** Krinsky NI *et al.* Biologic Mechanisms of the Protective Role of Lutein and Zeaxanthin in the Eye. *Ann Rev Nutr* 2003;23:171-201. **9.** Chucair AJ *et al.* Lutein and Zeaxanthin Protect Photoreceptors from Apoptosis Induced by Oxidative Stress: Relation with Docosahexaenoic Acid. *Invest Ophthalmol Vis Sci* 2007;48:5168-77.

SIMILAC® ADVANCE®
AVEC OMÉGA-3 ET OMÉGA-6

Préparation de 1re étape enrichie de DHA et d'ARA

Pour les nourrissons nés à terme, dès la naissance

La seule préparation contenant des galactooligosaccharides et de la lutéine†
Maintenant offert dans un nouvel emballage

INDICATIONS D'EMPLOI

- Pour les nourrissons nés à terme et en bonne santé qui ont besoin d'un complément au lait maternel.
- Pour les nourrissons nés à terme et en bonne santé qui ne sont pas allaités.
- Pour l'alimentation initiale ou comme supplément.
- Pour l'alimentation par voie orale ou par sonde.

Mise en garde :

- Non indiqué pour administration par voie parentérale.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Contient 4 g/L de galactooligosaccharides (GOS). Donner une préparation pour nourrissons enrichie de galactooligosaccharides peut favoriser la croissance des bactéries bénéfiques dans l'intestin et des selles plus molles, semblables à celles des bébés allaités[1-3].
- Contient de la lutéine. La lutéine est un antioxydant présent naturellement dans le lait maternel. La lutéine absorbe la lumière potentiellement dommageable et peut protéger les yeux contre les dommages causés par le stress oxydatif[4-8].
- Contient du DHA (0,20 %†), un acide gras oméga-3, et de l'ARA (0,4 %†), un acide gras oméga-6, qui contribuent au développement normal du cerveau et des yeux[9].
- Contient un mélange breveté de nucléotides (72 mg/L).
- Ne contient pas d'oléine d'huile de palme.
- Facile à digérer, comme toutes les préparations pour nourrissons.

DONNÉES TECHNIQUES

	Prêt à servir	Liquide concentré (dilution normale)	Poudre (dilution normale)
Densité calorique (Cal/mL)	0,68	0,68	0,68
Protéines (% de l'énergie totale)	8,3	8,2	8,3
Lipides (% de l'énergie totale)	49,3	48,2	49,9
Glucides (% de l'énergie totale)	42,4	43,6	41,8
Rapport Cal totales:g d'azote	304:1	309:1	309:1
Rapport Cal non protéiques:g d'azote	277:1	289:1	284:1
Eau (g/L)	901	900	901
Osmolalité (mOsm/kg d'eau)	330	368,5	303
Charge osmotique rénale (mOsm/L)	112	131	97
Viscosité à la température ambiante/lorsque refroidi	S. O.	S. O.	S. O.
Diamètre minimal de la sonde pour l'alimentation par gravité/pompe (Fr)	S. O.	S. O.	S. O.
Hyporésiduel	Oui	Oui	Oui
Sans gluten	Oui	Oui	Oui
Cascher	Oui	Oui	Oui
Halal	Oui	Oui	Oui

PRÉSENTATION

Prêt à servir

0S177-570	Similac® Advance® avec oméga-3 et oméga-6	Boîtes de 235 mL	12/carton
0S177-848	Similac® Advance® avec oméga-3 et oméga-6	6 boîtes de 235 mL	4/carton
53604-332	Similac® Advance® avec oméga-3 et oméga-6	Bouteilles de plastique de 945 mL avec bouchon refermable	6/carton

Liquide concentré

53601-510	Similac® Advance® avec oméga-3 et oméga-6	Boîtes de 385 mL	12/carton

Poudre

0S172-706	Similac® Advance® avec oméga-3 et oméga-6	Boîtes de 365 g	12/carton
NOUVEAU FORMAT 62645-30B	Similac® Advance® avec oméga-3 et oméga-6	Contenants de 658 g	6/carton

Les lignes directrices pour la préparation se trouvent à la page 12.

† Excluant la lutéine naturellement présente. ‡ Des acides gras totaux.

RÉFÉRENCES : 1. Ben XM *et al.* Supplementation of milk formula with galacto-oligosaccharides improves intestinal micro-flora and fermentation in term infants. *Chin Med J (Engl)* 2004;117:927-31. **2.** Ben XM *et al.* Low level of galacto-oligosaccharide in infant formula stimulates growth of intestinal Bifidobacteria and Lactobacilli. *World J Gastroenterol* 2008; 14(42):6564-8. **3.** Williams T *et al.* Safety and Tolerance of Infant Formulas Containing Prebiotics in Healthy Term Infants. *Microb Ecol* 2009;57:584-5. Abstract. **4.** Krinsky NI *et al.* Biologic Mechanisms of the Protective Role of Lutein and Zeaxanthin in the Eye. *Ann Rev Nutr* 2003;23:171-201. **5.** Chucair AJ *et al.* Lutein and Zeaxanthin Protect Photoreceptors from Apoptosis Induced by Oxidative Stress: Relation with Docosahexaenoic Acid. *Invest Ophthalmol Vis Sci* 2007;48:5168-77. **6.** Hammond BR. Possible role for dietary lutein and zeaxanthin in visual development. *Nutr Rev* 2008; 66(12):695-702. **7.** Zimmer JP *et al.* Possible influences of lutein and zeaxanthin on the developing retina. *Clin Ophtalmol* 2007;1:25-35. **8.** Perrone SP *et al.* Effects of Lutein on Oxidative Stress in the Term Newborn: A Pilot Study. *Neonatology* 2010;97:36-40. **9.** Agence canadienne d'inspection des aliments. Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments : Allégations santé (chap. 8). Consulté le 28 novembre 2012 au http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/guide/ch8f.pdf.

INFORMATION NUTRITIONNELLE

ÉNERGIE

	Par 100 g Poudre	Par 100 mL (dilution normale)	Par 100 Cal
ÉNERGIE (Cal [kJ])	509 (2130)	68 (283)	100 (418)
PROTÉINES (g)	10,6	1,4	2,1
% de l'énergie totale		8,3	
Arginine (mg)	310	40	59
Cystine (mg)	150	20	29
Histidine (mg)	250	30	44
Isoleucine (mg)	580	80	118
Leucine (mg)	1080	140	206
Lysine (mg)	880	120	176
Méthionine (mg)	290	40	59
Phénylalanine (mg)	450	60	88
Tryptophane (mg)	180	24	35
Thréonine (mg)	600	80	118
Valine (mg)	640	80	118
Taurine (mg)	34	4,5	6,6
Carnitine (mg)	7,5	1,0	1,5
Nucléotides (mg)	54,5	7,2	10,6
Source	Lait écrémé, concentré de protéines de lactosérum, hydrolysat de protéines de lactosérum		
LIPIDES (g)	28,2	3,74	5,5
% de l'énergie totale		49,9	
Acides gras polyinsaturés (g)	7,1	0,9	1,3
Acide linoléique (g)	3,97	0,53	0,77
Acide arachidonique (ARA) (g)	0,107	0,0142	0,021
Acide linolénique (g)	0,38	0,05	0,074
Acide docosahexanoïque (DHA) (g)	0,051	0,0068	0,01
Rapport oméga-6:oméga-3		9,71:1	
Acides gras monoinsaturés (g)	11,4	1,5	2,2
Acides gras saturés (g)	9,7	1,3	1,9
Cholestérol (mg)	-	-	-
Source	Huile de tournesol riche en acide oléique, huile de soya, huile de copra, ARA et DHA		
Huile de TCM (% des lipides totaux)		0,0	
GLUCIDES (g)	55,0	7,3	10,7
% de l'énergie totale		41,8	
Fibres alimentaires (g)	-	-	-
Fructooligosaccharides à chaîne courte (FOSsc) (g)	-	-	-
Galactooligosaccharides (GOS)†† (g)	2,7	0,4	0,6
Source	Lactose, galactooligosaccharides		
Acésulfame-potassium (mg)	-	-	-
Sucralose (mg)	-	-	-

VITAMINES

Vitamine A (ER [UI])	430 (1433)	57 (190)	83 (278)
Vitamine D_3 (mcg [UI])	7,63 (305)	1,01 (40,5)	1,49 (60)
Vitamine E (UI)	20,3	2,7	4,0
Vitamine K_1 (mg)	0,068	0,009	0,013
Vitamine C (mg)	76	10	15
Thiamine (mg)	0,6	0,08	0,12
Riboflavine (mg)	0,8	0,11	0,16
Niacine (mg)	5,4	0,72	1,06
Vitamine B_6 (mg)	0,31	0,04	0,06
Acide folique (mg)	0,052	0,007	0,010
Vitamine B_{12} (mg)	0,0013	0,0002	0,00025
Acide pantothénique (mg)	2,3	0,3	0,4
Biotine (mg)	0,019	0,003	0,0037
Choline (mg)	76	10	15
Inositol (mg)	30	4	6
Lutéine (mg)	0,057	0,0076	0,0112

MINÉRAUX

Sodium (mg [mmol])	135 (5,87)	18 (0,78)	27 (1,15)
Potassium (mg [mmol])	600 (15,38)	80 (2,05)	118 (3,02)
Chlorure (mg [mmol])	333 (9,39)	44 (1,24)	65 (1,83)
Calcium (mg)	400	53	78
Phosphore (mg)	216	29	43
Magnésium (mg)	39	5,2	7,6
Fer (mg)	9,1	1,2	1,8
Zinc (mg)	3,8	0,5	0,7
Iode (mg)	0,100	0,013	0,019
Cuivre (mg)	0,400	0,05	0,074
Manganèse (mg)	0,0363	0,005	0,0074
Sélénium (mg)	0,010	0,0013	0,0019
Chrome (mg)	-	-	-
Molybdène (mg)	-	-	-

Information nutritionnelle pour Similac® Advance® avec oméga-3 et oméga-6, en poudre
†† Les GOS représentent environ 1 % de l'apport énergétique total et procurent environ 1,3 Cal/g.

COMPOSITION

Similac® Advance® avec oméga-3 et oméga-6, en poudre : Lactose, lait écrémé sec, huile de carthame riche en acide oléique ou huile de tournesol riche en acide oléique, huile de soya, huile de copra, galactooligosaccharides (GOS), concentré de protéines de lactosérum, hydrolysat de protéines de lactosérum, citrate de potassium, carbonate de calcium, huile de *M. alpina, phosphate tricalcique, hydroxyde de potassium, huile de **C. cohnii, chlorure de magnésium, chlorure de sodium, bitartrate de choline, acide ascorbique, lécithine de soya, L-tryptophane, sulfate ferreux, taurine, m-inositol, cytidine-5'-monophosphate, guanosine-5'-monophosphate disodique, palmitate d'ascorbyle, uridine-5'-monophosphate disodique, sulfate de zinc, acétate de *dl*-α-tocophéryle, adénosine-5'-monophosphate, L-carnitine, mélange de tocophérols, nicotinamide, d-pantothénate de calcium, sulfate de cuivre, palmitate de vitamine A, chlorhydrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, lutéine, acide folique, sulfate de manganèse, β-carotène, phylloquinone, biotine, séléniate de sodium, iodure de potassium, vitamine D_3, cyanocobalamine.

Similac® Advance® avec oméga-3 et oméga-6, en liquide concentré : Eau, lactose, lait écrémé évaporé ou sec, huile de carthame riche en acide oléique ou huile de tournesol riche en acide oléique, huile de copra, huile de soya, galactooligosaccharides (GOS), concentré de protéines de lactosérum, citrate de potassium, carbonate de calcium, monoglycérides, lécithine de soya, huile de *M. alpina, chlorure de potassium, huile de **C. cohnii, acide ascorbique, bitartrate de choline, L-tryptophane, carraghénine, chlorure de magnésium, taurine, sulfate ferreux, m-inositol, cytidine-5'-monophosphate, acétate de *dl*-α-tocophéryle, guanosine-5'-monophosphate disodique, sulfate de zinc, uridine-5'-monophosphate disodique, adénosine-5'monophosphate, nicotinamide, L-carnitine, pantothénate de calcium, sulfate de cuivre, palmitate de vitamine A, chlorhydrate de chlorure de thiamine, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, acide folique, sulfate de manganèse, phylloquinone, lutéine, biotine, β-carotène, séléniate de sodium, vitamine D_3, cyanocobalamine.

Similac® Advance® avec oméga-3 et oméga-6, prêt à servir : Eau, lactose, lait écrémé sec, huile de carthame riche en acide oléique ou huile de tournesol riche en acide oléique, huile de soya, huile de copra, galactooligosaccharides (GOS), concentré de protéines de lactosérum, citrate de potassium, huile de *M. alpina, carbonate de calcium, monoglycérides, lécithine de soya, ascorbate de sodium, huile de **C. cohnii, carraghénine, bitartrate de choline, chlorure de potassium, chlorure de sodium, phosphate dipotassique, sulfate ferreux, chlorure de magnésium, taurine, m-inositol, cytidine-5'-monophosphate, guanosine-5'-monophosphate disodique, uridine-5'-monophosphate disodique, acétate de *dl*-α-tocophéryle, sulfate de zinc, L-tryptophane, L-carnitine, adénosine-5'-monophosphate, nicotinamide, d-pantothénate de calcium, sulfate de cuivre, palmitate de vitamine A, chlorhydrate de thiamine, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, acide folique, lutéine, phylloquinone, β-carotène, sulfate de manganèse, biotine, vitamine D_3, cyanocobalamine.

CONTIENT : Allergènes alimentaires prioritaires : Lait. **Ingrédients associés à des intolérances et (ou) à des sensibilités alimentaires :** Huile de copra, lactose, autres composants du soya.

* Source d'acide arachidonique (ARA). ** Source d'acide docosahexanoïque (DHA).

Les valeurs sont sujettes à changement. Pour connaître la liste la plus récente des ingrédients, des allergènes et l'information nutritionnelle, consulter l'étiquette ou l'emballage du produit.

SIMILAC® ADVANCE®
AVEC OMÉGA-3 ET OMÉGA-6
Préparation de 1re étape enrichie de DHA et d'ARA
Pour les nourrissons nés à terme, dès la naissance

SIMILAC® ADVANCE®
AVEC OMÉGA-3 ET OMÉGA-6

Préparation de 1re étape enrichie de DHA et d'ARA

Pour les nourrissons nés à terme, dès la naissance

Seule préparation contenant des galactooligosaccharides et de la lutéine†

INDICATIONS D'EMPLOI

- Pour les nourrissons nés à terme et en bonne santé qui ont besoin d'un complément au lait maternel.
- Pour les nourrissons nés à terme et en bonne santé qui ne sont pas allaités.
- Pour l'alimentation initiale ou comme supplément.
- Pour l'alimentation par voie orale ou par sonde.

Mise en garde :

- Non indiqué pour administration par voie parentérale.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Contient 4 g/L de galactooligosaccharides (GOS). Donner une préparation pour nourrissons enrichie de galactooligosaccharides peut favoriser la croissance des bactéries bénéfiques dans l'intestin et des selles plus molles, semblables à celles des bébés allaités[1-3].
- Contient de la lutéine. La lutéine absorbe la lumière potentiellement dommageable et peut protéger les yeux contre les dommages causés par le stress oxydatif[4-8].
- Contient du DHA (0,20 %‡), un acide gras oméga-3, et de l'ARA (0,4 %‡), un acide gras oméga-6, qui contribuent au développement normal du cerveau et des yeux.
- Contribue à une croissance semblable à celle des nourrissons allaités[9,10].
- Contient un mélange breveté de nucléotides, conçu pour être semblable à celui du lait maternel (72 mg/L).
- Ne contient pas d'oléine d'huile de palme.
- Facile à digérer, comme toutes les préparations pour nourrissons.

DONNÉES TECHNIQUES

	Prêt à servir
Densité calorique (Cal/mL)	0,68
Protéines (% de l'énergie totale)	8,3
Lipides (% de l'énergie totale)	49,3
Glucides (% de l'énergie totale)	42,4
Rapport Cal totales:g d'azote	304:1
Rapport Cal non protéiques:g d'azote	277:1
Eau (g/L)	900
Osmolalité (mOsm/kg d'eau)	306
Charge osmotique rénale (mOsm/L)	127
Viscosité à la température ambiante/lorsque refroidi	S. O.
Diamètre minimal de la sonde pour l'alimentation par gravité/pompe (Fr)	S. O.
Hyporésiduel	Oui
Sans gluten	Oui
Cascher	Oui
Halal	Oui

PRÉSENTATION

Prêt à servir

62434-871	Similac® Advance® avec oméga-3 et oméga-6	8 bouteilles de plastique de 59 mL	6/carton

Les lignes directrices pour la préparation se trouvent à la page 12.

† Excluant la lutéine naturellement présente. ‡ Des acides gras totaux.

RÉFÉRENCES :

1. Ben XM *et al.* Supplementation of milk formula with galacto-oligosaccharides improves intestinal micro-flora and fermentation in term infants. *Chin Med J (Engl)* 2004;117:927-31. **2.** Ben XM *et al.* Low level of galacto-oligosaccharide in infant formula stimulates growth of intestinal Bifidobacteria and Lactobacilli. *World J Gastroenterol* 2008; 14(42):6564-8. **3.** Williams T *et al.* Safety and Tolerance of Infant Formulas Containing Prebiotics in Healthy Term Infants. *Microb Ecol* 2009;57:584-5. Abstract. **4.** Krinsky NI *et al.* Biologic Mechanisms of the Protective Role of Lutein and Zeaxanthin in the Eye. *Ann Rev Nutr* 2003;23:171-201. **5.** Chucair AJ *et al.* Lutein and Zeaxanthin Protect Photoreceptors from Apoptosis Induced by Oxidative Stress: Relation with Docosahexaenoic Acid. *Invest Ophthalmol Vis Sci* 2007;48:5168-77. **6.** Hammond BR. Possible role for dietary lutein and zeaxanthin in visual development. *Nutr Rev* 2008; 66(12):695-702. **7.** Zimmer JP *et al.* Possible influences of lutein and zeaxanthin on the developing retina. *Clin Ophtalmol* 2007;1:25-35. **8.** Perrone SP *et al.* Effects of Lutein on Oxidative Stress in the Term Newborn: A Pilot Study. *Neonatology* 2010;97:36-40. **9.** Auestad N *et al.* Visual Acuity, Erythrocyte Fatty Acid Composition and Growth in Term Infants Fed Formulas with Long Chain Polyunsaturated Fatty Acids for One Year. *Pediatric Research* 1997;41(1):1-10. **10.** Auestad N *et al.* Growth and Development in Term Infants Fed Long-Chain Polyunsaturated Fatty Acids: A Double-Masked, Randomized, Parallel, Prospective, Multivariate Study. *Pediatrics* 2001;108:372-81.

INFORMATION NUTRITIONNELLE

ÉNERGIE

	Par 100 mL	Par 100 Cal	Par 59 mL
ÉNERGIE (Cal [kJ])	68 (283)	100 (418)	40 (168)
PROTÉINES (g)	1,4	2,1	0,8
% de l'énergie totale		8,3	
Arginine (mg)	46	68	27
Cystine (mg)	21	31	12
Histidine (mg)	35	51	21
Isoleucine (mg)	83	122	49
Leucine (mg)	145	213	86
Lysine (mg)	119	175	70
Méthionine (mg)	34	50	20
Phénylalanine (mg)	60	88	35
Tryptophane (mg)	22,4	33,1	13
Thréonine (mg)	78	113	46
Valine (mg)	93	137	55
Taurine (mg)	4,1	6,1	2,4
Carnitine (mg)	0,82	1,2	0,5
Nucléotides (mg)	-	-	-
Source	Lait écrémé, concentré de protéines de lactosérum		
LIPIDES (g)	3,71	5,5	2,19
% de l'énergie totale		49,3	
Acides gras polyinsaturés (g)	0,807	1,187	0,476
Acide linoléique (g)	0,653	0,960	0,385
Acide arachidonique (ARA) (g)	0,013	0,019	0,008
Acide linolénique (g)	0,063	0,093	0,037
Acide docosahexanoïque (DHA) (g)	0,0071	0,0104	0,0042
Rapport oméga-6:oméga-3		10,0:1	
Acides gras monoinsaturés (g)	1,52	2,24	0,90
Acides gras saturés (g)	1,252	1,841	0,739
Cholestérol (mg)	2,0	2,9	1,2
Source	Huile de carthame riche en acide oléique, huile de soya, huile de copra, ARA et DHA		
Huile de TCM (% des lipides totaux)		0,0	
GLUCIDES (g)	7,41	11,0	4,37
% de l'énergie totale		42,4	
Fibres alimentaires (g)	-	-	-
Fructooligosaccharides à chaîne courte (FOScc) (g)	-	-	-
Galactooligosaccharides (GOS)†† (g)	0,40	0,59	0,24
Source	Lactose, galactooligosaccharides		
Acésulfame-potassium (mg)	-	-	-
Sucralose (mg)	-	-	-

VITAMINES

Vitamine A (ER [UI])	61 (203)	90 (300)	36 (120)
Vitamine D_3 (mcg [UI])	0,9 (35)	1,33 (52)	0,52 (21)
Vitamine E (UI)	2,5	3,7	1,5
Vitamine K_1 (mg)	0,0083	0,0122	0,0049
Vitamine C (mg)	9,0	13,2	5,3
Thiamine (mg)	0,064	0,094	0,038
Riboflavine (mg)	0,110	0,163	0,065
Niacine (mg)	0,45	0,67	0,27
Vitamine B_6 (mg)	0,054	0,080	0,032
Acide folique (mg)	0,0095	0,0141	0,0056
Vitamine B_{12} (mg)	0,00023	0,00034	0,00014
Acide pantothénique (mg)	0,40	0,59	0,24
Biotine (mg)	0,0025	0,0037	0,0015
Choline (mg)	9,8	14,5	5,8
Inositol (mg)	3,8	5,6	2,2
Lutéine (mg)	0,0053	0,0078	0,0031

MINÉRAUX

Sodium (mg [mmol])	18 (0,78)	27 (1,15)	11 (0,48)
Potassium (mg [mmol])	79 (2,03)	117 (3,00)	47 (1,20)
Chlorure (mg [mmol])	40 (1,24)	59 (1,83)	24 (0,67)
Calcium (mg)	53	78	31
Phosphore (mg)	26	39	15
Magnésium (mg)	4,1	6,1	2,4
Fer (mg)	1,1	1,63	0,6
Zinc (mg)	0,45	0,67	0,27
Iode (mg)	0,009	0,013	0,005
Cuivre (mg)	0,047	0,070	0,028
Manganèse (mg)	0,004	0,0059	0,0024
Sélénium (mg)	0,0008	0,0012	0,0005
Chrome (mg)	-	-	-
Molybdène (mg)	-	-	-

†† Les GOS représentent environ 1 % de l'apport énergétique total et procurent environ 1,3 Cal/g.

COMPOSITION

Similac® Advance® avec oméga-3 et oméga-6, prêt à servir :
Eau, lactose, lait écrémé sec, huile de carthame riche en acide oléique, huile de soya, galactooligosaccharides (GOS), huile de copra, concentré de protéines de lactosérum, acide ascorbique, citrate de potassium, carbonate de calcium, huile de *M. alpina*, monoglycérides, lécithine de soya, huile de **C. cohnii*, carraghénine, chlorure de potassium, chlorure de sodium, phosphate de potassium, chlorure de magnésium, sulfate ferreux, bitartrate de choline, chlorure de choline, taurine, m-inositol, cytidine-5'-monophosphate, citrate de sodium, acétate de *dl*-α-tocophéryle, L-tryptophane, sulfate de zinc, guanosine-5'-monophosphate disodicique, uridine-5'-monophosphate disodique, adénosine-5'-monophosphate, nicotinamide, L-carnitine, d-pantothénate de calcium, sulfate de cuivre, palmitate de vitamine A, chlorhydrate de thiamine, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, acide folique, lutéine, sulfate de manganèse, phylloquinone, β-carotène, biotine, vitamine D_3, cyanocobalamine. Peut contenir de l'hydroxide de potassium, de l'acide citrique, du sulfate de magnésium, de l'iodure de potassium et du sélénate de sodium.
* Source d'acide arachidonique (ARA).
** Source d'acide docosahexanoïque (DHA).
CONTIENT : Allergènes alimentaires prioritaires : Lait. **Ingrédients associés à des intolérances et (ou) à des sensibilités alimentaires :** Huile de copra, lactose, autres composants du soya.

Les valeurs sont sujettes à changement. Pour connaître la liste la plus récente des ingrédients, des allergènes et l'information nutritionnelle, consulter l'étiquette ou l'emballage du produit.

SIMILAC® ADVANCE®
AVEC OMÉGA-3 ET OMÉGA-6
Préparation de 1re étape enrichie de DHA et d'ARA
Pour les nourrissons nés à terme, dès la naissance

SIMILAC® GO & GROW®
AVEC OMÉGA-3 ET OMÉGA-6

Préparation de 2e étape enrichie de DHA et d'ARA

Pour les nourrissons et tout-petits de 6 à 24 mois

La seule préparation de 2e étape contenant des galactooligosaccharides et de la lutéine†
Maintenant offert dans un nouvel emballage

INDICATIONS D'EMPLOI

- Préparation de transition pour les nourrissons nés à terme et en santé, de 6 mois ou plus.
- Pour l'alimentation par voie orale ou par sonde.

Mise en garde :

- Non indiqué pour administration par voie parentérale.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Spécialement conçu pour aider à satisfaire les besoins nutritionnels qui ne sont pas toujours comblés lors de la transition aux aliments solides.
- Enrichi de calcium (contient 50 % plus de calcium que Similac® Advance® avec oméga-3 et oméga-6) pour répondre aux besoins des bébés en pleine croissance.
- Contient 4 g/L de galactooligosaccharides (GOS). Donner une préparation pour nourrissons enrichie de galactooligosaccharides peut favoriser la croissance des bactéries bénéfiques dans l'intestin et des selles plus molles, semblables à celles des bébés allaités[1-3].
- Contient de la lutéine. La lutéine est un antioxydant présent naturellement dans le lait maternel. La lutéine absorbe la lumière potentiellement dommageable et peut protéger les yeux contre les dommages causés par le stress oxydatif[4-8].
- Contient du DHA (0,20 %‡), un acide gras oméga-3, et de l'ARA (0,4 %‡), un acide gras oméga-6, qui contribuent au développement normal du cerveau et des yeux[9].
- Contient un mélange breveté de nucléotides (72 mg/L).
- Ne contient pas d'oléine d'huile de palme.
- Facile à digérer, comme toutes les préparations pour nourrissons.

DONNÉES TECHNIQUES

	Liquide concentré (dilution normale)	**Poudre** (dilution normale)
Densité calorique (Cal/mL)	0,68	0,68
Protéines (% de l'énergie totale)	8,2	8,3
Lipides (% de l'énergie totale)	48,2	49,9
Glucides (% de l'énergie totale)	43,6	41,8
Rapport Cal totales:g d'azote	309,2:1	309:1
Rapport Cal non protéiques:g d'azote	283,8:1	284:1
Eau (g/L)	900	901
Osmolalité (mOsm/kg d'eau)	368,5	303
Charge osmotique rénale (mOsm/L)	131	97
Viscosité à la température ambiante/lorsque refroidi	S. O.	S. O.
Diamètre minimal de la sonde pour l'alimentation par gravité/pompe (Fr)	S. O.	S. O.
Hyporésiduel	Oui	Oui
Sans gluten	Oui	Oui
Cascher	Oui	Oui
Halal	Oui	Oui

PRÉSENTATION

Liquide concentré

53606-510	Similac® Go & Grow® avec oméga-3 et oméga-6	Boîtes de 385 mL	12/carton

Poudre

NOUVEAU FORMAT 62654-30B	Similac® Go & Grow® avec oméga-3 et oméga-6	Contenants de 658 g	6/carton

Les lignes directrices pour la préparation se trouvent à la page 12.

† Excluant la lutéine naturellement présente. ‡ Des acides gras totaux.

RÉFÉRENCES :

1. Ben XM *et al.* Supplementation of milk formula with galacto-oligosaccharides improves intestinal micro-flora and fermentation in term infants. *Chin Med J (Engl)* 2004;117:927-31. **2.** Ben XM *et al.* Low level of galacto-oligosaccharide in infant formula stimulates growth of intestinal Bifidobacteria and Lactobacilli. *World J Gastroenterol* 2008; 14(42):6564-8. **3.** Williams T *et al.* Safety and Tolerance of Infant Formulas Containing Prebiotics in Healthy Term Infants. *Microb Ecol* 2009;57:584-5. Abstract. **4.** Krinsky NI *et al.* Biologic Mechanisms of the Protective Role of Lutein and Zeaxanthin in the Eye. *Ann Rev Nutr* 2003;23:171-201. **5.** Chucair AJ *et al.* Lutein and Zeaxanthin Protect Photoreceptors from Apoptosis Induced by Oxidative Stress: Relation with Docosahexaenoic Acid. *Invest Ophthalmol Vis Sci* 2007;48:5168-77. **6.** Hammond BR. Possible role for dietary lutein and zeaxanthin in visual development. *Nutr Rev* 2008; 66(12):695-702. **7.** Zimmer JP *et al.* Possible influences of lutein and zeaxanthin on the developing retina. *Clin Ophtalmol* 2007;1:25-35. **8.** Perrone SP *et al.* Effects of Lutein on Oxidative Stress in the Term Newborn: A Pilot Study. *Neonatology* 2010;97:36-40. **9.** Agence canadienne d'inspection des aliments. Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments : Allégations santé (chap. 8). Consulté le 28 novembre 2012 au http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/guide/ch8f.pdf.

INFORMATION NUTRITIONNELLE

ÉNERGIE

	Par 100 g Poudre	Par 100 mL (dilution normale)	Par 100 Cal
ÉNERGIE (Cal [kJ])	509 (2130)	68 (283)	100 (418)
PROTÉINES (g)	10,6	1,4	2,1
% de l'énergie totale		8,3	
Arginine (mg)	310	40	59
Cystine (mg)	150	20	29
Histidine (mg)	250	30	44
Isoleucine (mg)	580	80	118
Leucine (mg)	1080	140	206
Lysine (mg)	880	120	176
Méthionine (mg)	290	40	59
Phénylalanine (mg)	450	60	88
Tryptophane (mg)	180	24	35
Thréonine (mg)	600	80	118
Valine (mg)	640	80	118
Taurine (mg)	34	4,5	6,6
Carnitine (mg)	7,5	1,0	1,5
Nucléotides (mg)	54,5	7,2	10,6
Source	Lait écrémé, concentré de protéines de lactosérum, hydrolysat de protéines de lactosérum		
LIPIDES (g)	28,2	3,74	5,5
% de l'énergie totale		49,9	
Acides gras polyinsaturés (g)	7,1	0,9	1,3
Acide linoléique (g)	3,97	0,53	0,76
Acide arachidonique (ARA) (g)	0,107	0,0142	0,021
Acide linolénique (g)	0,38	0,05	0,074
Acide docosahexanoïque (DHA) (g)	0,051	0,0068	0,01
Rapport oméga-6:oméga-3		9,71:1	
Acides gras monoinsaturés (g)	11,4	1,5	2,2
Acides gras saturés (g)	9,7	1,3	1,9
Cholestérol (mg)	-	-	-
Source	Huile de tournesol riche en acide oléique, huile de soya, huile de copra, ARA et DHA		
Huile de TCM (% des lipides totaux)		0,0	
GLUCIDES (g)	55,0	7,4	10,9
% de l'énergie totale		41,8	
Fibres alimentaires (g)	-	-	-
Fructooligosaccharides à chaîne courte (FOScc) (g)	-	-	-
Galactooligosaccharides (GOS)†† (g)	2,7	0,4	0,6
Source	Lactose, galactooligosaccharides		
Acésulfame-potassium (mg)	-	-	-
Sucralose (mg)	-	-	-

VITAMINES

Vitamine A (ER [UI])	430 (1433)	57 (190)	83 (278)
Vitamine D_3 (mcg [UI])	7,63 (305)	1,01 (40,5)	1,49 (60)
Vitamine E (UI)	20,3	2,7	4,0
Vitamine K_1 (mg)	0,068	0,009	0,013
Vitamine C (mg)	76	10	15
Thiamine (mg)	0,6	0,08	0,12
Riboflavine (mg)	0,8	0,11	0,16
Niacine (mg)	5,4	0,72	1,06
Vitamine B_6 (mg)	0,31	0,04	0,06
Acide folique (mg)	0,052	0,007	0,010
Vitamine B_{12} (mg)	0,0013	0,0002	0,00025
Acide pantothénique (mg)	2,3	0,3	0,4
Biotine (mg)	0,019	0,003	0,0037
Choline (mg)	76	10	15
Inositol (mg)	30	4	6
Lutéine (mg)	0,057	0,0076	0,0112

MINÉRAUX

Sodium (mg [mmol])	135 (5,87)	18 (0,78)	27 (1,15)
Potassium (mg [mmol])	600 (15,38)	79 (2,03)	95 (2,43)
Chlorure (mg [mmol])	333 (9,39)	44 (1,24)	65 (1,83)
Calcium (mg)	600	80	96
Phosphore (mg)	300	40	48
Magnésium (mg)	39	5,2	7,6
Fer (mg)	9,1	1,2	1,8
Zinc (mg)	3,8	0,5	0,7
Iode (mg)	0,100	0,013	0,019
Cuivre (mg)	0,400	0,05	0,074
Manganèse (mg)	0,0363	0,005	0,0074
Sélénium (mg)	0,010	0,0013	0,0019
Chrome (mg)	-	-	-
Molybdène (mg)	-	-	-

Information nutritionnelle pour Similac® Advance® Go & Grow®, en poudre

†† Les GOS représentent environ 1 % de l'apport énergétique total et procurent environ 1,3 Cal/g.

COMPOSITION

Similac® Go & Grow® avec oméga-3 et oméga-6, en poudre :
Lactose, lait écrémé sec, huile de carthame riche en acide oléique ou huile de tournesol riche en acide oléique, huile de soya, huile de copra, galactooligosaccharides (GOS), concentré de protéines de lactosérum, phosphate tricalcique, hydrolysat de protéines de lactosérum, citrate de potassium, huile de *M. alpina, carbonate de calcium, hydroxyde de potassium, huile de **C. cohnii*, chlorure de magnésium, chlorure de sodium, bitartrate de choline, acide ascorbique, lécithine de soya, L-tryptophane, sulfate ferreux, taurine, m-inositol, cytidine-5'-monophosphate, guanosine-5'-monophosphate disodique, palmitate d'ascorbyle, uridine-5'-monophosphate disodique, sulfate de zinc, acétate de *d*-α-tocophéryle, adénosine-5'-monophosphate, L-carnitine, mélange de tocophérols, nicotinamide, d-pantothénate de calcium, sulfate de cuivre, palmitate de vitamine A, chlorhydrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, lutéine, acide folique, sulfate de manganèse, β-carotène, phylloquinone, biotine, séléniate de sodium, iodure de potassium, vitamine D_3, cyanocobalamine.

Similac® Go & Grow® avec oméga-3 et oméga-6, en liquide concentré :
Eau, lactose, lait écrémé évaporé ou sec, huile de carthame riche en acide oléique ou huile de tournesol riche en acide oléique, huile de copra, huile de soya, galactooligosaccharides (GOS), concentré de protéines de lactosérum, phosphate calcique, citrate de potassium, carbonate de calcium, monoglycérides, lécithine de soya, huile de *M. alpina, chlorure de potassium, huile de **C. cohnii*, acide ascorbique, bitartrate de choline, L-tryptophane, carraghénine, chlorure de magnésium, taurine, sulfate ferreux, cytidine-5'-monophosphate, acétate de *d*-α-tocophéryle, guanosine-5'-monophosphate disodique, uridine-5'-monophosphate disodique, adénosine-5'-monophosphate, nicotinamide, L-carnitine, sulfate de zinc, pantothénate de calcium, palmitate de vitamine A, chlorhydrate de chlorure de thiamine, sulfate de cuivre, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, acide folique, phylloquinone, lutéine, β-carotène, biotine, sulfate de manganèse, séléniate de sodium, vitamine D_3, cyanocobalamine.

CONTIENT : Allergènes alimentaires prioritaires : Lait. **Ingrédients associés à des intolérances et (ou) à des sensibilités alimentaires :** Huile de copra, lactose, autres composants du soya.

* Source d'acide arachidonique (ARA). ** Source d'acide docosahexanoïque (DHA).

Les valeurs sont sujettes à changement. Pour connaître la liste la plus récente des ingrédients, des allergènes et l'information nutritionnelle, consulter l'étiquette ou l'emballage du produit.

SIMILAC® GO & GROW®
AVEC OMÉGA-3 ET OMÉGA-6
Préparation de 2e étape enrichie de DHA et d'ARA
Pour les nourrissons et tout-petits de 6 à 24 mois

SIMILAC® GO & GROW®

Préparation de 2e étape

Pour les nourrissons et tout-petits de 6 à 24 mois

INDICATIONS D'EMPLOI

- Préparation de transition pour les nourrissons nés à terme et en santé, de 6 mois ou plus.
- Pour l'alimentation par voie orale ou par sonde.

Mise en garde :

- Non indiqué pour administration par voie parentérale.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Spécialement conçu pour aider à satisfaire les besoins nutritionnels qui ne sont pas toujours comblés lors de la transition aux aliments solides.
- Enrichi de calcium (50 % plus de calcium que Similac® avec fer) pour répondre aux besoins des bébés en pleine croissance.
- Contient un mélange breveté de nucléotides, conçu pour être semblable à celui du lait maternel (72 mg/L).
- Ne contient pas d'oléine d'huile de palme.
- Facile à digérer, comme toutes les préparations pour nourrissons.

DONNÉES TECHNIQUES

	Liquide concentré (dilution normale)	**Poudre** (dilution normale)
Densité calorique (Cal/mL)	0,68	0,68
Protéines (% de l'énergie totale)	8,3	8,3
Lipides (% de l'énergie totale)	49,5	49,5
Glucides (% de l'énergie totale)	42,2	42,2
Rapport Cal totales:g d'azote	307,7:1	307,7:1
Rapport Cal non protéiques:g d'azote	282,2:1	282,2:1
Eau (g/L)	901	901
Osmolalité (mOsm/kg d'eau)	300	300
Charge osmotique rénale (mOsm/L)	94	94
Viscosité à la température ambiante/lorsque refroidi	S. O.	S. O.
Diamètre minimal de la sonde pour l'alimentation par gravité/pompe (Fr)	S. O.	S. O.
Hyporésiduel	Oui	Oui
Sans gluten	Oui	Oui
Cascher	Oui	Oui
Halal	Oui	Oui

PRÉSENTATION

Liquide concentré

55224-510	Similac® Go & Grow®	Boîtes de 385 mL	12/carton

Poudre

05252-352	Similac® Go & Grow®	Boîtes de 900 g	6/carton

Les lignes directrices pour la préparation se trouvent à la page 12.

INFORMATION NUTRITIONNELLE

ÉNERGIE

	Par 100 g Poudre	Par 100 mL (dilution normale)	Par 100 Cal
ÉNERGIE (Cal [kJ])	520 (2175)	68 (287)	100 (418)
PROTÉINES (g)	10,6	1,4	2,1
% de l'énergie totale		8,3	
Arginine (mg)	330	43	63
Cystine (mg)	110	15	22
Histidine (mg)	300	38	56
Isoleucine (mg)	620	79	116
Leucine (mg)	1080	139	204
Lysine (mg)	890	114	168
Méthionine (mg)	320	42	62
Phénylalanine (mg)	440	57	84
Tryptophane (mg)	180	23,7	35
Thréonine (mg)	580	75	110
Valine (mg)	600	78	115
Taurine (mg)	34	4,5	6,6
Carnitine (mg)	7,5	1,0	1,5
Nucléotides (mg)	54,7	7,2	10,6
Source	Lait écrémé, concentré de protéines de lactosérum, hydrolysat de protéines de lactosérum		
LIPIDES (g)	28,2	3,71	5,5
% de l'énergie totale		49,5	
Acides gras polyinsaturés (g)	6,14	0,79	1,16
Acide linoléique (g)	3,97	0,52	0,74
Acide arachidonique (ARA) (g)	-	-	-
Acide linolénique (g)	0,38	0,05	0,07
Acide docosahexanoïque (DHA) (g)	-	-	-
Rapport oméga-6:oméga-3		9,8:1	
Acides gras monoinsaturés (g)	12,04	1,55	2,28
Acides gras saturés (g)	10,36	1,33	1,96
Cholestérol (mg)	5,4	0,7	1,0
Source	Huile de tournesol riche en acide oléique, huile de soya, huile de copra		
Huile de TCM (% des lipides totaux)		0,0	
GLUCIDES (g)	56,0	7,4	10,9
% de l'énergie totale		42,2	
Fibres alimentaires (g)	-	-	-
Fructooligosaccharides à chaîne courte (FOScc) (g)	-	-	-
Galactooligosaccharides (GOS) (g)	-	-	-
Source		Lactose	
Acésulfame-potassium (mg)	-	-	-
Sucralose (mg)	-	-	-

VITAMINES

Vitamine A (ER [UI])	430 (1433)	57 (189)	83 (278)
Vitamine D_3 (mcg [UI])	6,5 (260)	0,85 (34)	1,25 (50)
Vitamine E (UI)	21,3	2,8	4,1
Vitamine K_1 (mg)	0,051	0,0067	0,0099
Vitamine C (mg)	76	10	15
Thiamine (mg)	0,6	0,08	0,12
Riboflavine (mg)	1,1	0,14	0,21
Niacine (mg)	5,4	0,71	1,04
Vitamine B_6 (mg)	0,31	0,04	0,06
Acide folique (mg)	0,052	0,0068	0,010
Vitamine B_{12} (mg)	0,00130	0,00017	0,00025
Acide pantothénique (mg)	3,0	0,4	0,6
Biotine (mg)	0,019	0,0025	0,0037
Choline (mg)	76	10	15
Inositol (mg)	30	4	6
Lutéine (mg)	-	-	-

MINÉRAUX

Sodium (mg [mmol])	135 (5,87)	18 (0,78)	27 (1,15)
Potassium (mg [mmol])	630 (16,15)	83 (2,13)	122 (3,13)
Chlorure (mg [mmol])	333 (9,39)	44 (1,24)	65 (1,83)
Calcium (mg)	607	80	118
Phosphore (mg)	326	43	63
Magnésium (mg)	39	5,1	7,5
Fer (mg)	9,1	1,2	1,8
Zinc (mg)	3,8	0,5	0,7
Iode (mg)	0,100	0,013	0,019
Cuivre (mg)	0,385	0,051	0,075
Manganèse (mg)	0,100	0,013	0,019
Sélénium (mg)	0,0080	0,0011	0,0016
Chrome (mg)	-	-	-
Molybdène (mg)	-	-	-

Information nutritionnelle pour Similac® Go & Grow®, en poudre

COMPOSITION

Similac® Go & Grow®, en poudre :
Lait écrémé, lactose, huile de tournesol riche en acide oléique, huile de soya, huile de copra, concentré de protéines de lactosérum, citrate de potassium, hydrolysat de protéines de lactosérum, phosphate tricalcique, carbonate de calcium, lécithine de soya, acide ascorbique, bitartrate de choline, chlorure de magnésium, chlorure de potassium, chlorure de sodium, sulfate ferreux, taurine, L-tryptophane, m-inositol, cytidine-5'-monophosphate, palmitate d'ascorbyle, guanosine-5'-monophosphate disodique, uridine-5'-monophosphate disodique, sulfate de zinc, adénosine-5'-monophosphate, acétate de *d*-α-tocophéryle, mélange de tocophérols, nicotinamide, L-carnitine, d-pantothénate de calcium, palmitate de vitamine A, sulfate de cuivre, chlorhydrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, sulfate de manganèse, β-carotène, acide folique, iodure de potassium, phylloquinone, biotine, sélénate de sodium, vitamine D_3, cyanocobalamine.
CONTIENT : Allergènes alimentaires prioritaires : Lait. **Ingrédients associés à des intolérances et (ou) à des sensibilités alimentaires :** Huile de copra, lactose, autres composants du soya.

Similac® Go & Grow®, en liquide concentré :
Eau, lactose, lait écrémé évaporé ou sec, huile de carthame riche en acide oléique, huile de soya, huile de copra, concentré de protéines de lactosérum, phosphate calcique, citrate de potassium, carbonate de calcium, monoglycérides, lécithine de soya, chlorure de potassium, acide ascorbique, bitartrate de choline, carraghénine, chlorure de magnésium, taurine, sulfate ferreux, cytidine-5'monophosphate, acétate de *d*-α-tocophéryle, guanosine-5'-monophosphate disodique, uridine-5'-monophosphate disodique, adénosine-5'monophosphate, nicotinamide, sulfate de zinc, pantothénate de calcium, palmitate de vitamine A, chlorhydrate de chlorure de thiamine, riboflavine, sulfate de cuivre, chlorhydrate de pyridoxine, acide folique, phylloquinone, biotine, sulfate de manganèse, sélénate de sodium, vitamine D_3, cyanocobalamine.
CONTIENT : Allergènes alimentaires prioritaires : Lait. **Ingrédients associés à des intolérances et (ou) à des sensibilités alimentaires :** Huile de copra, acide citrique, lactose, autres composants du soya.

Les valeurs sont sujettes à changement. Pour connaître la liste la plus récente des ingrédients, des allergènes et l'information nutritionnelle, consulter l'étiquette ou l'emballage du produit.

SIMILAC® GO & GROW®
Préparation de 2e étape
Pour les nourrissons et tout-petits de 6 à 24 mois

SIMILAC® AVEC FER

Préparation de 1re étape

Pour les nourrissons nés à terme, dès la naissance

INDICATIONS D'EMPLOI

- Pour les nourrissons nés à terme et en bonne santé qui ont besoin d'un complément au lait maternel.
- Pour les nourrissons nés à terme et en bonne santé qui ne sont pas allaités.
- Pour l'alimentation initiale ou comme supplément.
- Pour l'alimentation par voie orale ou par sonde.

Mise en garde :

- Non indiqué pour administration par voie parentérale.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Contribue à une croissance semblable à celle des nourrissons allaités[1,2].
- Contient un mélange breveté de nucléotides, conçu pour être semblable à celui du lait maternel (72 mg/L).
- Ne contient pas d'oléine d'huile de palme.
- Facile à digérer, comme toutes les préparations pour nourrissons.

DONNÉES TECHNIQUES

	Liquide concentré (dilution normale)	**Poudre** (dilution normale)
Densité calorique (Cal/mL)	0,68	0,68
Protéines (% de l'énergie totale)	8,2	8,2
Lipides (% de l'énergie totale)	48,8	48,8
Glucides (% de l'énergie totale)	43,1	43,1
Rapport Cal totales:g d'azote	304,8:1	304,8:1
Rapport Cal non protéiques:g d'azote	279,8:1	279,8:1
Eau (g/L)	901	901
Osmolalité (mOsm/kg d'eau)	303	303
Charge osmotique rénale (mOsm/L)	97	97
Viscosité à la température ambiante/lorsque refroidi	S. O.	S. O.
Diamètre minimal de la sonde pour l'alimentation par gravité/pompe (Fr)	S. O.	S. O.
Hyporésiduel	Oui	Oui
Sans gluten	Oui	Oui
Cascher	Oui	Oui
Halal	Oui	Oui

PRÉSENTATION

Liquide concentré

0L904-510	Similac® avec fer	Boîtes de 385 mL	12/carton

Poudre

0S250-352	Similac® avec fer	Boîtes de 900 g	6/carton

Les lignes directrices pour la préparation se trouvent à la page 12.

RÉFÉRENCES :

1. Auestad N *et al.* Visual Acuity, Erythrocyte Fatty Acid Composition and Growth in Term Infants Fed Formulas with Long Chain Polyunsaturated Fatty Acids for One Year. *Pediatric Research* 1997;41(1):1-10.

2. Auestad N *et al.* Growth and Development in Term Infants Fed Long-Chain Polyunsaturated Fatty Acids: A Double-Masked, Randomized, Parallel, Prospective, Multivariate Study. *Pediatrics* 2001;108:372-81.

INFORMATION NUTRITIONNELLE

ÉNERGIE

	Par 100 g Poudre	Par 100 mL (dilution normale)	Par 100 Cal
ÉNERGIE (Cal [kJ])	520 (2175)	68 (287)	100 (420)
PROTÉINES (g)	10,6	1,4	2,1
% de l'énergie totale		8,2	
Arginine (mg)	330	40	59
Cystine (mg)	160	20	29
Histidine (mg)	220	30	44
Isoleucine (mg)	590	80	118
Leucine (mg)	1050	140	206
Lysine (mg)	870	110	162
Méthionine (mg)	300	40	59
Phénylalanine (mg)	440	60	88
Tryptophane (mg)	180	23,7	35
Thréonine (mg)	560	70	103
Valine (mg)	590	80	118
Taurine (mg)	34	4,5	6,6
Carnitine (mg)	7,5	1,0	1,5
Nucléotides (mg)	54,7	7,2	10,6
Source	Lait écrémé, concentré de protéines de lactosérum, hydrolysat de protéines de lactosérum		
LIPIDES (g)	28,2	3,71	5,5
% de l'énergie totale		48,8	
Acides gras polyinsaturés (g)	5,5	0,7	1,03
Acide linoléique (g)	3,97	0,52	0,77
Acide arachidonique (ARA) (g)	-	-	-
Acide linolénique (g)	0,38	0,05	0,074
Acide docosahexanoïque (DHA) (g)	-	-	-
Rapport oméga-6:oméga-3		11,9:1	
Acides gras monoinsaturés (g)	11,6	1,5	2,2
Acides gras saturés (g)	9,6	1,3	1,96
Cholestérol (mg)	5,0	0,7	1,0
Source	Huile de tournesol riche en acide oléique, huile de soya, huile de copra		
Huile de TCM (% des lipides totaux)		0,0	
GLUCIDES (g)	56,0	7,4	10,9
% de l'énergie totale		43,1	
Fibres alimentaires (g)	-	-	-
Fructooligosaccharides à chaîne courte (FOSsc) (g)	-	-	-
Galactooligosaccharides (GOS) (g)	-	-	-
Source		Lactose	
Acésulfame-potassium (mg)	-	-	-
Sucralose (mg)	-	-	-

VITAMINES

Vitamine A (ER [UI])	430 (1433)	57 (189)	83 (278)
Vitamine D_3 (mcg [UI])	6,5 (260)	0,85 (34)	1,25 (50)
Vitamine E (UI)	21,3	2,8	4,1
Vitamine K_1 (mg)	0,051	0,0067	0,0099
Vitamine C (mg)	76	10	15
Thiamine (mg)	0,6	0,08	0,12
Riboflavine (mg)	1,1	0,14	0,21
Niacine (mg)	5,4	0,71	1,04
Vitamine B_6 (mg)	0,31	0,04	0,06
Acide folique (mg)	0,052	0,0068	0,010
Vitamine B_{12} (mg)	0,00130	0,00017	0,00025
Acide pantothénique (mg)	3,0	0,4	0,6
Biotine (mg)	0,019	0,0025	0,0037
Choline (mg)	76	10	15
Inositol (mg)	30	4	6

MINÉRAUX

Sodium (mg [mmol])	135 (5,87)	18 (0,78)	27 (1,15)
Potassium (mg [mmol])	630 (16,15)	83 (2,13)	122 (3,13)
Chlorure (mg [mmol])	333 (9,39)	44 (1,24)	65 (1,83)
Calcium (mg)	400	53	78
Phosphore (mg)	216	28	41
Magnésium (mg)	39	5,1	7,5
Fer (mg)	9,1	1,2	1,8
Zinc (mg)	3,8	0,5	0,7
Iode (mg)	0,100	0,013	0,019
Cuivre (mg)	0,385	0,051	0,075
Manganèse (mg)	0,100	0,013	0,019
Sélénium (mg)	0,0080	0,0011	0,0016
Chrome (mg)	-	-	-
Molybdène (mg)	-	-	-

Information nutritionnelle pour Similac® avec fer, en poudre

COMPOSITION

Similac® avec fer, en poudre :
Lait écrémé, lactose, huile de tournesol riche en acide oléique, huile de soya, huile de copra, concentré de protéines de lactosérum, citrate de potassium, hydrolysat de protéines de lactosérum, carbonate de calcium, lécithine de soya, acide ascorbique, bitartrate de choline, chlorure de magnésium, chlorure de sodium, chlorure de potassium, sulfate ferreux, taurine, L-tryptophane, m-inositol, cytidine-5'-monophosphate, palmitate d'ascorbyle, guanosine-5'-monophosphate disodique, uridine-5'-monophosphate disodique, sulfate de zinc, adénosine-5'-monophosphate, acétate de *d*-α-tocophéryle, mélange de tocophérols, nicotinamide, L-carnitine, d-pantothénate de calcium, palmitate de vitamine A, sulfate de cuivre, chlorhydrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, sulfate de manganèse, β-carotène, acide folique, iodure de potassium, phylloquinone, biotine, sélénate de sodium, vitamine D_3, cyanocobalamine.
CONTIENT : Allergènes alimentaires prioritaires : Lait. **Ingrédients associés à des intolérances et (ou) à des sensibilités alimentaires :** Huile de copra, lactose, autres composants du soya.

Similac® avec fer, en liquide concentré :
Eau, lait écrémé sec ou évaporé, lactose, huile de carthame riche en acide oléique ou huile de tournesol riche en acide oléique, huile de soya, huile de copra, concentré de protéines de lactosérum, citrate de potassium, carbonate de calcium, monoglycérides, lécithine de soya, chlorure de potassium, acide ascorbique, bitartrate de choline, carraghénine, chlorure de magnésium, sulfate ferreux, taurine, m-inositol, cytidine-5'-monophosphate, acétate de *d*-α-tocophéryle, guanosine-5'-monophosphate disodique, sulfate de zinc, uridine-5'-monophosphate disodique, adénosine-5'monophosphate, nicotinamide, pantothénate de calcium, palmitate de vitamine A, sulfate de cuivre, chlorhydrate de chlorure de thiamine, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, acide folique, sulfate de manganèse, phylloquinone, biotine, sélénate de sodium, vitamine D_3, cyanocobalamine.
CONTIENT : Allergènes alimentaires prioritaires : Lait. **Ingrédients associés à des intolérances et (ou) à des sensibilités alimentaires :** Huile de copra, lactose, autres composants du soya.

Les valeurs sont sujettes à changement. Pour connaître la liste la plus récente des ingrédients, des allergènes et l'information nutritionnelle, consulter l'étiquette ou l'emballage du produit.

SIMILAC® AVEC FER

Préparation de 1re étape

Pour les nourrissons nés à terme, dès la naissance

SIMILAC® PLUS FAIBLE EN FER

Préparation de 1re étape

Pour les nourrissons nés à terme, dès la naissance

INDICATIONS D'EMPLOI

- Pour les nourrissons nés à terme et en bonne santé qui ont besoin d'un complément au lait maternel.
- Pour les nourrissons nés à terme et en bonne santé qui ne sont pas allaités.
- Pour les nourrissons nés à terme et en bonne santé, à qui les parents désirent donner un apport moindre en fer.
- Pour l'alimentation initiale ou comme supplément.
- Pour l'alimentation par voie orale ou par sonde.

Mise en garde :

- Non indiqué pour administration par voie parentérale.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Faible teneur en fer (0,7 mg/100 mL) offrant la possibilité d'ajouter la quantité de fer requise selon les besoins.
- Contient un mélange breveté de nucléotides, conçu pour être semblable à celui du lait maternel (72 mg/L).
- Ne contient pas d'oléine d'huile de palme.
- Facile à digérer, comme toutes les préparations pour nourrissons.

DONNÉES TECHNIQUES

	Liquide concentré (dilution normale)	**Poudre** (dilution normale)
Densité calorique (Cal/mL)	0,68	0,68
Protéines (% de l'énergie totale)	8,3	8,3
Lipides (% de l'énergie totale)	49,5	49,5
Glucides (% de l'énergie totale)	42,2	42,2
Rapport Cal totales:g d'azote	307,7:1	307,7:1
Rapport Cal non protéiques:g d'azote	282,2:1	282,2:1
Eau (g/L)	900	901
Osmolalité (mOsm/kg d'eau)	303	303
Charge osmotique rénale (mOsm/L)	79	79
Viscosité à la température ambiante/lorsque refroidi	S. O.	S. O.
Diamètre minimal de la sonde pour l'alimentation par gravité/pompe (Fr)	S. O.	S. O.
Hyporésiduel	Oui	Oui
Sans gluten	Oui	Oui
Cascher	Oui	Oui
Halal	Oui	Oui

PRÉSENTATION

Liquide concentré

0M353-510	Similac® plus faible en fer	Boîtes de 385 mL	12/carton

Poudre

0S225-352	Similac® plus faible en fer	Boîtes de 900 g	6/carton

Les lignes directrices pour la préparation se trouvent à la page 12.

INFORMATION NUTRITIONNELLE

ÉNERGIE

	Par 100 g Poudre	Par 100 mL (dilution normale)	Par 100 Cal
ÉNERGIE (Cal [kJ])	520 (2175)	68 (287)	100 (418)
PROTÉINES (g)	10,6	1,4	2,1
% de l'énergie totale		8,3	
Arginine (mg)	330	43	63
Cystine (mg)	110	15	22
Histidine (mg)	300	38	56
Isoleucine (mg)	620	79	116
Leucine (mg)	1080	139	204
Lysine (mg)	890	114	168
Méthionine (mg)	320	42	62
Phénylalanine (mg)	440	57	84
Tryptophane (mg)	180	23,7	35
Thréonine (mg)	580	75	110
Valine (mg)	600	78	115
Taurine (mg)	34	4,5	6,6
Carnitine (mg)	7,5	1,0	1,5
Nucléotides (mg)	54,7	7,2	10,6
Source	Lait écrémé, concentré de protéines de lactosérum, hydrolysat de protéines de lactosérum		
LIPIDES (g)	28,2	3,71	5,5
% de l'énergie totale		49,5	
Acides gras polyinsaturés (g)	6,14	0,79	1,16
Acide linoléique (g)	3,97	0,52	0,77
Acide arachidonique (ARA) (g)	-	-	-
Acide linolénique (g)	0,38	0,05	0,074
Acide docosahexanoïque (DHA) (g)	-	-	-
Rapport oméga-6:oméga-3		9,8 :1	
Acides gras monoinsaturés (g)	12,04	1,55	2,28
Acides gras saturés (g)	10,36	1,33	1,96
Cholestérol (mg)	5,4	0,7	1,03
Source	Huile de tournesol riche en acide oléique, huile de soya, huile de copra		
Huile de TCM (% des lipides totaux)		0,0	
GLUCIDES (g)	56,0	7,6	10,9
% de l'énergie totale		42,2	
Fibres alimentaires (g)	-	-	-
Fructooligosaccharides (FOS) (g)	-	-	-
Galactooligosaccharides (GOS) (g)	-	-	-
Source		Lactose	
Acésulfame-potassium (mg)	-	-	-
Sucralose (mg)	-	-	-

VITAMINES

Vitamine A (ER [UI])	430 (1433)	57 (189)	83 (278)
Vitamine D_3 (mcg [UI])	6,5 (260)	0,85 (34)	1,25 (50)
Vitamine E (UI)	21,3	2,8	4,1
Vitamine K_1 (mg)	0,051	0,0067	0,0099
Vitamine C (mg)	76	10	15
Thiamine (mg)	0,6	0,08	0,12
Riboflavine (mg)	1,1	0,14	0,21
Niacine (mg)	5,4	0,71	1,04
Vitamine B_6 (mg)	0,31	0,04	0,06
Acide folique (mg)	0,052	0,0068	0,010
Vitamine B_{12} (mg)	0,00130	0,00017	0,00025
Acide pantothénique (mg)	3,0	0,4	0,6
Biotine (mg)	0,019	0,0025	0,0037
Choline (mg)	76	10	15
Inositol (mg)	30	4,0	6,0
Lutéine (mg)	-	-	-

MINÉRAUX

Sodium (mg [mmol])	135 (5,87)	18 (0,78)	27 (1,15)
Potassium (mg [mmol])	630 (16,15)	83 (2,13)	122 (3,13)
Chlorure (mg [mmol])	333	44	65
Calcium (mg)	400	53	78
Phosphore (mg)	216	28	41
Magnésium (mg)	39	5,1	7,5
Fer (mg)	5,5	0,7	1,0
Zinc (mg)	3,8	0,5	0,7
Iode (mg)	0,100	0,013	0,019
Cuivre (mg)	0,385	0,051	0,075
Manganèse (mg)	0,100	0,013	0,019
Sélénium (mg)	0,0080	0,0011	0,0016
Chrome (mg)	-	-	-
Molybdène (mg)	-	-	-

Information nutritionnelle pour Similac® plus faible en fer, en poudre

COMPOSITION

Similac® plus faible en fer, en poudre :
Eau, lait écrémé sec ou évaporé, lactose, huile de carthame riche en acide oléique ou huile de tournesol riche en acide oléique, huile de soya, huile de copra, concentré de protéines de lactosérum, citrate de potassium, carbonate de calcium, monoglycérides, lécithine de soya, chlorure de potassium, acide ascorbique, bitartrate de choline, carraghénine, chlorure de magnésium, taurine, m-inositol, sulfate ferreux, cytidine-5'-monophosphate, acétate de *d*-α-tocophéryle, guanosine-5'-monophosphate disodique, sulfate de zinc, uridine-5'-monophosphate disodique, adénosine-5'-monophosphate, nicotinamide, pantothénate de calcium, palmitate de vitamine A, sulfate de cuivre, chlorhydrate de chlorure de thiamine, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, acide folique, sulfate de manganèse, phylloquinone, biotine, sélénate de sodium, vitamine D_3, cyanocobalamine.

Similac® plus faible en fer, en liquide concentré :
Lait écrémé, lactose, huile de tournesol riche en acide oléique, huile de soya, huile de copra, concentré de protéines de lactosérum, citrate de potassium, hydrolysat de protéines de lactosérum, carbonate de calcium, lécithine de soya, acide ascorbique, bitartrate de choline, chlorure de magnésium, chlorure de sodium, chlorure de potassium, taurine, L-tryptophane, m-inositol, sulfate ferreux, cytidine-5'-monophosphate, palmitate d'ascorbyle, guanosine-5'-monophosphate disodique, uridine-5'-monophosphate disodique, sulfate de zinc, adénosine-5'-monophosphate, acétate de *d*-α-tocophéryle, mélange de tocophérols, nicotinamide, L-carnitine, d-pantothénate de calcium, palmitate de vitamine A, sulfate de cuivre, chlorhydrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, sulfate de manganèse, β-carotène, acide folique, iodure de potassium, phylloquinone, biotine, sélénate de sodium, vitamine D_3, cyanocobalamine.

CONTIENT : Allergènes alimentaires prioritaires : Lait. **Ingrédients associés à des intolérances et (ou) à des sensibilités alimentaires :** Huile de copra, lactose, autres composants du soya.

Les valeurs sont sujettes à changement. Pour connaître la liste la plus récente des ingrédients, des allergènes et l'information nutritionnelle, consulter l'étiquette ou l'emballage du produit.

SIMILAC® PLUS FAIBLE EN FER

Préparation de 1re étape

Pour les nourrissons nés à terme, dès la naissance

SIMILAC® POUR BÉBÉS SENSIBLES AU LACTOSE

Préparation de 1re étape

Pour les nourrissons nés à terme, dès la naissance

INDICATIONS D'EMPLOI

- Pour les nourrissons nés à terme et en bonne santé qui ont besoin d'un complément au lait maternel.
- Pour les nourrissons nés à terme et en bonne santé qui ne sont pas allaités.
- Pour les nourrissons présentant un déficit en lactase.
- Pour les nourrissons présentant une sensibilité au lactose.
- Pour les nourrissons qui ont des troubles alimentaires caractérisés par de l'irritabilité, des gaz ou de la diarrhée causés par une sensibilité au lactose.
- Pour l'alimentation initiale ou comme supplément.
- Pour l'alimentation par voie orale ou par sonde.

Mises en garde :

- Non indiqué pour administration par voie parentérale.
- Non indiqué chez les nourrissons atteints de galactosémie.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Mélange exclusif de deux types de glucides (sirop de maïs et saccharose), qui utilise deux voies d'absorption afin de maximiser l'absorption et de minimiser les risques de malabsorption[1].
- Préparation à base de protéines de lait de vache, complète sur le plan nutritionnel, qui ne contient pas de lactose ajouté afin d'aider à éviter la diarrhée associée au lactose.
- Préparation à teneur réduite en lactose pour aider à soulager les problèmes d'irritabilité, de gaz et de diarrhée causés par une intolérance au lactose ou un déficit en lactase.
- Contient un mélange breveté de nucléotides, conçu pour être semblable à celui du lait maternel (72 mg/L).
- Ne contient pas d'oléine d'huile de palme.
- Facile à digérer, comme toutes les préparations pour nourrissons.

DONNÉES TECHNIQUES

	Liquide concentré (dilution normale)	**Poudre** (dilution normale)
Densité calorique (Cal/mL)	0,68	0,68
Protéines (% de l'énergie totale)	8,8	8,8
Lipides (% de l'énergie totale)	48,8	48,8
Glucides (% de l'énergie totale)	42,4	42,4
Rapport Cal totales:g d'azote	289:1	289:1
Rapport Cal non protéiques:g d'azote	267:1	267:1
Eau (g/L)	900	900
Osmolalité (mOsm/kg d'eau)	200	200
Charge osmotique rénale (mOsm/L)	136	136
Viscosité à la température ambiante/lorsque refroidi	S. O.	S. O.
Diamètre minimal de la sonde pour l'alimentation par gravité/pompe (Fr)	S. O.	S. O.
Hyporésiduel	Oui	Oui
Sans gluten	Oui	Oui
Cascher	Oui	Oui
Halal	Oui	Oui

PRÉSENTATION

Liquide concentré

0L242-510	Similac® pour bébés sensibles au lactose	Boîtes de 385 mL	12/carton

Poudre

50857-722	Similac® pour bébés sensibles au lactose	Boîtes de 728 g	6/carton

Les lignes directrices pour la préparation se trouvent à la page 12.

RÉFÉRENCE :

1. Kerzner B *et al.* Jejunal absorption of sucrose and glucose oligomers in the absence of pancreatic amylase. *Pediatr Res* 1983;17;191A.

INFORMATION NUTRITIONNELLE

ÉNERGIE

	Par 100 g Poudre	Par 100 mL (dilution normale)	Par 100 Cal
ÉNERGIE (Cal [kJ])	519 (2172)	68 (285)	100 (418)
PROTÉINES (g)	11,14	1,45	2,1
% de l'énergie totale	-	-	
Arginine (mg)	383	50	74
Cystine (mg)	87	11	17
Histidine (mg)	298	39	57
Isoleucine (mg)	513	68	99
Leucine (mg)	1120	147	216
Lysine (mg)	918	121	177
Méthionine (mg)	312	41	60
Phénylalanine (mg)	548	72	106
Tryptophane (mg)	156	21	30
Thréonine (mg)	513	68	99
Valine (mg)	639	84	123
Taurine (mg)	34,6	4,6	6,7
Carnitine (mg)	8,4	1,1	1,6
Nucléotides (mg)	55,3	7,2	10,7
Source	Isolat de protéines de lait		
LIPIDES (g)	28,03	3,65	5,4
% de l'énergie totale	-	-	
Acides gras polyinsaturés (g)	5,7	0,74	1,1
Acide linoléique (g)	4,99	0,65	0,96
Acide arachidonique (ARA) (g)	-	-	-
Acide linolénique (g)	0,553	0,072	0,106
Acide docosahexanoique (DHA) (g)	-	-	-
Rapport oméga-6:oméga-3		9,4:1	
Acides gras monoinsaturés (g)	11,4	1,5	2,2
Acides gras saturés (g)	9,3	1,24	1,8
Cholestérol (mg)	< 7,8	< 1,0	< 1,5
Source	Huile de tournesol riche en acide oléique ou huile de carthame riche en acide oléique, huile de copra, huile de soya		
Huile de TCM (% des lipides totaux)		0,0	
GLUCIDES (g)	55,53	7,23	10,7
% de l'énergie totale		-	
Fibres alimentaires (g)	-	-	-
Fructooligosaccharides à chaîne courte (FOScc) (g)	-	-	-
Galactooligosaccharides (GOS) (g)	-	-	-
Source	Sirop de maïs, saccharose		
Acésulfame-potassium (mg)	-	-	-
Sucralose (mg)	-	-	-

VITAMINES

Vitamine A (ER [UI])	461 (1536)	60 (200)	88 (294)
Vitamine D_3 (mcg [UI])	7,68 (307)	1,00 (40)	1,48 (59)
Vitamine E (UI)	13,8	1,8	2,7
Vitamine K_1 (mg)	0,0422	0,0055	0,0081
Vitamine C (mg)	42,2	5,5	8,1
Thiamine (mg)	0,499	0,065	0,096
Riboflavine (mg)	0,346	0,045	0,067
Niacine (mg)	5,4	0,7	1,04
Vitamine B_6 (mg)	0,3111	0,0405	0,060
Acide folique (mg)	0,077	0,010	0,015
Vitamine B_{12} (mg)	0,00115	0,00015	0,00022
Acide pantothénique (mg)	2,3	0,3	0,4
Biotine (mg)	0,023	0,0030	0,0044
Choline (mg)	63,0	8,2	12,1
Inositol (mg)	31,0	4,0	6,0
Lutéine (mg)	-	-	-

MINÉRAUX

Sodium (mg [mmol])	154 (6,70)	20 (0,87)	30 (1,30)
Potassium (mg [mmol])	553 (14,18)	72 (1,85)	107 (2,74)
Chlorure (mg [mmol])	338 (9,53)	44 (1,24)	65 (1,83)
Calcium (mg)	438	57	84
Phosphore (mg)	276	36	53
Magnésium (mg)	31,5	4,1	6,1
Fer (mg)	9,2	1,2	1,8
Zinc (mg)	3,8	0,5	0,7
Iode (mg)	0,069	0,009	0,013
Cuivre (mg)	0,461	0,060	0,089
Manganèse (mg)	0,0261	0,0034	0,0050
Sélénium (mg)	0,0115	0,0015	0,0022
Chrome (mg)	-	-	-
Molybdène (mg)	-	-	-

Information nutritionnelle pour Similac® pour bébés sensibles au lactose, en poudre

COMPOSITION

Similac® pour bébés sensibles au lactose, en poudre :
Sirop de maïs, saccharose, isolat de protéines du lait, huile de carthame riche en acide oléique ou huile de tournesol riche en acide oléique, huile de copra, huile de soya, citrate de potassium, phosphate calcique, chlorure de potassium, citrate de sodium, acide ascorbique, chlorure de magnésium, phosphate de magnésium, carbonate de calcium, chlorure de choline, sulfate ferreux, bitartrate de choline, taurine, palmitate d'ascorbyle, m-inositol, cytidine-5'-monophosphate, acétate de *dl*-α-tocophéryle, sulfate de zinc, guanosine-5'-monophosphate disodique, uridine-5'-monophosphate disodique, mélange de tocophérols, L-carnitine, adénosine-5'-monophosphate, nicotinamide, pantothénate de calcium, sulfate de cuivre, palmitate de vitamine A, chlorhydrate de chlorure de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, β-carotène, iodure de potassium, acide folique, sulfate de manganèse, phylloquinone, biotine, sélénite de sodium, vitamine D_3, cyanocobalamine.
CONTIENT : Allergènes alimentaires prioritaires : Lait. **Ingrédients associés à des intolérances et (ou) à des sensibilités alimentaires :** Maïs, huile de copra, lactose, autres composants du soya.

Similac® pour bébés sensibles au lactose, en liquide concentré :
Eau, maltodextrine de maïs, saccharose, isolat de protéines de lait, huile de carthame riche en acide oléique ou huile de tournesol riche en acide oléique, huile de copra, huile de soya, citrate de potassium, phosphate calcique, amidon de maïs modifié, chlorure de potassium, chlorure de magnésium, monoglycérides, lécithine de soya, carraghénine, chlorure de sodium, acide ascorbique, chlorure de choline, sulfate ferreux, bitartrate de choline, taurine, m-inositol, cytidine-5'-monophosphate, acétate de *dl*-α-tocophéryle, sulfate de zinc, guanosine-5'-monophosphate disodique, uridine-5'-monophosphate disodique, adénosine-5'-monophosphate, L-carnitine, nicotinamide, pantothénate de calcium, sulfate de cuivre, palmitate de vitamine A, chlorhydrate de chlorure de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, iodure de potassium, acide folique, sulfate de manganèse, phylloquinone, biotine, sélénite de sodium, vitamine D_3, cyanocobalamine.
CONTIENT : Allergènes alimentaires prioritaires : Lait. **Ingrédients associés à des intolérances et (ou) à des sensibilités alimentaires :** Maïs, huile de copra, acide citrique, lactose, autres composants du soya.

Les valeurs sont sujettes à changement. Pour connaître la liste la plus récente des ingrédients, des allergènes et l'information nutritionnelle, consulter l'étiquette ou l'emballage du produit.

SIMILAC® POUR BÉBÉS SENSIBLES AU LACTOSE

Préparation de 1re étape

Pour les nourrissons nés à terme, dès la naissance

SIMILAC® POUR BÉBÉS SENSIBLES AU LACTOSE

Préparation de 1re étape

Pour les nourrissons nés à terme, dès la naissance

INDICATIONS D'EMPLOI

- Pour les nourrissons nés à terme et en bonne santé qui ont besoin d'un complément au lait maternel.
- Pour les nourrissons nés à terme et en bonne santé qui ne sont pas allaités.
- Pour les nourrissons présentant un déficit en lactase.
- Pour les nourrissons présentant une sensibilité au lactose.
- Pour les nourrissons qui ont des troubles alimentaires caractérisés par de l'irritabilité, des gaz ou de la diarrhée causés par une sensibilité au lactose.
- Pour l'alimentation initiale ou comme supplément.
- Pour l'alimentation par voie orale ou par sonde.

Mises en garde :

- Non indiqué pour administration par voie parentérale.
- Non indiqué chez les nourrissons atteints de galactosémie.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Mélange exclusif de deux types de glucides (sirop de maïs et saccharose), qui utilise deux voies d'absorption afin de maximiser l'absorption et de minimiser les risques de malabsorption.[1]
- Préparation à base de protéines de lait de vache, complète sur le plan nutritionnel, qui ne contient pas de lactose ajouté afin d'aider à éviter la diarrhée associée au lactose.
- Préparation à teneur réduite en lactose pour aider à soulager les problèmes d'irritabilité, de gaz et de diarrhée causés par une intolérance au lactose ou un déficit en lactase.
- Contient un mélange breveté de nucléotides, conçu pour être semblable à celui du lait maternel (72 mg/L).
- Ne contient pas d'oléine d'huile de palme.
- Facile à digérer, comme toutes les préparations pour nourrissons.

DONNÉES TECHNIQUES

	Prêt à servir
Densité calorique (Cal/mL)	0,68
Protéines (% de l'énergie totale)	8,8
Lipides (% de l'énergie totale)	48,8
Glucides (% de l'énergie totale)	42,4
Rapport Cal totales:g d'azote	289:1
Rapport Cal non protéiques:g d'azote	267:1
Eau (g/L)	900
Osmolalité (mOsm/kg d'eau)	200
Charge osmotique rénale (mOsm/L)	136
Viscosité à la température ambiante/lorsque refroidi	S. O.
Diamètre minimal de la sonde pour l'alimentation par gravité/pompe (Fr)	S. O.
Hyporésiduel	Oui
Sans gluten	Oui
Cascher	Oui
Halal	Oui

PRÉSENTATION

Prêt à servir

0L239-806	Similac® pour bébés sensibles au lactose	Bouteilles de verre de 120 mL	48/carton

Les lignes directrices pour la préparation se trouvent à la page 12.

RÉFÉRENCE :

1. Kerzner B *et al.* Jejunal absorption of sucrose and glucose oligomers in the absence of pancreatic amylase. *Pediatr Res* 1983;17;191A.

INFORMATION NUTRITIONNELLE

ÉNERGIE

	Par 100 mL	Par 100 Cal	Par 120 mL
ÉNERGIE (Cal [kJ])	68 (285)	100 (418)	82 (342)
PROTÉINES (g)	1,48	2,2	1,8
% de l'énergie totale		8,8	
Arginine (mg)	46	68	55
Cystine (mg)	-	-	-
Histidine (mg)	37	54	44
Isoleucine (mg)	74	109	89
Leucine (mg)	138	203	166
Lysine (mg)	110	162	132
Méthionine (mg)	37	54	44
Phénylalanine (mg)	74	109	89
Tryptophane (mg)	18	26	22
Thréonine (mg)	55	81	66
Valine (mg)	92	135	110
Taurine (mg)	4,5	6,6	5,4
Carnitine (mg)	1,1	1,6	1,3
Nucléotides (mg)	7,2	10,6	8,6
Source	Protéines complètes du lait		
LIPIDES (g)	3,66	5,4	4,39
% de l'énergie totale		48,8	
Acides gras polyinsaturés (g)	0,738	1,085	0,886
Acide linoléique (g)	0,55	0,81	0,66
Acide arachidonique (ARA) (g)	-	-	-
Acide linolénique (g)	0,072	0,106	0,086
Acide docosahexanoique (DHA) (g)	-	-	-
Rapport oméga-6:oméga-3		9,4:1	
Acides gras monoinsaturés (g)	1,499	2,204	1,799
Acides gras saturés (g)	1,241	1,825	1,489
Cholestérol (mg)	<1	<1,5	<1,2
Source	Huile de tournesol riche en acide oléique ou huile de carthame riche en acide oléique, huile de copra, huile de soya		
Huile de TCM (% des lipides totaux)		0,0	
GLUCIDES (g)	7,16	10,5	8,59
% de l'énergie totale		42,4	
Fibres alimentaires (g)	-	-	-
Fructooligosaccharides à chaîne courte (FOScc) (g)	-	-	-
Galactooligosaccharides (GOS) (g)	-	-	-
Source	Maltodextrine, saccharose		
Acésulfame-potassium (mg)	-	-	-
Sucralose (mg)	-	-	-

VITAMINES

Vitamine A (ER [UI])	60 (200)	88 (294)	72 (240)
Vitamine D_3 (mcg [UI])	1,00 (40)	1,48 (59)	1,20 (48)
Vitamine E (UI)	1,7	2,5	2,0
Vitamine K_1 (mg)	0,0055	0,0081	0,0066
Vitamine C (mg)	5,5	8,1	6,6
Thiamine (mg)	0,065	0,096	0,078
Riboflavine (mg)	0,045	0,066	0,054
Niacine (mg)	0,7	1,03	0,8
Vitamine B_6 (mg)	0,0405	0,0600	0,0486
Acide folique (mg)	0,010	0,015	0,012
Vitamine B_{12} (mg)	0,00015	0,00022	0,00018
Acide pantothénique (mg)	0,30	0,44	0,36
Biotine (mg)	0,003	0,0044	0,004
Choline (mg)	8,2	12,1	9,8
Inositol (mg)	4,0	5,9	4,8
Lutéine (mg)	-	-	-

MINÉRAUX

Sodium (mg [mmol])	20 (0,87)	29 (1,26)	24 (1,04)
Potassium (mg [mmol])	72 (1,85)	106 (2,72)	86 (2,21)
Chlorure (mg [mmol])	44 (1,24)	65 (1,83)	53 (1,50)
Calcium (mg)	57	84	68
Phosphore (mg)	36	53	43
Magnésium (mg)	4,1	6,0	4,9
Fer (mg)	1,2	1,8	1,4
Zinc (mg)	0,50	0,74	0,60
Iode (mg)	0,009	0,013	0,011
Cuivre (mg)	0,06	0,09	0,07
Manganèse (mg)	0,0034	0,0050	0,0041
Sélénium (mg)	0,0015	0,0022	0,0018
Chrome (mg)	-	-	-
Molybdène (mg)	-	-	-

COMPOSITION

Similac® pour bébés sensibles au lactose, prêt à servir :
Eau, maltodextrine, saccharose, protéines complètes du lait, huile de tournesol riche en acide oléique ou huile de carthame riche en acide oléique, huile de copra, huile de soya, citrate de potassium, phosphate tricalcique, chlorure de potassium, carraghénine, mono- et diglycérides, lécithine de soya, phosphate dicalcique, citrate de sodium, chlorure de magnésium, phosphate dibasique de magnésium, acide ascorbique, chlorure de choline, sulfate ferreux, taurine, m- inositol, cytidine-5'-monophosphate, acétate de *dl*-α-tocophéryle, uridine-5'-monophosphate disodique, guanosine-5'-monophosphate disodique, adénosine-5'-monophosphate, sulfate de zinc, L-carnitine, nicotinamide, pantothénate de calcium, palmitate de vitamine A, sulfate de cuivre, chlorhydrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, iodure de potassium, acide folique, phylloquinone, sulfate de manganèse, biotine, sélénite de sodium, vitamine D_3, cyanocobalamine.
CONTIENT : Allergènes alimentaires prioritaires : Lait. **Ingrédients associés à des intolérances et (ou) à des sensibilités alimentaires :** Maïs, huile de copra, acide citrique, lactose, autres composants du soya.

Les valeurs sont sujettes à changement. Pour connaître la liste la plus récente des ingrédients, des allergènes et l'information nutritionnelle, consulter l'étiquette ou l'emballage du produit.

SIMILAC® POUR BÉBÉS SENSIBLES AU LACTOSE
Préparation de 1re étape
Pour les nourrissons nés à terme, dès la naissance

SIMILAC® ISOMIL®
AVEC OMÉGA-3 ET OMÉGA-6

Préparation de 1re étape à base de soya enrichie de DHA et d'ARA

Pour les nourrissons nés à terme, dès la naissance

INDICATIONS D'EMPLOI

- Pour les nourrissons qui présentent une allergie aux protéines du lait de vache induite par les IgE, mais chez qui la tolérance au soya a été établie.
- Pour les nourrissons à qui les parents désirent donner une préparation sans lait (alimentation végétarienne, croyances religieuses).
- Pour les nourrissons présentant un déficit en lactase et (ou) une sensibilité au lactose.
- Pour les nourrissons atteints de galactosémie.
- Pour les nourrissons nés à terme et en bonne santé qui ont besoin d'un complément au lait maternel.
- Pour les nourrissons nés à terme et en bonne santé qui ne sont pas allaités.
- Pour les nourrissons qui ont des troubles alimentaires caractérisés entre autres par des gaz, de l'irritabilité ou des régurgitations causés par une intolérance au lactose ou un déficit en lactase[1].
- Pour l'alimentation initiale ou comme supplément.
- Pour l'alimentation par voie orale ou par sonde.

Mises en garde :

- Non indiqué pour administration par voie parentérale.
- Pour les nourrissons atteints de galactosémie, Similac® Isomil® avec oméga-3 et oméga-6 en poudre est la présentation de choix.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Favorise une croissance semblable à celle des nourrissons allaités ou qui reçoivent la préparation Similac® Advance® avec oméga-3 et oméga-6[2].
- À base de protéines de soya, sans protéines de lait de vache.
- Mélange exclusif de deux types de glucides (sirop de maïs et saccharose), qui utilise deux voies d'absorption afin de maximiser l'absorption et de minimiser les risques de malabsorption[3].
- Aide à soulager les problèmes d'irritabilité, de gaz et de diarrhée causés par une intolérance au lactose ou un déficit en lactase[1].
- Contient du DHA (0,15 %‡), un acide gras oméga-3, et de l'ARA (0,4 %‡), un acide gras oméga-6, qui contribuent au développement normal du cerveau et des yeux.
- Contient des nucléotides[1].
- Ne contient pas d'oléine d'huile de palme.
- Facile à digérer, comme toutes les préparations pour nourrissons.

DONNÉES TECHNIQUES

	Liquide concentré (dilution normale)	**Poudre** (dilution normale)
Densité calorique (Cal/mL)	0,68	0,68
Protéines (% de l'énergie totale)	9,7	9,7
Lipides (% de l'énergie totale)	49,1	48,8
Glucides (% de l'énergie totale)	41,2	41,5
Rapport Cal totales:g d'azote	256:1	259:1
Rapport Cal non protéiques:g d'azote	230:1	234:1
Eau (g/L)	900	901
Osmolalité (mOsm/kg d'eau)	239	250
Charge osmotique rénale (mOsm/L)	155	154
Viscosité à la température ambiante/lorsque refroidi	S. O.	S. O.
Diamètre minimal de la sonde pour l'alimentation par gravité/pompe (Fr)	S. O.	S. O.
Hyporésiduel	Oui	Oui
Sans gluten	Oui	Oui
Cascher	Oui	Oui
Halal	Oui	Oui

PRÉSENTATION

Liquide concentré

59421-510	Similac® Isomil® avec oméga-3 et oméga-6	Boîtes de 385 mL	12/carton

Poudre

0P868-353	Similac® Isomil® avec oméga-3 et oméga-6	Boîtes de 800 g	6/carton

Les lignes directrices pour la préparation se trouvent à la page 12.

† Naturellement présents. ‡ Des acides gras totaux.

RÉFÉRENCES :

1. Données internes. Étude AH23 d'Abbott Nutrition. Août 2005. **2.** Lasekan *et al.* Growth of Newborn, Term Infants Fed Soy Formulas For 1 Year. *Clin Pediatr* 1999;563-71. **3.** Kerzner B *et al.* Jejunal absorption of sucrose and glucose oligomers in the absence of pancreatic amylase. *Pediatr Res* 1983;17;191A.

INFORMATION NUTRITIONNELLE

ÉNERGIE

	Par 100 g Poudre	Par 100 mL (dilution normale)	Par 100 Cal
ÉNERGIE (Cal [kJ])	519 (2169)	68 (285)	100 (418)
PROTÉINES (g)	12,6	1,66	2,44
% de l'énergie totale		9,7	
Arginine (mg)	940	120	176
Cystine (mg)	160	20	29
Histidine (mg)	320	40	59
Isoleucine (mg)	600	80	118
Leucine (mg)	1010	130	191
Lysine (mg)	780	100	147
Méthionine (mg)	144	19	28
Phénylalanine (mg)	640	80	118
Tryptophane (mg)	170	20	29
Thréonine (mg)	460	60	88
Valine (mg)	620	80	118
Taurine (mg)	34,2	4,5	6,6
Carnitine (mg)	8,59	1,13	1,66
Nucléotides (mg)	-	-	-
Source	Isolat de protéines du soya		
LIPIDES (g)	28,1	3,7	5,4
% de l'énergie totale		48,8	
Acides gras polyinsaturés (g)	5,46	0,72	1,06
Acide linoléique (g)	4,5	0,59	0,87
Acide arachidonique (ARA) (g)	0,10	0,013	0,019
Acide linolénique (g)	0,45	0,059	0,087
Acide docosahexanoïque (DHA) (g)	0,04	0,005	0,0074
Rapport oméga-6:oméga-3		10,2:1	
Acides gras monoinsaturés (g)	11,68	1,54	2,27
Acides gras saturés (g)	9,00	1,18	1,74
Cholestérol (mg)	0,5	0,1	0,15
Source	Huile de tournesol riche en acide oléique ou huile de carthame riche en acide oléique, huile de copra, huile de soya, DHA et ARA		
Huile de TCM (% des lipides totaux)		0,0	
GLUCIDES (g)	53,8	7,07	10,4
% de l'énergie totale		41,5	
Fibres alimentaires (g)	-	-	-
Fructooligosaccharides à chaîne courte (FOScc) (g)	-	-	-
Galactooligosaccharides (GOS) (g)	-	-	-
Source	Sirop de maïs, saccharose		
Acésulfame-potassium (mg)	-	-	-
Sucralose (mg)	-	-	-

VITAMINES

Vitamine A (ER [UI])	456 (1521)	60 (200)	88 (294)
Vitamine D_3 (mcg [UI])	7,6 (304)	1 (40)	1,47 (59)
Vitamine E (UI)	20	2,6	3,8
Vitamine K_1 (mg)	0,056	0,0074	0,0109
Vitamine C (mg)	41,8	5,5	8,1
Thiamine (mg)	0,30	0,04	0,06
Riboflavine (mg)	0,46	0,06	0,09
Niacine (mg)	6,8	0,9	1,32
Vitamine B_6 (mg)	0,30	0,04	0,06
Acide folique (mg)	0,076	0,010	0,015
Vitamine B_{12} (mg)	0,0023	0,0003	0,0004
Acide pantothénique (mg)	3,8	0,5	0,7
Biotine (mg)	0,0228	0,0030	0,0044
Choline (mg)	62,3	8,2	12,1
Inositol (mg)	-	-	-
Lutéine (mg)	-	-	-

MINÉRAUX

Sodium (mg [mmol])	228 (9,91)	30 (1,30)	44 (1,92)
Potassium (mg [mmol])	555 (14,23)	73 (1,87)	107 (2,75)
Chlorure (mg [mmol])	319 (9,0)	42 (1,18)	62 (1,74)
Calcium (mg)	532	70	103
Phosphore (mg)	380	50	74
Magnésium (mg)	38	5,0	7,0
Fer (mg)	9,1	1,2	1,8
Zinc (mg)	3,8	0,50	0,74
Iode (mg)	0,076	0,010	0,015
Cuivre (mg)	0,380	0,050	0,074
Manganèse (mg)	0,30	0,04	0,06
Sélénium (mg)	0,01179	0,00155	0,00228
Chrome (mg)	-	-	-
Molybdène (mg)	-	-	-

Information nutritionnelle pour Similac® Isomil® avec oméga-3 et oméga-6, en poudre

COMPOSITION

Similac® Isomil® avec oméga-3 et oméga-6, en poudre : Sirop de maïs, saccharose, isolat de protéines de soya, huile de tournesol riche en acide oléique ou huile de carthame riche en acide oléique, huile de copra, huile de soya, phosphate tricalcique, citrate de potassium, chlorure de sodium, huile de **M. alpina*, chlorure de magnésium, L-méthionine, bitartrate de choline, huile de ***C. cohnii*, chlorure de potassium, acide ascorbique, taurine, palmitate d'ascorbyle, sulfate ferreux, hydroxyde de potassium, acétate de *dl*-α-tocophéryle, tartrate de L-carnitine, mélange de tocophérols, sulfate de zinc, nicotinamide, pantothénate de calcium, palmitate de vitamine A, sulfate de cuivre, riboflavine, chlorhydrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, β-carotène, sulfate de manganèse, acide folique, iodure de potassium, phylloquinone, biotine, sélénite de sodium, vitamine D_3, cyanocobalamine.
CONTIENT : Allergènes alimentaires prioritaires : Soya. **Ingrédients associés à des intolérances et (ou) à des sensibilités alimentaires :** Maïs, huile de copra, autres composants du soya. **Ne contient pas d'ingrédients du lait. Fabriqué sur de l'équipement qui traite des produits laitiers.**

Similac® Isomil® avec oméga-3 et oméga-6, en liquide concentré : Eau, sirop de maïs, isolat de protéines de soya, huile de carthame riche en acide oléique, saccharose, huile de soya, huile de copra, amidon de maïs, phosphate calcique, citrate de potassium, chlorure de potassium, chlorure de magnésium, monoglycérides, lécithine de soya, huile de **M. alpina*, chlorure de sodium, L-méthionine, acide ascorbique, huile de ***C. cohnii*, bitartrate de choline, taurine, carraghénine, sulfate ferreux, sulfate de zinc, tartrate de L-carnitine, nicotinamide, acétate de *dl*-α-tocophéryle, d-pantothénate de calcium, palmitate de vitamine A, sulfate de cuivre, riboflavine, chlorhydrate de chlorure de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, iodure de potassium, sulfate de manganèse, acide folique, phylloquinone, biotine, sélénite de sodium, vitamine D_3, cyanocobalamine.
CONTIENT : Allergènes alimentaires prioritaires : Soya. **Ingrédients associés à des intolérances et (ou) à des sensibilités alimentaires :** Maïs, huile de copra, acide citrique, autres composants du soya. **Ne contient pas d'ingrédients du lait. Fabriqué sur de l'équipement qui traite des produits laitiers.**

* Source d'acide arachidonique (ARA). ** Source d'acide docosahexanoïque (DHA).

Les valeurs sont sujettes à changement. Pour connaître la liste la plus récente des ingrédients, des allergènes et l'information nutritionnelle, consulter l'étiquette ou l'emballage du produit.

SIMILAC® ISOMIL®
AVEC OMÉGA-3 ET OMÉGA-6
Préparation de 1re étape à base de soya enrichie de DHA et d'ARA
Pour les nourrissons nés à terme, dès la naissance

SIMILAC® ISOMIL®
AVEC OMÉGA-3 ET OMÉGA-6

Préparation de 1re étape à base de soya enrichie de DHA et d'ARA

Pour les nourrissons nés à terme, dès la naissance

INDICATIONS D'EMPLOI

- Pour les nourrissons qui présentent une allergie aux protéines du lait de vache induite par les IgE, mais chez qui la tolérance au soya a été établie.
- Pour les nourrissons à qui les parents désirent donner une préparation sans lait (alimentation végétarienne, croyances religieuses).
- Pour les nourrissons présentant un déficit en lactase et (ou) une sensibilité au lactose.
- Pour les nourrissons atteints de galactosémie.
- Pour les nourrissons nés à terme et en bonne santé qui ont besoin d'un complément au lait maternel.
- Pour les nourrissons nés à terme et en bonne santé qui ne sont pas allaités.
- Pour les nourrissons qui ont des troubles alimentaires caractérisés entre autres par des gaz, de l'irritabilité ou des régurgitations causés par une intolérance au lactose ou un déficit en lactase[1].
- Pour l'alimentation initiale ou comme supplément.
- Pour l'alimentation par voie orale ou par sonde.

Mises en garde :

- Non indiqué pour administration par voie parentérale.
- Pour les nourrissons atteints de galactosémie, Similac® Isomil® avec oméga-3 et oméga-6 en poudre est la présentation de choix.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Favorise une croissance semblable à celle des nourrissons allaités ou qui reçoivent la préparation Similac® Advance® avec oméga-3 et oméga-6[2].
- À base de protéines de soya, sans protéines de lait de vache.
- Mélange exclusif de deux types de glucides (sirop de maïs et saccharose), qui utilise deux voies d'absorption afin de maximiser l'absorption et de minimiser les risques de malabsorption[3].
- Aide à soulager les problèmes d'irritabilité, de gaz et de diarrhée causés par une intolérance au lactose ou un déficit en lactase[1].
- Contient du DHA (0,15 %‡), un acide gras oméga-3, et de l'ARA (0,4 %‡), un acide gras oméga-6, qui contribuent au développement normal du cerveau et des yeux.
- Contient des nucléotides†.
- Ne contient pas d'oléine d'huile de palme.
- Facile à digérer, comme toutes les préparations pour nourrissons.

DONNÉES TECHNIQUES

	Prêt à servir
Densité calorique (Cal/mL)	0,68
Protéines (% de l'énergie totale)	9,7
Lipides (% de l'énergie totale)	49,1
Glucides (% de l'énergie totale)	41,2
Rapport Cal totales:g d'azote	256:1
Rapport Cal non protéiques:g d'azote	230:1
Eau (g/L)	900
Osmolalité (mOsm/kg d'eau)	239
Charge osmotique rénale (mOsm/L)	155
Viscosité à la température ambiante/lorsque refroidi	S. O.
Diamètre minimal de la sonde pour l'alimentation par gravité/pompe (Fr)	S. O.
Hyporésiduel	Oui
Sans gluten	Oui
Cascher	Oui
Halal	Oui

PRÉSENTATION

Prêt à servir

0P744-806	Similac® Isomil® avec oméga-3 et oméga-6	Bouteilles de verre de 120 mL	48/carton

Les lignes directrices pour la préparation se trouvent à la page 12.

† Naturellement présents. ‡ Des acides gras totaux.

RÉFÉRENCES :

1. Données internes. Étude AH23 d'Abbott Nutrition. Août 2005. **2.** Lasekan *et al.* Growth of Newborn, Term Infants Fed Soy Formulas For 1 Year. *Clin Pediatr* 1999;563-71. **3.** Kerzner B *et al.* Jejunal absorption of sucrose and glucose oligomers in the absence of pancreatic amylase. *Pediatr Res* 1983;17;191A.

INFORMATION NUTRITIONNELLE

ÉNERGIE

	Par 100 mL	Par 100 Cal	Par 120 mL
ÉNERGIE (Cal [kJ])	68 (285)	100 (418)	82 (341)
PROTÉINES (g)	1,66	2,44	2,0
% de l'énergie totale		9,7	
Arginine (mg)	119	175	143
Cystine (mg)	20	29	24
Histidine (mg)	40	59	48
Isoleucine (mg)	79	116	95
Leucine (mg)	128	188	154
Lysine (mg)	99	146	119
Méthionine (mg)	19	28	23
Phénylalanine (mg)	89	131	107
Tryptophane (mg)	20	29	24
Thréonine (mg)	59	87	71
Valine (mg)	79	116	95
Taurine (mg)	4,5	6,6	5,4
Carnitine (mg)	1,1	1,6	1,3
Nucléotides (mg)	-	-	-
Source	Isolat de protéines du soya		
LIPIDES (g)	3,7	5,4	4,4
% de l'énergie totale		49,1	
Acides gras polyinsaturés (g)	0,858	1,262	1,030
Acide linoléique (g)	0,67	0,99	0,80
Acide arachidonique (ARA) (g)	0,014	0,021	0,017
Acide linolénique (g)	0,07	0,103	0,084
Acide docosahexanoïque (DHA) (g)	0,005	0,0074	0,006
Rapport oméga-6:oméga-3		11,0:1	
Acides gras monoinsaturés (g)	1,466	2,156	1,759
Acides gras saturés (g)	1,193	1,754	1,432
Cholestérol (mg)	-	-	-
Source	Huile de tournesol riche en acide oléique, huile de copra, huile de soya, DHA et ARA		
Huile de TCM (% des lipides totaux)		0,0	
GLUCIDES (g)	7,0	10,3	8,4
% de l'énergie totale		41,2	
Fibres alimentaires (g)	-	-	-
Fructooligosaccharides à chaîne courte (FOScc) (g)	-	-	-
Galactooligosaccharides (GOS) (g)	-	-	-
Source	Sirop de maïs, saccharose		
Acésulfame-potassium (mg)	-	-	-
Sucralose (mg)	-	-	-

VITAMINES

Vitamine A (ER [UI])	60 (200)	88 (294)	72 (240)
Vitamine D_3 (mcg [UI])	1 (40)	1,47 (59)	1,2 (48)
Vitamine E (UI)	1,7	2,5	2,0
Vitamine K_1 (mg)	0,01	0,015	0,012
Vitamine C (mg)	5,5	8,1	6,6
Thiamine (mg)	0,04	0,06	0,05
Riboflavine (mg)	0,06	0,09	0,07
Niacine (mg)	0,9	1,3	1,1
Vitamine B_6 (mg)	0,04	0,06	0,05
Acide folique (mg)	0,015	0,022	0,018
Vitamine B_{12} (mg)	0,0003	0,0004	0,00036
Acide pantothénique (mg)	0,5	0,7	0,6
Biotine (mg)	0,003	0,0044	0,004
Choline (mg)	8,2	12,1	9,8
Inositol (mg)	-	-	-
Lutéine (mg)	-	-	-

MINÉRAUX

Sodium (mg [mmol])	30 (1,30)	44 (1,92)	36 (1,57)
Potassium (mg [mmol])	73 (1,87)	107 (2,75)	88 (2,25)
Chlorure (mg [mmol])	42 (1,18)	62 (1,74)	50 (1,42)
Calcium (mg)	70	103	84
Phosphore (mg)	50	74	60
Magnésium (mg)	5	7	6
Fer (mg)	1,2	1,8	1,4
Zinc (mg)	0,5	0,7	0,6
Iode (mg)	0,01	0,015	0,012
Cuivre (mg)	0,05	0,07	0,06
Manganèse (mg)	0,025	0,04	0,03
Sélénium (mg)	0,00155	0,00228	0,00186
Chrome (mg)	-	-	-
Molybdène (mg)	-	-	-

COMPOSITION

Similac® Isomil® avec oméga-3 et oméga-6, prêt à servir :
Eau, sirop de maïs, saccharose, isolat de protéines de soya, huile de carthame riche en acide oléique, huile de copra, huile de soya, citrate de calcium, phosphate tricalcique, citrate de potassium, phosphate monobasique de potassium, chlorure de potassium, mono- et diglycérides, lécithine de soya, huile de **M. alpina*, carraghénine, acide ascorbique, chlorure de magnésium, L-méthionine, bitartrate de choline, phosphate dipotassique, chlorure de sodium, huile de ***C. cohnii*, citrate de sodium, taurine, sulfate ferreux, acétate de *dl*-α-tocophéryle, tartrate de L-carnitine, sulfate de zinc, nicotinamide, pantothénate de calcium, palmitate de vitamine A, sulfate de cuivre, riboflavine, chlorhydrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, sulfate de manganèse, acide folique, iodure de potassium, phylloquinone, biotine, sélénite de sodium, vitamine D_3, cyanocobalamine.
*Source d'acide arachidonique (ARA).
**Source d'acide docosahexanoïque (DHA).
CONTIENT : Allergènes alimentaires prioritaires : Soya. **Ingrédients associés à des intolérances et (ou) à des sensibilités alimentaires :** Maïs, huile de copra, acide citrique, autres composants du soya. **Ne contient pas d'ingrédients du lait. Fabriqué sur de l'équipement qui traite des produits laitiers.**

Les valeurs sont sujettes à changement. Pour connaître la liste la plus récente des ingrédients, des allergènes et l'information nutritionnelle, consulter l'étiquette ou l'emballage du produit.

SIMILAC® ISOMIL®
AVEC OMÉGA-3 ET OMÉGA-6
Préparation de 1re étape à base de soya enrichie de DHA et d'ARA
Pour les nourrissons nés à terme, dès la naissance

SIMILAC® ISOMIL®

Préparation de 1re étape à base de soya enrichie de fer

Pour les nourrissons nés à terme, dès la naissance

INDICATIONS D'EMPLOI

- Pour les nourrissons qui présentent une allergie aux protéines du lait de vache induite par les IgE, mais chez qui la tolérance au soya a été établie.
- Pour les nourrissons à qui les parents désirent donner une préparation sans lait (alimentation végétarienne, croyances religieuses).
- Pour les nourrissons présentant un déficit en lactase et (ou) une sensibilité au lactose.
- Pour les nourrissons atteints de galactosémie.
- Pour les nourrissons nés à terme et en bonne santé qui ont besoin d'un complément au lait maternel.
- Pour les nourrissons nés à terme et en bonne santé qui ne sont pas allaités.
- Pour les nourrissons qui ont des troubles alimentaires caractérisés entre autres par des gaz, de l'irritabilité ou des régurgitations causés par une intolérance au lactose ou un déficit en lactase[1].
- Pour l'alimentation initiale ou comme supplément.
- Pour l'alimentation par voie orale ou par sonde.

Mises en garde :

- Non indiqué pour administration par voie parentérale.
- Pour les nourrissons atteints de galactosémie, Similac® Isomil® en poudre est la présentation de choix.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Contribue à une croissance semblable à celle des nourrissons qui reçoivent du lait maternel ou la préparation pour nourrissons Similac®[2].
- À base de protéines de soya, sans protéines de lait de vache.
- Mélange exclusif de deux types de glucides (sirop de maïs et saccharose), qui utilise deux voies d'absorption afin de maximiser l'absorption et de minimiser les risques de malabsorption[3].
- Aide à soulager les problèmes d'irritabilité, de gaz et de diarrhée causés par une intolérance au lactose ou un déficit en lactase[1].
- Contient des nucléotides†.
- Ne contient pas d'oléine d'huile de palme.
- Facile à digérer, comme toutes les préparations pour nourrissons.

DONNÉES TECHNIQUES

	Liquide concentré (dilution normale)	**Poudre** (dilution normale)
Densité calorique (Cal/mL)	0,68	0,68
Protéines (% de l'énergie totale)	9,7	9,7
Lipides (% de l'énergie totale)	49,1	48,8
Glucides (% de l'énergie totale)	41,2	41,5
Rapport Cal totales:g d'azote	256:1	258:1
Rapport Cal non protéiques:g d'azote	230:1	233:1
Eau (g/L)	901	901
Osmolalité (mOsm/kg d'eau)	239	218
Charge osmotique rénale (mOsm/L)	155	154
Viscosité à la température ambiante/lorsque refroidi	S. O.	S. O.
Diamètre minimal de la sonde pour l'alimentation par gravité/pompe (Fr)	S. O.	S. O.
Hyporésiduel	Oui	Oui
Sans gluten	Oui	Oui
Cascher	Oui	Oui
Halal	Oui	Oui

PRÉSENTATION

Liquide concentré

00203-539	Similac® Isomil®	Boîtes de 385 mL	12/carton

Poudre

0L208-353	Similac® Isomil®	Boîtes de 800 g	6/carton

Les lignes directrices pour la préparation se trouvent à la page 12.

† Naturellement présents.

RÉFÉRENCES :

1. Données internes. Étude AH23 d'Abbott Nutrition. Août 2005. **2.** Lasekan *et al.* Growth of Newborn, Term Infants Fed Soy Formulas For 1 Year. *Clin Pediatr* 1999;563-71. **3.** Kerzner B *et al.* Jejunal absorption of sucrose and glucose oligomers in the absence of pancreatic amylase. *Pediatr Res* 1983;17;191A.

INFORMATION NUTRITIONNELLE

ÉNERGIE

	Par 100 g Poudre	Par 100 mL (dilution normale)	Par 100 Cal
ÉNERGIE (Cal [kJ])	2158 (516)	68 (284)	100 (418)
PROTÉINES (g)	12,6	1,66	2,44
% de l'énergie totale		9,7	
Arginine (mg)	940	120	176
Cystine (mg)	160	20	29
Histidine (mg)	320	40	59
Isoleucine (mg)	600	80	118
Leucine (mg)	1010	130	191
Lysine (mg)	780	100	147
Méthionine (mg)	144	19	28
Phénylalanine (mg)	640	80	118
Tryptophane (mg)	170	20	29
Thréonine (mg)	460	60	88
Valine (mg)	620	80	118
Taurine (mg)	34,2	4,5	6,6
Carnitine (mg)	8,59	1,13	1,66
Nucléotides (mg)	-	-	-
Source	Isolat de protéines du soya		
LIPIDES (g)	28,1	3,7	5,4
% de l'énergie totale		48,8	
Acides gras polyinsaturés (g)	5,42	0,71	1,04
Acide linoléique (g)	4,2	0,55	0,81
Acide arachidonique (ARA) (g)	-	-	-
Acide linolénique (g)	0,55	0,072	0,106
Acide docosahexanoïque (DHA) (g)	-	-	-
Rapport oméga-6:oméga-3		11,0:1	
Acides gras monoinsaturés (g)	11,88	1,56	2,29
Acides gras saturés (g)	9,20	1,21	1,78
Cholestérol (mg)	0,46	0,06	0,09
Source	Huile de tournesol riche en acide oléique ou huile de carthame riche en acide oléique, huile de copra, huile de soya		
Huile de TCM (% des lipides totaux)		0,0	
GLUCIDES (g)	53,2	7,0	10,3
% de l'énergie totale		41,5	
Fibres alimentaires (g)	-	-	-
Fructooligosaccharides à chaîne courte (FOScc) (g)	-	-	-
Galactooligosaccharides (GOS) (g)	-	-	-
Source	Sirop de maïs, sucrose		
Acésulfame-potassium (mg)	-	-	-
Sucralose (mg)	-	-	-

VITAMINES

Vitamine A (ER [UI])	456 (1521)	60 (200)	88 (294)
Vitamine D_3 (mcg [UI])	7,6 (304)	1 (40)	1,47 (59)
Vitamine E (UI)	12,9	1,7	2,5
Vitamine K_1 (mg)	0,056	0,0074	0,0109
Vitamine C (mg)	41,8	5,5	8,1
Thiamine (mg)	0,30	0,04	0,06
Riboflavine (mg)	0,46	0,06	0,09
Niacine (mg)	6,8	0,9	1,32
Vitamine B_6 (mg)	0,30	0,04	0,06
Acide folique (mg)	0,076	0,010	0,015
Vitamine B_{12} (mg)	0,0023	0,0003	0,0004
Acide pantothénique (mg)	3,8	0,5	0,7
Biotine (mg)	0,0228	0,0030	0,0044
Choline (mg)	62,3	8,2	12,1
Inositol (mg)	-	-	-
Lutéine (mg)	-	-	-

MINÉRAUX

Sodium (mg [mmol])	228 (9,91)	30 (1,30)	44 (1,92)
Potassium (mg [mmol])	555 (14,23)	73 (1,87)	107 (2,75)
Chlorure (mg [mmol])	319 (9,0)	42 (1,18)	62 (1,74)
Calcium (mg)	532	70	103
Phosphore (mg)	380	50	74
Magnésium (mg)	38	5	7,0
Fer (mg)	9,1	1,2	1,8
Zinc (mg)	3,8	0,5	0,74
Iode (mg)	0,076	0,010	0,015
Cuivre (mg)	0,380	0,050	0,074
Manganèse (mg)	0,15	0,02	0,03
Sélénium (mg)	0,01179	0,00155	0,00228
Chrome (mg)	-	-	-
Molybdène (mg)	-	-	-

Information nutritionnelle pour Similac® Isomil®, en poudre

COMPOSITION

Similac® Isomil®, en poudre : Sirop de maïs, saccharose, isolat de protéines de soya, huile de tournesol riche en acide oléique ou huile de carthame riche en acide oléique, huile de copra, huile de soya, phosphate tricalcique, citrate de potassium, chlorure de sodium, chlorure de magnésium, L-méthionine, bitartrate de choline, acide ascorbique, taurine, sulfate ferreux, palmitate d'ascorbyle, chlorure de potassium, acétate de dl-α-tocophéryle, tartrate de L-carnitine, sulfate de zinc, nicotinamide, pantothénate de calcium, palmitate de vitamine A, sulfate de cuivre, riboflavine, chlorhydrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, β-carotène, sulfate de manganèse, acide folique, phylloquinone, iodure de potassium, biotine, sélénite de sodium, vitamine D_3, cyanocobalamine.
CONTIENT : Allergènes alimentaires prioritaires : Soya. **Ingrédients associés à des intolérances et (ou) à des sensibilités alimentaires :** Maïs, huile de copra, autres composants du soya. **Ne contient pas d'ingrédients du lait. Fabriqué sur de l'équipement qui traite des produits laitiers.**

Similac® Isomil®, en liquide concentré : Eau, sirop de maïs, isolat de protéines de soya, huile de carthame riche en acide oléique, saccharose, huile de soya, huile de copra, amidon de maïs, phosphate calcique, citrate de potassium, chlorure de potassium, chlorure de magnésium, monoglycérides, lécithine de soya, chlorure de sodium, L-méthionine, acide ascorbique, bitartrate de choline, taurine, carraghénine, sulfate ferreux, sulfate de zinc, tartrate de L-carnitine, nicotinamide, acétate de *d*-α-tocophéryle, pantothénate de calcium, palmitate de vitamine A, sulfate de cuivre, riboflavine, chlorhydrate de chlorure de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, iodure de potassium, sulfate de manganèse, acide folique, phylloquinone, biotine, sélénite de sodium, vitamine D_3, cyanocobalamine.
CONTIENT : Allergènes alimentaires prioritaires : Soya. **Ingrédients associés à des intolérances et (ou) à des sensibilités alimentaires :** Maïs, huile de copra, acide citrique, autres composants du soya. **Ne contient pas d'ingrédients du lait. Fabriqué sur de l'équipement qui traite des produits laitiers.**

Les valeurs sont sujettes à changement. Pour connaître la liste la plus récente des ingrédients, des allergènes et l'information nutritionnelle, consulter l'étiquette ou l'emballage du produit.

SIMILAC® ISOMIL®
Préparation de 1re étape à base de soya enrichie de fer
Pour les nourrissons nés à terme, dès la naissance

SIMILAC® ISOMIL®

Préparation de 2e étape à base de soya enrichie de fer

Pour les nourrissons et tout-petits de 6 à 24 mois

INDICATIONS D'EMPLOI

- Préparation de transition pour les nourrissons nés à terme et en santé, de 6 mois ou plus.
- Pour les nourrissons qui présentent une allergie aux protéines du lait de vache induite par les IgE, mais chez qui la tolérance au soya a été établie.
- Pour les nourrissons à qui les parents désirent donner une préparation sans lait (alimentation végétarienne, croyances religieuses).
- Pour les nourrissons présentant un déficit en lactase et (ou) une sensibilité au lactose.
- Pour les nourrissons atteints de galactosémie.
- Pour les nourrissons qui ont des troubles alimentaires caractérisés entre autres par des gaz, de l'irritabilité ou des régurgitations causés par une intolérance au lactose ou un déficit en lactase[1].

Mise en garde :

- Non indiqué pour administration par voie parentérale.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Spécialement conçu pour aider à satisfaire les besoins nutritionnels qui ne sont pas toujours comblés lors de la transition aux aliments solides.
- Procure 29 % plus de calcium et 20 % plus de phosphore que Similac® Isomil® (1re Étape).
- Contribue à une croissance semblable à celle des nourrissons qui reçoivent du lait maternel ou la préparation pour nourrissons Similac®[2].
- À base de protéines de soya, sans protéines de lait de vache.
- Mélange exclusif de deux types de glucides (sirop de maïs et saccharose), qui utilise deux voies d'absorption afin de maximiser l'absorption et de minimiser les risques de malabsorption[3].
- Aide à soulager les problèmes d'irritabilité, de gaz et de diarrhée causés par une intolérance au lactose ou un déficit en lactase[1].
- Contient des nucléotides†.
- Ne contient pas d'oléine d'huile de palme.
- Facile à digérer, comme toutes les préparations pour nourrissons.

DONNÉES TECHNIQUES

	Poudre (dilution normale)
Densité calorique (Cal/mL)	0,68
Protéines (% de l'énergie totale)	9,7
Lipides (% de l'énergie totale)	48,8
Glucides (% de l'énergie totale)	41,5
Rapport Cal totales:g d'azote	258:1
Rapport Cal non protéiques:g d'azote	233:1
Eau (g/L)	901
Osmolalité (mOsm/kg d'eau)	215
Charge osmotique rénale (mOsm/L)	157
Viscosité à la température ambiante/lorsque refroidi	S. O.
Diamètre minimal de la sonde pour l'alimentation par gravité/pompe (Fr)	S. O.
Hyporésiduel	Oui
Sans gluten	Oui
Cascher	Oui
Halal	Oui

PRÉSENTATION

Poudre

0P602-353	Similac® Isomil® (2e Étape)	Boîtes de 800 g	6/carton

Les lignes directrices pour la préparation se trouvent à la page 12.

† Naturellement présents.

RÉFÉRENCES :

1. Données internes. Étude AH23 d'Abbott Nutrition. Août 2005. **2.** Lasekan *et al.* Growth of Newborn, Term Infants Fed Soy Formulas For 1 Year. *Clin Pediatr* 1999;563-71. **3.** Kerzner B *et al.* Jejunal absorption of sucrose and glucose oligomers in the absence of pancreatic amylase. *Pediatr Res* 1983;17;191A.

INFORMATION NUTRITIONNELLE

ÉNERGIE

	Par 100 g Poudre	Par 100 mL (dilution normale)	Par 100 Cal
ÉNERGIE (Cal [kJ])	516 (2158)	68 (284)	100 (418)
PROTÉINES (g)	12,6	1,66	2,44
% de l'énergie totale		9,7	
Arginine (mg)	940	120	176
Cystine (mg)	160	20	29
Histidine (mg)	320	40	59
Isoleucine (mg)	600	80	118
Leucine (mg)	1010	130	191
Lysine (mg)	780	100	147
Méthionine (mg)	144	19	28
Phénylalanine (mg)	640	80	118
Tryptophane (mg)	170	20	29
Thréonine (mg)	460	60	88
Valine (mg)	620	80	118
Taurine (mg)	34,2	4,5	6,6
Carnitine (mg)	8,59	1,13	1,66
Nucléotides (mg)	-	-	-
Source	Isolat de protéines du soya		
LIPIDES (g)	28,1	3,7	5,4
% de l'énergie totale		48,8	
Acides gras polyinsaturés (g)	5,42	0,71	1,04
Acide linoléique (g)	4,2	0,55	0,81
Acide arachidonique (ARA) (g)	-	-	-
Acide linolénique (g)	0,55	0,072	0,106
Acide docosahexanoique (DHA) (g)	-	-	-
Rapport oméga-6:oméga-3		11,0:1	
Acides gras monoinsaturés (g)	11,88	1,56	2,29
Acides gras saturés (g)	9,20	1,21	1,78
Cholestérol (mg)	0,46	0,08	0,09
Source	Huile de carthame riche en acide oléique ou huile de tournesol riche en acide oléique, huile de copra, huile de soya		
Huile de TCM (% des lipides totaux)		0,0	
GLUCIDES (g)	53,2	7,0	10,3
% de l'énergie totale		41,5	
Fibres alimentaires (g)	-	-	-
Fructooligosaccharides à chaîne courte (FOScc) (g)	-	-	-
Galactooligosaccharides (GOS) (g)	-	-	-
Source	Sirop de maïs, saccharose		
Acésulfame-potassium (mg)	-	-	-
Sucralose (mg)	-	-	-

VITAMINES

Vitamine A (ER [UI])	456 (1521)	60 (200)	88 (294)
Vitamine D_3 (mcg [UI])	7,6 (304)	1 (40)	147 (59)
Vitamine E (UI)	12,9	1,7	2,5
Vitamine K_1 (mg)	0,056	0,0074	0,0109
Vitamine C (mg)	41,8	5,5	8,1
Thiamine (mg)	0,30	0,04	0,06
Riboflavine (mg)	0,46	0,06	0,09
Niacine (mg)	6,8	0,9	1,32
Vitamine B_6 (mg)	0,30	0,04	0,06
Acide folique (mg)	0,076	0,010	0,015
Vitamine B_{12} (mg)	0,0023	0,0003	0,0004
Acide pantothénique (mg)	3,8	0,5	0,7
Biotine (mg)	0,0228	0,0030	0,0044
Choline (mg)	62,3	8,2	12,1
Inositol (mg)	-	-	-
Lutéine (mg)	-	-	-

MINÉRAUX

Sodium (mg [mmol])	228 (9,91)	30 (1,30)	44 (1,92)
Potassium (mg [mmol])	555 (14,23)	73 (1,87)	107 (2,75)
Chlorure (mg [mmol])	319 (9,00)	42 (1,18)	62 (1,74)
Calcium (mg)	684	90	132
Phosphore (mg)	456	60	88
Magnésium (mg)	38	5	7
Fer (mg)	9,1	1,2	1,8
Zinc (mg)	3,8	0,5	0,74
Iode (mg)	0,076	0,010	0,015
Cuivre (mg)	0,38	0,05	0,074
Manganèse (mg)	0,15	0,02	0,03
Sélénium (mg)	0,01179	0,00155	0,00228
Chrome (mg)	-	-	-
Molybdène (mg)	-	-	-

COMPOSITION

Similac® Isomil® (2e Étape), en poudre :
Sirop de maïs, saccharose, isolat de protéines de soya, huile de tournesol riche en acide oléique ou huile de carthame riche en acide oléique, huile de copra, huile de soya, phosphate tricalcique, citrate de potassium, chlorure de sodium, chlorure de magnésium, L-méthionine, bitartrate de choline, acide ascorbique, taurine, sulfate ferreux, palmitate d'ascorbyle, chlorure de potassium, acétate de *dl*-α-tocophéryle, tartrate de L-carnitine, sulfate de zinc, nicotinamide, pantothénate de calcium, palmitate de vitamine A, sulfate de cuivre, riboflavine, chlorhydrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, β-carotène, sulfate de manganèse, acide folique, phylloquinone, iodure de potassium, biotine, sélénite de sodium, vitamine D_3, cyanocobalamine.
CONTIENT : Allergènes alimentaires prioritaires : Soya. **Ingrédients associés à des intolérances et (ou) à des sensibilités alimentaires :** Maïs, huile de copra, autres composants du soya. **Ne contient pas d'ingrédients du lait. Fabriqué sur de l'équipement qui traite des produits laitiers.**

Les valeurs sont sujettes à changement. Pour connaître la liste la plus récente des ingrédients, des allergènes et l'information nutritionnelle, consulter l'étiquette ou l'emballage du produit.

SIMILAC® ISOMIL®
Préparation de 2e étape à base de soya enrichie de fer
Pour les nourrissons et tout-petits de 6 à 24 mois

SIMILAC® PM 60/40

Préparation à faible teneur en fer

Pour les nourrissons nés à terme, dès la naissance

INDICATIONS D'EMPLOI

- Pour les nourrissons prédisposés à l'hypercalcémie et à l'hypocalcémie ou traités pour ces anomalies du taux de calcium sérique, en raison d'une hyperphosphatémie.
- Pour les nourrissons qui présentent des troubles de la fonction rénale et qui pourraient bénéficier d'un apport réduit en minéraux.

Mises en garde :

- Non indiqué pour administration par voie parentérale.
- Un supplément en fer provenant d'autres sources doit être administré.
- Dans les cas où le nourrisson perd des quantités anormales d'un ou de plusieurs électrolytes, il peut être nécessaire de lui donner des électrolytes d'une source autre que la préparation.
- Dans les cas de nourrissons de faible poids à la naissance qui pèsent moins de 1 500 g, il peut être nécessaire de leur donner des suppléments de calcium, de phosphore et de sodium pendant les périodes de croissance rapide.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Rapport Ca:P de 2:1 pour aider à optimiser l'équilibre entre le calcium et le phosphore.
- Protéines de lactosérum proportionnellement prédominantes (rapport lactosérum:caséine de 60:40).
- Teneur en minéraux physiologiques se rapprochant de celle du lait maternel.
- Faible teneur en fer (0,15 mg/100 mL) offrant la possibilité d'ajouter la quantité de fer requise selon les besoins.
- Faible charge osmotique rénale (129 mOsm/L).
- Ne contient pas d'oléine d'huile de palme.
- Facile à digérer, comme toutes les préparations pour nourrissons.

DONNÉES TECHNIQUES

	Prêt à servir
Densité calorique (Cal/mL)	0,68
Protéines (% de l'énergie totale)	9,3
Lipides (% de l'énergie totale)	49,9
Glucides (% de l'énergie totale)	40,8
Rapport Cal totales:g d'azote	275:1
Rapport Cal non protéiques:g d'azote	246:1
Eau (g/L)	903
Osmolalité (mOsm/kg d'eau)	289
Charge osmotique rénale (mOsm/L)	129
Viscosité à la température ambiante/lorsque refroidi	S. O.
Diamètre minimal de la sonde pour l'alimentation par gravité/pompe (Fr)	S. O.
Hyporésiduel	Oui
Sans gluten	Oui
Cascher	Oui
Halal	Oui

PRÉSENTATION

Prêt à servir

0M476-806	Similac® PM 60/40	Bouteilles de verre de 120 mL	48/carton

Les lignes directrices pour la préparation se trouvent à la page 12.

INFORMATION NUTRITIONNELLE

ÉNERGIE

	Par 100 mL	Par 100 Cal	Par 120 mL
ÉNERGIE (Cal [kJ])	68 (285)	100 (418)	82 (342)
PROTÉINES (g)	1,58	2,32	1,90
% de l'énergie totale		9,3	
Arginine (mg)	45	66	54
Cystine (mg)	23	34	28
Histidine (mg)	34	50	41
Isoleucine (mg)	92	135	110
Leucine (mg)	155	228	186
Lysine (mg)	130	191	156
Méthionine (mg)	39	57	47
Phénylalanine (mg)	61	90	73
Tryptophane (mg)	20	29	24
Thréonine (mg)	82	121	98
Valine (mg)	100	147	120
Taurine (mg)	3,7	5,4	4,4
Carnitine (mg)	1,13	1,66	1,36
Source	Concentré de protéines de lactosérum, caséinate de sodium		
LIPIDES (g)	3,76	5,53	4,51
% de l'énergie totale		49,9	
Acides gras polyinsaturés (g)	1,325	1,949	1,590
Acide linoléique (g)	0,80	1,18	0,96
Acide arachidonique (ARA) (g)	-	-	-
Acide linolénique (g)	0,10	0,15	0,12
Acide docosahexanoïque (DHA) (g)	0,00	0,00	0,00
Rapport oméga-6:oméga-3		7,1:1	
Acides gras monoinsaturés (g)	0,587	0,863	0,704
Acides gras saturés (g)	1,659	2,440	1,991
Cholestérol (mg)	2,4	3,5	2,9
Source	Huile de soya, huile de copra		
Huile de TCM (% des lipides totaux)		0,0	
GLUCIDES (g)	6,9	10,1	8,3
% de l'énergie totale		40,8	
Fibres alimentaires (g)	-	-	-
Fructooligosaccharides à chaîne courte (FOScc) (g)	-	-	-
Galactooligosaccharides (GOS) (g)	-	-	-
Source		Lactose	
Acésulfame-potassium (mg)	-	-	-
Sucralose (mg)	-	-	-

VITAMINES

Vitamine A (ER [UI])	60 (200)	88 (294)	72 (240)
Vitamine D_3 (mcg [UI])	1,00 (40)	1,47 (59)	1,20 (48)
Vitamine E (UI)	2,0	2,9	2,4
Vitamine K_1 (mg)	0,0055	0,0081	0,0066
Vitamine C (mg)	5,5	8,1	6,6
Thiamine (mg)	0,065	0,096	0,078
Riboflavine (mg)	0,10	0,15	0,12
Niacine (mg)	0,73	1,07	0,88
Vitamine B_6 (mg)	0,04	0,06	0,05
Acide folique (mg)	0,010	0,015	0,012
Vitamine B_{12} (mg)	0,00015	0,00022	0,00018
Acide pantothénique (mg)	0,30	0,44	0,36
Biotine (mg)	0,003	0,004	0,0036
Choline (mg)	8,2	12,1	9,8
Inositol (mg)	16,5	24,3	19,8

MINÉRAUX

Sodium (mg [mmol])	16 (0,70)	24 (1,04)	19 (0,83)
Potassium (mg [mmol])	58 (1,49)	85 (2,18)	70 (1,79)
Chlorure (mg [mmol])	40 (1,13)	59 (1,66)	48 (1,35)
Calcium (mg)	38	56	46
Phosphore (mg)	19	28	23
Magnésium (mg)	4	6	5
Fer (mg)	0,15	0,22	0,18
Zinc (mg)	0,5	0,7	0,6
Iode (mg)	0,0042	0,0062	0,0050
Cuivre (mg)	0,06	0,09	0,07
Manganèse (mg)	0,0034	0,0050	0,0041
Sélénium (mg)	0,0016	0,0024	0,0019
Chrome (mg)	-	-	-
Molybdène (mg)	-	-	-

COMPOSITION

Similac® PM 60/40, prêt à servir :
Eau, lactose, huile de soya, huile de copra, concentré de protéines de lactosérum, caséinate de sodium, acide citrique, mono- et diglycérides, hydroxide de calcium, phosphate monobasique de potassium, chlorure de magnésium, m-inositol, acide ascorbique, chlorure de calcium, chlorure de potassium, chlorure de sodium, chlorure de choline, carraghénine, taurine, dextrose, acétate de *dl*-α-tocophéryle, sulfate de zinc, L-carnitine, nicotinamide, d-pantothénate de calcium, sulfate ferreux, sulfate de cuivre, palmitate de vitamine A, chlorhydrate de thiamine, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, acide folique, sulfate de manganèse, iodure de potassium, phylloquinone, biotine, sélénate de sodium, vitamine D_3, cyanocobalamine.
CONTIENT : Allergènes alimentaires prioritaires : Lait. **Ingrédients associés à des intolérances et (ou) à des sensibilités alimentaires :** Huile de copra, acide citrique, lactose, autres composants du soya.

Les valeurs sont sujettes à changement. Pour connaître la liste la plus récente des ingrédients, des allergènes et l'information nutritionnelle, consulter l'étiquette ou l'emballage du produit.

SIMILAC® PM 60/40
Préparation à faible teneur en fer
Pour les nourrissons nés à terme, dès la naissance

SIMILAC® 24 AVEC FER

Préparation hypercalorique

Pour les nourrissons nés à terme, dès la naissance

INDICATIONS D'EMPLOI

- Pour les nourrissons ayant des besoins énergétiques accrus:
  - Petits pour l'âge gestationnel
  - Faible poids à la naissance
  - Retard de croissance
- Pour les nourrissons qui ne tolèrent pas les grands volumes.
- Pour l'alimentation par voie orale ou par sonde.

Mise en garde :

- Non indiqué pour administration par voie parentérale.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Densité calorique élevée : procure 81 Cal par 100 mL (24 Cal par 30 mL).
- Ne contient pas d'oléine d'huile de palme.
- Facile à digérer, comme toutes les préparations pour nourrissons.

DONNÉES TECHNIQUES

	Prêt à servir
Densité calorique (Cal/mL)	0,81
Protéines (% de l'énergie totale)	10,8
Lipides (% de l'énergie totale)	47,5
Glucides (% de l'énergie totale)	41,7
Rapport Cal totales:g d'azote	238:1
Rapport Cal non protéiques:g d'azote	212:1
Eau (g/L)	881
Osmolalité (mOsm/kg d'eau)	360
Charge osmotique rénale (mOsm/L)	202
Viscosité à la température ambiante/lorsque refroidi	S. O.
Diamètre minimal de la sonde pour l'alimentation par gravité/pompe (Fr)	S. O.
Hyporésiduel	Oui
Sans gluten	Oui
Cascher	Oui
Halal	Oui

PRÉSENTATION

Prêt à servir

00403-748	Similac® 24 avec fer	Bouteilles de verre de 120 mL	48/carton

Les lignes directrices pour la préparation se trouvent à la page 12.

INFORMATION NUTRITIONNELLE

ÉNERGIE

	Par 100 mL	Par 100 Cal	Par 120 mL
ÉNERGIE (Cal [kJ])	81 (340)	100 (418)	97(408)
PROTÉINES (g)	2,2	2,7	2,6
% de l'énergie totale		10,8	
Arginine (mg)	74	91	89
Cystine (mg)	16	20	19
Histidine (mg)	61	75	73
Isoleucine (mg)	111	137	133
Leucine (mg)	210	259	252
Lysine (mg)	171	211	205
Méthionine (mg)	51	63	61
Phénylalanine (mg)	103	127	124
Tryptophane (mg)	29	36	35
Thréonine (mg)	82	101	98
Valine (mg)	139	172	167
Taurine (mg)	5,4	6,7	6,5
Carnitine (mg)	-	-	-
Source	Lait écrémé évaporé ou sec		
LIPIDES (g)	4,3	5,3	5,2
% de l'énergie totale	47,5	47,5	47,5
Acides gras polyinsaturés (g)	0,966	1,193	1,159
Acide linoléique (g)	0,65	0,80	0,78
Acide arachidonique (ARA) (g)	-	-	-
Acide linolénique (g)	0,085	0,105	0,102
Acide docosahexanoïque (DHA) (g)	-	-	-
Rapport oméga-6:oméga-3		9,7:1	
Acides gras monoinsaturés (g)	1,682	2,077	2,018
Acides gras saturés (g)	1,436	1,773	1,723
Cholestérol (mg)	1,9	2,3	2,3
Source	Huile de carthame riche en acide oléique ou huile de tournesol riche en acide oléique, huile de copra, huile de soya		
Huile de TCM (% des lipides totaux)		0,0	
GLUCIDES (g)	8,5	10,5	10,2
% de l'énergie totale		41,7	
Fibres alimentaires (g)	-	-	-
Fructooligosaccharides à chaîne courte (FOScc) (g)	-	-	-
Galactooligosaccharides (GOS) (g)	-	-	-
Source	Lactose		
Acésulfame-potassium (mg)	-	-	-
Sucralose (mg)	-	-	-

VITAMINES

Vitamine A (ER [UI])	72 (240)	89 (296)	86 (288)
Vitamine D_3 (mcg [UI])	1,20 (48)	1,48 (59)	1,45 (58)
Vitamine E (UI)	2,0	2,5	2,4
Vitamine K_1 (mg)	0,0066	0,0081	0,0079
Vitamine C (mg)	6,6	8,1	7,9
Thiamine (mg)	0,078	0,096	0,094
Riboflavine (mg)	0,1	0,1	0,1
Niacine (mg)	0,8	1,0	1,0
Vitamine B_6 (mg)	0,05	0,06	0,06
Acide folique (mg)	0,01	0,01	0,01
Vitamine B_{12} (mg)	0,00018	0,00022	0,00022
Acide pantothénique (mg)	0,4	0,5	0,5
Biotine (mg)	0,0036	0,0044	0,0043
Choline (mg)	9,7	12,0	11,6
Inositol (mg)	-	-	-

MINÉRAUX

Sodium (mg [mmol])	27,5 (1,20)	34 (1,48)	33 (1,43)
Potassium (mg [mmol])	107 (2,74)	132 (3,38)	128 (3,28)
Chlorure (mg [mmol])	66 (1,86)	81 (2,28)	79 (2,23)
Calcium (mg)	73	90	88
Phosphore (mg)	57	70	68
Magnésium (mg)	6	7	7
Fer (mg)	1,5	1,9	1,8
Zinc (mg)	0,6	0,7	0,7
Iode (mg)	0,012	0,015	0,014
Cuivre (mg)	0,07	0,09	0,08
Manganèse (mg)	0,0041	0,0051	0,0049
Sélénium (mg)	0,00155	0,00191	0,00186
Chrome (mg)	-	-	-
Molybdène (mg)	-	-	-

COMPOSITION

Similac® 24 avec fer, prêt à servir :
Eau, lait écrémé évaporé ou sec, lactose, huile de tournesol riche en acide oléique ou huile de carthame riche en acide oléique, huile de copra, huile de soya, mono- et diglycérides, lécithine de soya, carraghénine, acide ascorbique, sulfate ferreux, taurine, chlorure de choline, acétate de *d*-α-tocophéryle, sulfate de zinc, nicotinamide, pantothénate de calcium, citrate de potassium, phosphate calcique, sulfate de cuivre, palmitate de vitamine A, chlorhydrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, acide folique, phylloquinone, sulfate de manganèse, biotine, sélénite de sodium, vitamine D_3, cyanocobalamine.
CONTIENT : Allergènes alimentaires prioritaires : Lait. **Ingrédients associés à des intolérances et (ou) à des sensibilités alimentaires :** Huile de copra, lactose, autres composants du soya.

Les valeurs sont sujettes à changement. Pour connaître la liste la plus récente des ingrédients, des allergènes et l'information nutritionnelle, consulter l'étiquette ou l'emballage du produit.

SIMILAC® 24 AVEC FER
Préparation hypercalorique
Pour les nourrissons nés à terme, dès la naissance

SIMILAC® 27 AVEC FER

Préparation hypercalorique

Pour les nourrissons nés à terme, dès la naissance

INDICATIONS D'EMPLOI

- Pour les nourrissons ayant des besoins énergétiques accrus :
  - Petits pour l'âge gestationnel
  - Faible poids à la naissance
  - Retard de croissance
- Pour les nourrissons qui ne tolèrent pas les grands volumes.
- Pour l'alimentation par voie orale ou par sonde.

Mise en garde :

- Non indiqué pour administration par voie parentérale.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Densité calorique élevée : procure 92 Cal par 100 mL (27 Cal par 30 mL).
- Ne contient pas d'oléine d'huile de palme.
- Facile à digérer, comme toutes les préparations pour nourrissons.

DONNÉES TECHNIQUES

	Prêt à servir
Densité calorique (Cal/mL)	0,92
Protéines (% de l'énergie totale)	10,9
Lipides (% de l'énergie totale)	47,2
Glucides (% de l'énergie totale)	41,9
Rapport Cal totales:g d'azote	235:1
Rapport Cal non protéiques:g d'azote	209:1
Eau (g/L)	866
Osmolalité (mOsm/kg d'eau)	410
Charge osmotique rénale (mOsm/L)	227
Viscosité à la température ambiante/lorsque refroidi	S. O.
Diamètre minimal de la sonde pour l'alimentation par gravité/pompe (Fr)	S. O.
Hyporésiduel	Oui
Sans gluten	Oui
Cascher	Oui
Halal	Oui

PRÉSENTATION

Prêt à servir

0G817-748	Similac® 27 avec fer	Bouteilles de verre de 120 mL	48/carton

Les lignes directrices pour la préparation se trouvent à la page 12.

INFORMATION NUTRITIONNELLE

ÉNERGIE

	Par 100 mL	Par 100 Cal	Par 120 mL
ÉNERGIE (Cal [kJ])	92 (386)	100 (418)	110 (463)
PROTÉINES (g)	2,5	2,7	3,0
% de l'énergie totale		10,9	
Arginine (mg)	84	91	101
Cystine (mg)	19	21	23
Histidine (mg)	69	75	83
Isoleucine (mg)	126	137	151
Leucine (mg)	239	260	287
Lysine (mg)	194	211	233
Méthionine (mg)	58	63	70
Phénylalanine (mg)	118	128	142
Tryptophane (mg)	33	36	40
Thréonine (mg)	93	101	112
Valine (mg)	158	172	190
Taurine (mg)	6,0	6,5	7,2
Carnitine (mg)	-	-	-
Source		Lait écrémé sec	
LIPIDES (g)	4,8	5,2	5,8
% de l'énergie totale		47,2	
Acides gras polyinsaturés (g)	1,079	1,173	1,295
Acide linoléique (g)	0,72	0,78	0,86
Acide arachidonique (ARA) (g)	-	-	-
Acide linolénique (g)	0,095	0,103	0,114
Acide docosahexanoïque (DHA) (g)	-	-	-
Rapport oméga-6:oméga-3		10:1	
Acides gras monoinsaturés (g)	1,874	2,037	2,249
Acides gras saturés (g)	1,606	1,746	1,927
Cholestérol (mg)	2,2	2,4	2,6
Source	Huile de carthame riche en acide oléique ou huile de tournesol riche en acide oléique, huile de copra, huile de soya		
Huile de TCM (% des lipides totaux)		0,0	
GLUCIDES (g)	9,6	10,4	11,5
% de l'énergie totale		41,9	
Fibres alimentaires (g)	-	-	-
Fructooligosaccharides à chaîne courte (FOScc) (g)	-	-	-
Galactooligosaccharides (GOS) (g)	-	-	-
Source		Lactose	
Acésulfame-potassium (mg)	-	-	-
Sucralose (mg)	-	-	-

VITAMINES

Vitamine A (ER [UI])	81 (269)	88 (292)	97 (323)
Vitamine D_3 (mcg [UI])	1,25 (54)	1,48 (59)	1,63 (65)
Vitamine E (UI)	2,3	2,5	2,8
Vitamine K_1 (mg)	0,0074	0,0080	0,0089
Vitamine C (mg)	7,4	8,0	8,9
Thiamine (mg)	0,067	0,073	0,080
Riboflavine (mg)	0,1	0,1	0,1
Niacine (mg)	0,9	1,0	1,1
Vitamine B_6 (mg)	0,05	0,05	0,06
Acide folique (mg)	0,01	0,01	0,01
Vitamine B_{12} (mg)	0,0002	0,0002	0,0002
Acide pantothénique (mg)	0,4	0,4	0,5
Biotine (mg)	0,004	0,004	0,005
Choline (mg)	11,0	12,0	13,2
Inositol (mg)	-	-	-

MINÉRAUX

Sodium (mg [mmol])	31 (1,35)	34 (1,48)	37 (1,61)
Potassium (mg [mmol])	110 (2,82)	120 (3,08)	132 (3,38)
Chlorure (mg [mmol])	78 (2,20)	85 (2,40)	94 (2,65)
Calcium (mg)	84	91	101
Phosphore (mg)	64	70	77
Magnésium (mg)	6	7	7
Fer (mg)	1,7	1,8	2,0
Zinc (mg)	0,7	0,8	0,8
Iode (mg)	0,016	0,017	0,019
Cuivre (mg)	0,06	0,07	0,07
Manganèse (mg)	0,0046	0,0050	0,0055
Sélénium (mg)	-	-	-
Chrome (mg)	-	-	-
Molybdène (mg)	-	-	-

COMPOSITION

Similac® 27 avec fer, prêt à servir :
Eau, lait écrémé sec, lactose, huile de tournesol riche en acide oléique ou huile de carthame riche en acide oléique, huile de copra, huile de soya, mono- et diglycérides, lécithine de soya, acide ascorbique, carraghénine, sulfate ferreux, taurine, sulfate de zinc, chlorure de choline, citrate de potassium, acétate de *d*-α-tocophéryle, nicotinamide, pantothénate de calcium, sulfate de cuivre, palmitate de vitamine A, chlorhydrate de thiamine, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, bicarbonate de sodium, acide folique, phylloquinone, sulfate de manganèse, biotine, vitamine D_3, cyanocobalamine.
CONTIENT : Allergènes alimentaires prioritaires : Lait. **Ingrédients associés à des intolérances et (ou) à des sensibilités alimentaires :** Huile de copra, lactose, autres composants du soya.

Les valeurs sont sujettes à changement. Pour connaître la liste la plus récente des ingrédients, des allergènes et l'information nutritionnelle, consulter l'étiquette ou l'emballage du produit.

SIMILAC® 27 AVEC FER
Préparation hypercalorique
Pour les nourrissons nés à terme, dès la naissance

ALIMENTUM®

Préparation hypoallergène fortement hydrolysée

Pour les nourrissons nés à terme, dès la naissance

INDICATIONS D'EMPLOI

Une préparation hypoallergène complète sur le plan nutritionnel qui convient aux nourrissons dans les cas suivants :

- Symptômes de coliques dus à une sensibilité aux protéines (du lait de vache et [ou] du soya)
- Sensibilité aux protéines intactes (du lait de vache et [ou] du soya)
- Allergies alimentaires graves
- Maldigestion des protéines
- Malabsorption des lipides

- Pour l'alimentation initiale ou comme supplément.
- Pour l'alimentation par voie orale ou par sonde.

Mises en garde :

- Non indiqué pour administration par voie parentérale.
- Non indiqué chez les nourrissons atteints de galactosémie.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Alimentum® satisfait à la norme médicale internationalement reconnue pour la mention « hypoallergène »[1,2]. « Hypoallergène » ne signifie pas « non allergène ».
- Caséine fortement hydrolysée† enrichie d'acides aminés libres pour les nourrissons qui sont sensibles aux protéines intactes ou qui sont incapables de les digérer.
- Mélange exclusif de deux types de glucides (saccharose et amidon de tapioca modifié), qui utilise deux voies d'absorption afin de maximiser l'absorption et de minimiser les risques de malabsorption[3].
- Environ 33 % des lipides sont des triglycérides à chaîne moyenne, source de lipides faciles à digérer et bien absorbés[4].
- Ne contient pas de lactose ajouté afin d'aider à éviter la diarrhée associée au lactose.
- Ne contient pas d'oléine d'huile de palme.
- Facile à digérer, comme toutes les préparations pour nourrissons.

DONNÉES TECHNIQUES

	Prêt à servir
Densité calorique (Cal/mL)	0,68
Protéines (% de l'énergie totale)	11
Lipides (% de l'énergie totale)	49
Glucides (% de l'énergie totale)	40
Rapport Cal totales:g d'azote	S. O.
Rapport Cal non protéiques:g d'azote	S. O.
Eau (g/L)	900
Osmolalité (mOsm/kg d'eau)	370
Charge osmotique rénale (mOsm/L)	123
Viscosité à la température ambiante/lorsque refroidi	Clair/clair
Diamètre minimal de la sonde pour l'alimentation par gravité/pompe (Fr)	5/5
Hyporésiduel	Oui
Sans gluten	Oui
Cascher	Non
Halal	Non

PRÉSENTATION

Prêt à servir

58266-941	Alimentum®	Boîtes de 237 mL	6 emballages de 4/carton

† Fortement hydrolysée en petits peptides et acides aminés pour minimiser le risque de réactions allergiques.

RÉFÉRENCES :

1. Kleinman RE *et al.* Use of infant formulas in infants with cow milk allergy: a review and recommendations. *Pediatr Allergy Immunol* 1991;2:146–55. **2.** American Academy of Pediatrics. Committee on Nutrition. Hypoallergenic Infant Formulas. *Pediatrics* 2000;106(2):346-9. **3.** Kerzner B *et al.* Jejunal absorption of sucrose and glucose oligomers in the absence of pancreatic amylase. *Pediatr Res* 1983;17;191A. **4.** Duggan C, Watkins JB and Walker WA. Nutrition in Pediatrics: Standard and Specialized Enteral Formulas. BC Decker Inc. Hamilton. 2008.

INFORMATION NUTRITIONNELLE

ÉNERGIE

	Par 100 mL	Par 100 Cal	Par 237 mL
ÉNERGIE (Cal [kJ])	68 (285)	100 (418)	161 (674)
PROTÉINES (g)	1,86	2,75	4,41
% de l'énergie totale		11	
Arginine (mg)	78	115	185
Cystine (mg)	28,9	42,8	68,5
Histidine (mg)	54	79	128
Isoleucine (mg)	109	160	258
Leucine (mg)	178	262	422
Lysine (mg)	161	237	382
Méthionine (mg)	54	79	128
Phénylalanine (mg)	87	128	206
Tryptophane (mg)	27,7	41,0	65,6
Thréonine (mg)	89	131	211
Valine (mg)	139	204	329
Taurine (mg)	5,2	7,7	12,3
Carnitine (mg)	1,5	2,2	3,6
Source	Hydrolysat de caséine, acides aminés libres		
LIPIDES (g)	3,75	5,55	8,89
% de l'énergie totale		49	
Acides gras polyinsaturés (g)	1,28	1,88	3,03
Acide linoléique (g)	1,28	1,90	3,03
Acide arachidonique (ARA) (g)	-	-	-
Acide linolénique (g)	0,075	0,110	0,178
Acide docosahexanoïque (DHA) (g)	-	-	-
Rapport oméga-6:oméga-3		S. O.	
Acides gras monoinsaturés (g)	0,26	0,38	0,616
Acides gras saturés (g)	1,82	2,68	4,313
Cholestérol (mg)	-	-	-
Source	Huile de carthame, huile de triglycérides à chaîne moyenne (TCM), huile de soya		
Huile de TCM (% des lipides totaux)		33	
GLUCIDES (g)	6,9	10,2	16,4
% de l'énergie totale		40	
Fibres alimentaires (g)	-	-	-
Fructooligosaccharides à chaîne courte (FOScc) (g)	-	-	-
Galactooligosaccharides (GOS) (g)	-	-	-
Source	Saccharose, amidon de tapioca modifié		
Acésulfame-potassium (mg)	-	-	-
Sucralose (mg)	-	-	-

VITAMINES

Vitamine A (ER [UI])	61 (203)	90 (300)	144 (481)
Vitamine D_3 (mcg [UI])	0,75 (30)	1,13 (45)	1,78 (71)
Vitamine E (UI)	2,0	3,0	4,7
Vitamine K_1 (mg)	0,010	0,015	0,024
Vitamine C (mg)	6,0	9,0	14,2
Thiamine (mg)	0,041	0,060	0,097
Riboflavine (mg)	0,061	0,090	0,145
Niacine (mg)	0,913	1,350	2,2
Vitamine B_6 (mg)	0,041	0,060	0,097
Acide folique (mg)	0,01	0,015	0,024
Vitamine B_{12} (mg)	0,0003	0,0004	0,0007
Acide pantothénique (mg)	0,507	0,750	1,202
Biotine (mg)	0,003	0,005	0,007
Choline (mg)	8,5	12,6	20,1
Inositol (mg)	3,4	5,0	8,1

MINÉRAUX

Sodium (mg [mmol])	30 (1,30)	44 (1,91)	71 (3,09)
Potassium (mg [mmol])	80 (2,05)	118 (3,03)	190 (4,86)
Chlorure (mg [mmol])	54 (1,52)	80 (2,26)	128 (3,61)
Calcium (mg)	71	105	168
Phosphore (mg)	51	75	121
Magnésium (mg)	5,1	7,5	12,1
Fer (mg)	1,2	1,8	2,8
Zinc (mg)	0,51	0,75	1,21
Iode (mg)	0,01	0,01	0,02
Cuivre (mg)	0,051	0,075	0,121
Manganèse (mg)	0,0054	0,0080	0,0128
Sélénium (mg)	0,0019	0,0028	0,0045
Chrome (mg)	-	-	-
Molybdène (mg)	-	-	-

COMPOSITION

Alimentum®, prêt à servir :
Eau, saccharose, hydrolysat de caséine (hydrolyse enzymatique), amidon de tapioca modifié, huile de carthame, triglycérides à chaîne moyenne (huiles de copra et [ou] de palmiste modifiées), huile de soya, citrate de calcium, phosphate calcique, carraghénine, phosphate de potassium, acide ascorbique, chlorure de magnésium, hydroxyde de calcium, chlorure de sodium, chlorure de potassium, dichlorhydrate de L-cystine, citrate de potassium, L-tyrosine, chlorure de choline, L-tryptophane, sulfate ferreux, taurine, m-inositol, acétate de *dl*-α-tocophéryle, sulfate de zinc, L-carnitine, nicotinamide, pantothénate de calcium, palmitate de vitamine A, sulfate de cuivre, chlorhydrate de chlorure de thiamine, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, acide folique, iodure de potassium, phylloquinone, biotine, sélénate de sodium, vitamine D_3, cyanocobalamine.
CONTIENT : Allergènes alimentaires prioritaires : Lait‡. **Ingrédients associés à des intolérances et (ou) à des sensibilités alimentaires :** Huile de copra, autres composants du soya, lactose.

‡ Alimentum® renferme une protéine prédigérée (hydrolysat de caséine). Cette préparation hypoallergène est spécialement conçue pour les nourrissons et les enfants qui ne tolèrent pas les préparations à base de lait ou de soya.

Les valeurs sont sujettes à changement. Pour connaître la liste la plus récente des ingrédients, des allergènes et l'information nutritionnelle, consulter l'étiquette ou l'emballage du produit.

ALIMENTUM®
Préparation hypoallergène fortement hydrolysée
Pour les nourrissons nés à terme, dès la naissance

ALIMENTUM® ADVANCE®
AVEC OMÉGA-3 ET OMÉGA-6

Préparation hypoallergène fortement hydrolysée

Pour les nourrissons nés à terme, dès la naissance

INDICATIONS D'EMPLOI

Une préparation hypoallergène complète sur le plan nutritionnel qui convient aux nourrissons dans les cas suivants :

- Symptômes de coliques dus à une sensibilité aux protéines (du lait de vache et [ou] du soya)
- Sensibilité aux protéines intactes (du lait de vache et [ou] du soya)
- Allergies alimentaires graves
- Maldigestion des protéines
- Malabsorption des lipides

- Pour l'alimentation initiale ou comme supplément.
- Pour l'alimentation par voie orale ou par sonde.

Mises en garde :

- Non indiqué pour administration par voie parentérale.
- Non indiqué chez les nourrissons atteints de galactosémie.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Alimentum® satisfait à la norme médicale internationalement reconnue pour la mention « hypoallergène »[1,2]. « Hypoallergène » ne signifie pas « non allergène ».
- Caséine fortement hydrolysée† enrichie d'acides aminés libres pour les nourrissons qui sont sensibles aux protéines intactes ou qui sont incapables de les digérer.
- Mélange exclusif de deux types de glucides (saccharose et amidon de tapioca modifié), qui utilise deux voies d'absorption afin de maximiser l'absorption et de minimiser les risques de malabsorption[3].
- Contient du DHA (0,15%‡), un acide gras oméga-3, et de l'ARA (0,4%‡), un acide gras oméga-6, qui contribuent au développement normal du cerveau et des yeux.
- Environ 33 % des lipides sont des triglycérides à chaîne moyenne, source de lipides faciles à digérer et bien absorbés[4].
- Ne contient pas de lactose ajouté afin d'aider à éviter la diarrhée associée au lactose.
- Ne contient pas d'oléine d'huile de palme.
- Facile à digérer, comme toutes les préparations pour nourrissons.

DONNÉES TECHNIQUES

	Prêt à servir
Densité calorique (Cal/mL)	0,68
Protéines (% de l'énergie totale)	11
Lipides (% de l'énergie totale)	48
Glucides (% de l'énergie totale)	41
Rapport Cal totales:g d'azote	S. O.
Rapport Cal non protéiques:g d'azote	S. O.
Eau (g/L)	899
Osmolalité (mOsm/kg d'eau)	370
Charge osmotique rénale (mOsm/L)	171,3
Viscosité à la température ambiante/lorsque refroidi	S. O.
Diamètre minimal de la sonde pour l'alimentation par gravité/pompe (Fr)	5/5
Hyporésiduel	Oui
Sans gluten	Oui
Cascher	Non
Halal	Non

PRÉSENTATION

Prêt à servir

59738-871	Alimentum® Advance® avec oméga-3 et oméga-6	Bouteilles de plastique de 59 mL	48/carton

† Fortement hydrolysée en petits peptides et acides aminés pour minimiser le risque de réactions allergiques. ‡ Des acides gras totaux.

RÉFÉRENCES :

1. Kleinman RE *et al.* Use of infant formulas in infants with cow milk allergy: a review and recommendations. *Pediatr Allergy Immunol* 1991;2:146–55. **2.** American Academy of Pediatrics. Committee on Nutrition. Hypoallergenic Infant Formulas. *Pediatrics* 2000;106(2):346-9. **3.** Kerzner B *et al.* Jejunal absorption of sucrose and glucose oligomers in the absence of pancreatic amylase. *Pediatr Res* 1983;17;191A. **4.** Duggan C, Watkins JB and Walker WA. Nutrition in Pediatrics: Standard and Specialized Enteral Formulas. BC Decker Inc. Hamilton. 2008.

INFORMATION NUTRITIONNELLE

ÉNERGIE

	Par 100 mL (dilution normale)	Par 100 Cal	Par 59 mL
ÉNERGIE (Cal [kJ])	68 (285)	100 (418)	40 (168)
PROTÉINES (g)	1,86	2,75	1,10
% de l'énergie totale		11	
Arginine (mg)	78	115	46
Cystine (mg)	28,9	42,8	17,1
Histidine (mg)	54	79	32
Isoleucine (mg)	109	160	64
Leucine (mg)	178	262	105
Lysine (mg)	161	237	95
Méthionine (mg)	54	79	32
Phénylalanine (mg)	87	128	51
Tryptophane (mg)	27,7	41,0	16,3
Thréonine (mg)	89	131	53
Valine (mg)	139	204	82
Taurine (mg)	5,2	7,6	3,1
Carnitine (mg)	1,5	2,2	0,9
Source	Hydrolysat de caséine, acides aminés libres		
LIPIDES (g)	3,75	5,54	2,21
% de l'énergie totale	-	48	
Acides gras polyinsaturés (g)	1,76	2,59	1,04
Acide linoléique (g)	1,28	1,90	0,76
Acide arachidonique (ARA) (g)	0,012	0,018	0,007
Acide linolénique (g)	0,074	0,110	0,044
Acide docosahexanoïque (DHA) (g)	0,005	0,0074	0,003
Rapport oméga-6:oméga-3		S. O.	
Acides gras monoinsaturés (g)	0,45	0,66	0,27
Acides gras saturés (g)	1,54	2,26	0,91
Cholestérol (mg)	-	-	-
Source	Huile de carthame, huile de triglycérides à chaîne moyenne (TCM), huile de soya		
Huile de TCM (% des lipides totaux)		33	
GLUCIDES (g)	6,9	10,2	4,1
% de l'énergie totale		41	
Fibres alimentaires (g)	-	-	-
Fructooligosaccharides à chaîne courte (FOScc) (g)	-	-	-
Galactooligosaccharides (GOS) (g)	-	-	-
Source	Saccharose, amidon de tapioca modifié		
Acésulfame-potassium (mg)	-	-	-
Sucralose (mg)	-	-	-

VITAMINES

Vitamine A (ER [UI])	61 (203)	90 (300)	36 (120)
Vitamine D_3 (mcg [UI])	0,75(30)	1,10 (45)	0,44 (18)
Vitamine E (UI)	2,0	3,0	1,2
Vitamine K_1 (mg)	0,010	0,015	0,006
Vitamine C (mg)	6,0	8,8	3,5
Thiamine (mg)	0,041	0,060	0,024
Riboflavine (mg)	0,061	0,090	0,036
Niacine (mg)	0,91	1,34	0,54
Vitamine B_6 (mg)	0,041	0,060	0,024
Acide folique (mg)	0,010	0,015	0,006
Vitamine B_{12} (mg)	0,00030	0,00044	0,00018
Acide pantothénique (mg)	0,507	0,746	0,299
Biotine (mg)	0,0030	0,0045	0,002
Choline (mg)	8	12	5
Inositol (mg)	3,0	4,4	1,8

MINÉRAUX

Sodium (mg [mmol])	30 (1,30)	44 (1,92)	18 (0,77)
Potassium (mg [mmol])	80 (2,05)	118 (3,02)	47 (1,21)
Chlorure (mg [mmol])	54 (1,52)	80 (2,24)	32 (0,90)
Calcium (mg)	71	105	42
Phosphore (mg)	51	75	30
Magnésium (mg)	5,1	7,5	3,0
Fer (mg)	1,2	1,8	0,7
Zinc (mg)	0,51	0,75	0,30
Iode (mg)	0,010	0,015	0,006
Cuivre (mg)	0,051	0,075	0,030
Manganèse (mg)	0,005	0,0074	0,003
Sélénium (mg)	0,0012	0,0018	0,0007
Chrome (mg)	-	-	-
Molybdène (mg)	-	-	-

COMPOSITION

Alimentum® Advance® avec oméga-3 et oméga-6, prêt à servir :
Eau, saccharose, hydrolysat de caséine (provenant du lait), amidon de tapioca modifié, huile de carthame, triglycérides à chaîne moyenne (huiles de copra et [ou] de palmiste modifiées), huile de soya, citrate de calcium, phosphate calcique, carraghénine, acide ascorbique, phosphate de potassium, chlorure de magnésium, huile de *M. alpina*, citrate de potassium, chlorure de sodium, hydroxyde de calcium, hydroxyde de potassium, dihydrochloride de L-cystine, chlorure de potassium, huile de **C. cohnii*, L-tyrosine, L-tryptophane, chlorure de choline, sulfate ferreux, taurine, m-inositol, sulfate de zinc, acétate de *dl*-α-tocophéryle, L-carnitine, nicotinamide, pantothénate de calcium, sulfate de cuivre, palmitate de vitamine A, chlorhydrate de chlorure de thiamine, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, acide folique, iodure de potassium, phylloquinone, biotine, sélénate de sodium, vitamine D_3, cyanocobalamine.
* Source d'acide arachidonique (ARA).
** Source d'acide docosahexanoïque (DHA).
CONTIENT : Allergènes alimentaires prioritaires : Lait††. **Ingrédients associés à des intolérances et (ou) à des sensibilités alimentaires :** Huile de copra, autres composants du soya, lactose.

†† Alimentum® renferme une protéine prédigérée (hydrolysat de caséine). Cette préparation hypoallergène est spécialement conçue pour les nourrissons et les enfants qui ne tolèrent pas les préparations à base de lait ou de soya.

Les valeurs sont sujettes à changement. Pour connaître la liste la plus récente des ingrédients, des allergènes et l'information nutritionnelle, consulter l'étiquette ou l'emballage du produit.

ALIMENTUM® ADVANCE®
AVEC OMÉGA-3 ET OMÉGA-6
Préparation hypoallergène fortement hydrolysée
Pour les nourrissons nés à terme, dès la naissance

NOTES :

PRÉPARATIONS POUR TOUT-PETITS ET ENFANTS

DANS CETTE SECTION

PediaSure®	84
PediaSure® Fibre	86
PediaSure® Plus (avec fibres)	88
PediaSure Complete®	90

PRÉPARATIONS POUR TOUT-PETITS ET ENFANTS

AU SUJET DES FOScc

QUE SONT LES FOScc?

Les fructooligosaccharides à chaîne courte (FOScc) sont des glucides naturels qui ne sont pas digérés dans le tractus gastro-intestinal, mais qui fermentent sous l'action des bactéries bénéfiques. Ils ne contribuent pas à la formation de résidus dans les fèces. On les appelle des prébiotiques parce qu'ils stimulent la croissance de bactéries intestinales bénéfiques[1].

QUELS BIENFAITS LES FOS PROCURENT-ILS?

- Lors de leur fermentation dans le côlon, les FOScc sont transformés par des bifidobactéries en acides gras à chaîne courte qui sont une source d'énergie pour les cellules du côlon[2].
- Les FOScc peuvent procurer de façon sélective de l'énergie aux bactéries bénéfiques du côlon[1].

Produits nutritionnels pour enfants d'Abbott Nutrition contenant des FOScc :
PediaSure Complete® et PediaSure® Plus (avec fibres).

RÉFÉRENCES :
1. Gibson GR *et al.* Selective stimulation of bifidobacteria in the human colon by oligofructose and inulin. *Gastroenterology* 1995;108:975-82. **2.** Royall D *et al.* Clinical significance of colonic fermentation. *Am J Gastroenterol* 1990;85:1307-12.

PEDIASURE®

Comme source unique d'alimentation

Pour les enfants de 1 à 10 ans

INDICATIONS D'EMPLOI

- Pour les enfants recevant une alimentation par sonde à court ou à long terme.
- Pour les enfants ayant des besoins nutritionnels accrus.
- Pour les enfants souffrant de malnutrition ou présentant un risque de malnutrition.
- Pour les enfants qui ont un retard de croissance.
- Pour l'alimentation par voie orale ou par sonde.
- Comme supplément ou source unique d'alimentation.

Mises en garde :

- Non indiqué pour administration par voie parentérale.
- Non indiqué chez les enfants atteints de galactosémie.
- Pour les enfants de moins d'un an, consulter un médecin ou un autre professionnel de la santé avant d'utiliser PediaSure®.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Enrichi de taurine et de carnitine pour aider à prévenir les carences associées à l'alimentation par sonde à long terme[1-3].
- Environ 19,6 % des lipides sont des triglycérides à chaîne moyenne, source de lipides faciles à digérer et bien absorbés[4].
- Procure 26 vitamines et minéraux essentiels.
- Rapport Ca:P de 1.2:1 pour aider à optimiser l'équilibre entre le calcium et le phosphore.
- Isotonique, pour aider dans les cas d'intolérance aux préparations hyperosmolaires.
- Trois délicieuses saveurs pour éviter la lassitude gustative et améliorer l'observance du traitement nutritionnel.

DONNÉES TECHNIQUES

	Prêt à servir
Densité calorique (Cal/mL)	1,0
Protéines (% de l'énergie totale)	11,9
Lipides (% de l'énergie totale)	44,2
Glucides (% de l'énergie totale)	43,9
Rapport Cal totales:g d'azote	213:1
Rapport Cal non protéiques:g d'azote	187:1
Eau (g/L)	854
Osmolalité (mOsm/kg d'eau)	310
Charge osmotique rénale (mOsm/L)	275
Viscosité à la température ambiante/lorsque refroidi	Clair/clair
Diamètre minimal de la sonde pour l'alimentation par gravité/pompe (Fr)	10/8
Hyporésiduel	Oui
Sans gluten	Oui
Cascher	Oui
Halal	Oui

PRÉSENTATION

Prêt à servir

62200-570	PediaSure®, vanille	Boîtes de 235 mL	12/carton
0M139-570	PediaSure®, fraise	Boîtes de 235 mL	12/carton
0M140-570	PediaSure®, chocolat	Boîtes de 235 mL	12/carton

RÉFÉRENCES :

1. Feller AG *et al.* Subnormal concentrations of serum selenium and plasma carnitine in chronically tube-fed patients. *Am J Clin Nutr* 1987;45:476-83. **2.** Fischer MH *et al.* Improved selenium carnitine and taurine status in an enterally fed population. *JPEN* 1990;14:270-274. **3.** Bourdet B *et al.* Plasma Free Carnitine Depletion in Polytrauma Patients. *J Nutr Health Aging* 2010;14(3):253. **4.** Duggan C, Watkins JB et Walker WA. Nutrition in Pediatrics: Standard and Specialized Enteral Formulas. BC Decker Inc. Hamilton. 2008.

INFORMATION NUTRITIONNELLE

ÉNERGIE

	Par 100 mL	Par 235 mL
ÉNERGIE (Cal [kJ])	100 (419)	235 (984)
PROTÉINES (g)	3,0	7,1
% de l'énergie totale	11,9	
Arginine (mg)	98	230
Cystine (mg)	19	45
Histidine (mg)	80	188
Isoleucine (mg)	158	371
Leucine (mg)	278	653
Lysine (mg)	227	533
Méthionine (mg)	81	190
Phénylalanine (mg)	137	322
Tryptophane (mg)	35	82
Thréonine (mg)	121	284
Valine (mg)	195	458
Taurine (mg)	7,2	16,9
Carnitine (mg)	1,7	4
Source	Caséinate de sodium, concentré de protéines de lactosérum	
LIPIDES (g)	5,0	11,7
% de l'énergie totale	44,2	
Acides gras polyinsaturés (g)	1,22	2,87
Acide linoléique (g)	0,8	1,9
Acide arachidonique (ARA) (g)	-	-
Acide linolénique (g)	0,09	0,21
Acide docosahexanoïque (DHA) (g)	-	-
Rapport oméga-6:oméga-3	10:1	
Acides gras monoinsaturés (g)	2,18	5,13
Acides gras saturés (g)	1,35	3,17
Cholestérol (mg)	1,9	4,47
Source	Huile de carthame riche en acide oléique ou huile de tournesol riche en acide oléique, huile de soya, huile de triglycérides à chaîne moyenne (TCM)	
Huile de TCM (% des lipides totaux)	19,6	
GLUCIDES (g)	11	26
% de l'énergie totale	43,9	
Fibres alimentaires (g)	-	-
Fructooligosaccharides à chaîne courte (FOScc) (g)	-	-
Galactooligosaccharides (GOS) (g)	-	-
Source	Maltodextrine de maïs, saccharose	
Acésulfame-potassium (mg)	-	-
Sucralose (mg)	-	-

VITAMINES

Vitamine A (ER [UI])	78 (259)	182 (608)
Vitamine D_3 (mcg [UI])	0,8 (32,0)	1,9 (75,2)
Vitamine E (UI)	3,5	8,2
Vitamine K_1 (mg)	0,003	0,008
Vitamine C (mg)	10,2	24,0
Thiamine (mg)	0,27	0,64
Riboflavine (mg)	0,21	0,50
Niacine (mg)	1,7	4,0
Vitamine B_6 (mg)	0,26	0,62
Acide folique (mg)	0,037	0,088
Vitamine B_{12} (mg)	0,0006	0,0014
Acide pantothénique (mg)	1,0	2,40
Biotine (mg)	0,032	0,076
Choline (mg)	30,0	70,5
Inositol (mg)	-	-

MINÉRAUX

Sodium (mg [mmol])	37 (1,61)	87 (3,78)
Potassium (mg [mmol])	130 (3,33)	306 (7,85)
Chlorure (mg [mmol])	101 (2,85)	238 (6,71)
Calcium (mg)	97	228
Phosphore (mg)	80	188
Magnésium (mg)	19,8	46,5
Fer (mg)	1,4	3,3
Zinc (mg)	1,2	2,8
Iode (mg)	0,0097	0,0230
Cuivre (mg)	0,10	0,24
Manganèse (mg)	0,25	0,59
Sélénium (mg)	0,0023	0,0054
Chrome (mg)	0,0030	0,0071
Molybdène (mg)	0,0036	0,0084

Information nutritionnelle pour PediaSure®, vanille, boîte de 235 mL

COMPOSITION

PediaSure®, vanille :
Eau, maltodextrine de maïs, saccharose, caséinate de sodium, huile de carthame riche en acide oléique ou huile de tournesol riche en acide oléique, huile de soya, triglycérides à chaîne moyenne (huiles de copra et [ou] de palmiste modifiées), concentré de protéines de lactosérum, phosphate calcique, arômes naturel et artificiel, citrate de potassium, chlorure de magnésium, phosphate de potassium, chlorure de potassium, mono- et diglycérides, lécithine de soya, chlorure de choline, carraghénine, acide ascorbique, taurine, acétate de *dl*-α-tocophéryle, sulfate ferreux, sulfate de zinc, nicotinamide, L-carnitine, pantothénate de calcium, sulfate de manganèse, acide citrique, chlorhydrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, sulfate de cuivre, palmitate de vitamine A, acide folique, biotine, iodure de potassium, molybdate de sodium, sélénite de sodium, phylloquinone, cyanocobalamine, vitamine D_3.
CONTIENT : Allergènes alimentaires prioritaires : Lait. **Ingrédients associés à des intolérances et (ou) à des sensibilités alimentaires :** Maïs, huile de copra, acide citrique, arômes naturel et artificiel, lactose, autres composants du soya.

Ingrédient supplémentaire pour la saveur de chocolat : Poudre de cacao solubilisée.
Ingrédient supplémentaire pour la saveur de fraise : Colorant. **Ingrédients associés à des intolérances et (ou) à des sensibilités alimentaires :** Colorant.

Les valeurs sont sujettes à changement. Pour connaître la liste la plus récente des ingrédients, des allergènes et l'information nutritionnelle, consulter l'étiquette ou l'emballage du produit.

PEDIASURE®
Comme source unique d'alimentation
Pour les enfants de 1 à 10 ans

PEDIASURE® FIBRE

Comme source unique d'alimentation

Pour les enfants de 1 à 10 ans

INDICATIONS D'EMPLOI

- Pour les enfants qui peuvent bénéficier d'un apport supplémentaire en fibres alimentaires.
- Pour les enfants recevant une alimentation par sonde à court ou à long terme.
- Pour les enfants ayant des besoins nutritionnels accrus.
- Pour les enfants souffrant de malnutrition ou présentant un risque de malnutrition.
- Pour les enfants qui ont un retard de croissance.
- Pour l'alimentation par voie orale ou par sonde.
- Comme supplément ou source unique d'alimentation.

Mises en garde :

- Non indiqué pour administration par voie parentérale.
- Non indiqué chez les enfants atteints de galactosémie.
- Pour les enfants de moins d'un an, consulter un médecin ou un autre professionnel de la santé avant d'utiliser PediaSure® Fibre.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Contient 1,1 g de fibres alimentaires par portion de 235 mL.
- Contient des fibres de soya en quantité bien tolérée par les enfants.
- Enrichi de taurine et de carnitine pour aider à prévenir les carences associées à l'alimentation par sonde à long terme[1-3].
- Environ 19,6 % des lipides sont des triglycérides à chaîne moyenne, source de lipides faciles à digérer et bien absorbés[4].
- Rapport Ca:P de 1,2:1 pour aider à optimiser l'équilibre entre le calcium et le phosphore.

DONNÉES TECHNIQUES

	Prêt à servir
Densité calorique (Cal/mL)	1,0
Protéines (% de l'énergie totale)	12,2
Lipides (% de l'énergie totale)	44,8
Glucides (% de l'énergie totale)	43,0
Rapport Cal totales:g d'azote	211:1
Rapport Cal non protéiques:g d'azote	185:1
Eau (g/L)	854
Osmolalité (mOsm/kg d'eau)	345
Charge osmotique rénale (mOsm/L)	275
Viscosité à la température ambiante/lorsque refroidi	Clair/clair
Diamètre minimal de la sonde pour l'alimentation par gravité/pompe (Fr)	10/8
Hyporésiduel	Non
Sans gluten	Oui
Cascher	Oui
Halal	Oui

PRÉSENTATION

Prêt à servir

0M138-570	PediasSure® Fibre, vanille	Boîtes de 235 mL	12/carton
0M138-793	PediaSure® Fibre, vanille	Boîtes de 235 mL	24/carton

RÉFÉRENCES :

1. Feller AG *et al.* Subnormal concentrations of serum selenium and plasma carnitine in chronically tube-fed patients. *Am J Clin Nutr* 1987;45:476-83. **2.** Fischer MH *et al.* Improved selenium carnitine and taurine status in an enterally fed population. *JPEN* 1990;14:270-274. **3.** Bourdet B *et al.* Plasma Free Carnitine Depletion in Polytrauma Patients. *J Nutr Health Aging* 2010;14(3):253. **4.** Duggan C, Watkins JB et Walker WA. Nutrition in Pediatrics: Standard and Specialized Enteral Formulas. BC Decker Inc. Hamilton. 2008.

INFORMATION NUTRITIONNELLE

ÉNERGIE

	Par 100 mL	Par 235 mL
ÉNERGIE (Cal [kJ])	100 (419)	235 (984)
PROTÉINES (g)	3,0	7,1
% de l'énergie totale	12,2	
Arginine (mg)	98	230
Cystine (mg)	19	45
Histidine (mg)	80	188
Isoleucine (mg)	158	371
Leucine (mg)	278	653
Lysine (mg)	227	533
Méthionine (mg)	81	190
Phénylalanine (mg)	137	322
Tryptophane (mg)	35	82
Thréonine (mg)	121	284
Valine (mg)	195	458
Taurine (mg)	7,2	16,9
Carnitine (mg)	1,7	4
Source	Caséinate de sodium, concentré de protéines de lactosérum	
LIPIDES (g)	5,0	11,7
% de l'énergie totale	44,8	
Acides gras polyinsaturés (g)	1,220	2,867
Acide linoléique (g)	0,8	1,9
Acide arachidonique (ARA) (g)	-	-
Acide linolénique (g)	0,09	0,21
Acide docosahexanoïque (DHA) (g)	-	-
Rapport oméga-6:oméga-3	10:1	
Acides gras monoinsaturés (g)	2,184	5,132
Acides gras saturés (g)	1,347	3,165
Cholestérol (mg)	1,9	4,5
Source	Huile de carthame riche en acide oléique ou huile de tournesol riche en acide oléique, huile de soya, huile de triglycérides à chaîne moyenne (TCM)	
Huile de TCM (% des lipides totaux)	19,6	
GLUCIDES (g)	11	26
% de l'énergie totale	43,0	
Fibres alimentaires (g)	0,5	1,1
Fructooligosaccharides à chaîne courte (FOScc) (g)	-	-
Galactooligosaccharides (GOS) (g)	-	-
Source	Maltodextrine de maïs, saccharose, polysaccharides de soya	
Acésulfame-potassium (mg)	-	-
Sucralose (mg)	-	-

VITAMINES

Vitamine A (ER [UI])	78 (259)	182 (608)
Vitamine D_3 (mcg [UI])	0,80 (32,0)	1,88 (75,2)
Vitamine E (UI)	(3,5)	(8,2)
Vitamine K_1 (mg)	0,003	0,008
Vitamine C (mg)	10,2	24,0
Thiamine (mg)	0,27	0,64
Riboflavine (mg)	0,21	0,50
Niacine (mg)	1,7	4,0
Vitamine B_6 (mg)	0,26	0,62
Acide folique (mg)	0,037	0,088
Vitamine B_{12} (mg)	0,0006	0,0014
Acide pantothénique (mg)	1,0	2,40
Biotine (mg)	0,032	0,076
Choline (mg)	30,0	70,5
Inositol (mg)	-	-

MINÉRAUX

Sodium (mg [mmol])	37 (1,61)	87 (3,78)
Potassium (mg [mmol])	130 (3,33)	306 (7,85)
Chlorure (mg [mmol])	101 (2,85)	238 (6,71)
Calcium (mg)	97	228
Phosphore (mg)	80	188
Magnésium (mg)	19,8	46,5
Fer (mg)	1,4	3,3
Zinc (mg)	1,2	2,8
Iode (mg)	0,0097	0,0230
Cuivre (mg)	0,10	0,24
Manganèse (mg)	0,25	0,59
Sélénium (mg)	0,0023	0,0054
Chrome (mg)	0,0030	0,0071
Molybdène (mg)	0,0036	0,0084

COMPOSITION

PediaSure® Fibre, vanille :
Eau, maltodextrine de maïs, saccharose, caséinate de sodium, huile de carthame riche en acide oléique ou huile de tournesol riche en acide oléique, huile de soya, triglycérides à chaîne moyenne (huiles de copra et [ou] de palmiste modifiées), concentré de protéines de lactosérum, polysaccharides du soya, phosphate calcique, arômes naturel et artificiel, citrate de potassium, chlorure de magnésium, phosphate de potassium, chlorure de potassium, mono- et diglycérides, lécithine de soya, chlorure de choline, carraghénine, acide ascorbique, taurine, acétate de *dl*-α-tocophéryle, sulfate ferreux, sulfate de zinc, nicotinamide, L-carnitine, pantothénate de calcium, sulfate de manganèse, acide citrique, chlorhydrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, sulfate de cuivre, palmitate de vitamine A, acide folique, biotine, iodure de potassium, molybdate de sodium, sélénite de sodium, phylloquinone, cyanocobalamine, vitamine D_3.
CONTIENT : Allergènes alimentaires prioritaires : Lait, soya. **Ingrédients associés à des intolérances et (ou) à des sensibilités alimentaires :** Maïs, huile de copra, acide citrique, arômes naturel et artificiel, lactose, autres composants du soya.

Les valeurs sont sujettes à changement. Pour connaître la liste la plus récente des ingrédients, des allergènes et l'information nutritionnelle, consulter l'étiquette ou l'emballage du produit.

PEDIASURE® FIBRE
Comme source unique d'alimentation
Pour les enfants de 1 à 10 ans

PEDIASURE® PLUS (AVEC FIBRES)

Comme source unique d'alimentation

Pour les enfants de 1 à 10 ans

INDICATIONS D'EMPLOI

- Pour les enfants dont l'apport en liquides doit être restreint ou qui ne tolèrent pas les grands volumes.
- Pour les enfants qui peuvent bénéficier d'un apport supplémentaire en fibres alimentaires.
- Pour les enfants recevant une alimentation par sonde à court ou à long terme.
- Pour les enfants ayant des besoins nutritionnels accrus.
- Pour les enfants souffrant de malnutrition ou présentant un risque de malnutrition.
- Pour les enfants qui ont un retard de croissance.
- Pour l'alimentation par voie orale ou par sonde.
- Comme supplément ou source unique d'alimentation.

Mises en garde :

- Non indiqué pour administration par voie parentérale.
- Non indiqué chez les enfants atteints de galactosémie.
- Pour les enfants de moins d'un an, consulter un médecin ou un autre professionnel de la santé avant d'utiliser PediaSure® Plus (avec fibres).

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Densité nutritionnelle élevée qui procure plus de calories dans un moins grand volume : 118 calories de plus par portion que PediaSure®.
- Procure 1,76 g de fibres alimentaires par portion de 235 mL.
- Renferme 0,82 g de fructooligosaccharides à chaîne courte (FOScc) par portion de 235 mL. Pour plus de renseignements sur les FOScc, consulter la page 83.
- Enrichi de taurine et de carnitine pour aider à prévenir les carences associées à l'alimentation par sonde à long terme[1-3].
- Environ 19,6 % des lipides sont des triglycérides à chaîne moyenne, source de lipides faciles à digérer et bien absorbés[4].

DONNÉES TECHNIQUES

	Prêt à servir
Densité calorique (Cal/mL)	1,5
Protéines (% de l'énergie totale)	11,1
Lipides (% de l'énergie totale)	43,6
Glucides (% de l'énergie totale)	45,3
Rapport Cal totales:g d'azote	231:1
Rapport Cal non protéiques:g d'azote	205:1
Eau (g/L)	775
Osmolalité (mOsm/kg d'eau)	387
Charge osmotique rénale (mOsm/L)	375
Viscosité à la température ambiante/lorsque refroidi	Clair/clair
Diamètre minimal de la sonde pour l'alimentation par gravité/pompe (Fr)	10/8
Hyporésiduel	Non
Sans gluten	Non†
Cascher	Oui
Halal	Oui

PRÉSENTATION

Prêt à servir

0P313-570	PediaSure® Plus, vanille (avec fibres)	Boîtes de 235 mL	12/carton
0P313-793	PediaSure® Plus, vanille (avec fibres)	Boîtes de 235 mL	24/carton

RÉFÉRENCES :

1. Feller AG *et al.* Subnormal concentrations of serum selenium and plasma carnitine in chronically tube-fed patients. *Am J Clin Nutr* 1987;45:476-83. **2.** Fischer MH *et al.* Improved selenium carnitine and taurine status in an enterally fed population. *JPEN* 1990;14:270-274. **3.** Bourdet B *et al.* Plasma Free Carnitine Depletion in Polytrauma Patients. *J Nutr Health Aging* 2010;14(3):253. **4.** Duggan C, Watkins JB et Walker WA. Nutrition in Pediatrics: Standard and Specialized Enteral Formulas. BC Decker Inc. Hamilton. 2008.

INFORMATION NUTRITIONNELLE

ÉNERGIE

	Par 100 mL	Par 235 mL
ÉNERGIE (Cal [kJ])	150 (628)	353 (1476)
PROTÉINES (g)	4,20	9,87
% de l'énergie totale	11,1	
Arginine (mg)	133	313
Cystine (mg)	29	68
Histidine (mg)	114	268
Isoleucine (mg)	219	515
Leucine (mg)	390	917
Lysine (mg)	333	783
Méthionine (mg)	105	247
Phénylalanine (mg)	190	447
Tryptophane (mg)	38	89
Thréonine (mg)	181	425
Valine (mg)	266	625
Taurine (mg)	10,8	25,4
Carnitine (mg)	2,6	6,1
Source	Caséinates de sodium et de calcium, concentré de protéines de lactosérum	
LIPIDES (g)	7,47	17,55
% de l'énergie totale	43,6	
Acides gras polyinsaturés (g)	2,050	4,818
Acide linoléique (g)	1,20	2,82
Acide arachidonique (ARA) (g)	-	-
Acide linolénique (g)	0,13	0,31
Acide docosahexanoïque (DHA) (g)	-	-
Rapport oméga-6:oméga-3	11:1	
Acides gras monoinsaturés (g)	3,606	8,474
Acides gras saturés (g)	1,440	3,384
Cholestérol (mg)	2,1	4,9
Source	Huile de carthame riche en acide oléique ou huile de tournesol riche en acide oléique, huile de soya, huile de triglycérides à chaîne moyenne (TCM)	
Huile de TCM (% des lipides totaux)	19,6	
GLUCIDES (g)	18	41
% de l'énergie totale	45,3	
Fibres alimentaires (g)	0,75	1,76
Fructooligosaccharides à chaîne courte (FOScc) (g)	0,35	0,82
Galactooligosaccharides (GOS) (g)	-	-
Source	Maltodextrine de maïs, saccharose, FOScc, balles d'avoine modifiées, fibres de cotylédons de soya, gomme arabique, carboxyméthylcellulose	
Acésulfame-potassium (mg)	-	-
Sucralose (mg)	-	-

VITAMINES

Vitamine A (ER [UI])	99 (330)	233 (776)
Vitamine D_3 (mcg [UI])	1,13 (45)	2,65 (106)
Vitamine E (UI)	2,3	5,4
Vitamine K_1 (mg)	0,006	0,014
Vitamine C (mg)	10,2	24,0
Thiamine (mg)	0,27	0,63
Riboflavine (mg)	0,21	0,49
Niacine (mg)	1,70	3,99
Vitamine B_6 (mg)	0,26	0,61
Acide folique (mg)	0,037	0,087
Vitamine B_{12} (mg)	0,001	0,002
Acide pantothénique (mg)	1,0	2,4
Biotine (mg)	0,032	0,075
Choline (mg)	30,0	70,5
Inositol (mg)	12,0	28,2

MINÉRAUX

Sodium (mg [mmol])	65 (2,83)	153 (6,65)
Potassium (mg [mmol])	180 (4,62)	423 (10,85)
Chlorure (mg [mmol])	122 (3,44)	287 (8,10)
Calcium (mg)	90	212
Phosphore (mg)	80	188
Magnésium (mg)	24,4	57,3
Fer (mg)	1,4	3,3
Zinc (mg)	1,4	3,3
Iode (mg)	0,01	0,023
Cuivre (mg)	0,17	0,40
Manganèse (mg)	0,10	0,24
Sélénium (mg)	0,002	0,005
Chrome (mg)	0,003	0,007
Molybdène (mg)	0,004	0,009

COMPOSITION

PediaSure® Plus (avec fibres), vanille :
Eau, maltodextrine de maïs, huile de tournesol riche en acide oléique ou huile de carthame riche en acide oléique, caséinate de sodium, huile de soya, saccharose, triglycérides à chaîne moyenne (huiles de copra et [ou] de palmiste modifiées), caséinate de calcium, concentré de protéines de lactosérum, citrate de potassium, fructooligosaccharides, balles d'avoine modifiées, fibres de cotylédons de soya, arômes naturel et artificiel, phosphate calcique, chlorure de magnésium, gomme arabique, phosphate de potassium, mono- et diglycérides, lécithine de soya, citrate de sodium, carboxyméthylcellulose sodique, chlorure de choline, chlorure de sodium, acide ascorbique, taurine, m-inositol, chlorure de potassium, sulfate ferreux, sulfate de zinc, nicotinamide, L-carnitine, acétate de *dl*-α-tocophéryle, pantothénate de calcium, acide citrique, sulfate de cuivre, chlorhydrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, sulfate de manganèse, palmitate de vitamine A, acide folique, biotine, iodure de potassium, sélénate de sodium, molybdate de sodium, phylloquinone, vitamine D_3, cyanocobalamine.
CONTIENT : Allergènes alimentaires prioritaires : Lait, soya. **Ingrédients associés à des intolérances et (ou) à des sensibilités alimentaires :** Maïs, huile de copra, gluten†, arômes naturel et artificiel, lactose, autres composants du soya.

† Les produits contenant des fibres d'avoine ne peuvent pas être considérés comme étant sans gluten.

Les valeurs sont sujettes à changement. Pour connaître la liste la plus récente des ingrédients, des allergènes et l'information nutritionnelle, consulter l'étiquette ou l'emballage du produit.

PEDIASURE® PLUS
(AVEC FIBRES)
Comme source unique d'alimentation
Pour les enfants de 1 à 10 ans

PEDIASURE COMPLETE®

Supplément alimentaire

Pour les enfants de 1 à 13 ans

INDICATIONS D'EMPLOI

- Peut être utilisé comme collation, supplément aux repas ou, si pris en quantité suffisante, comme substitut de repas.
- Pour les enfants difficiles à l'égard de la nourriture.
- Pour les enfants dont l'alimentation n'est pas assez variée.
- Pour les enfants qui ont besoin d'un supplément nutritionnel en raison d'un manque d'appétit ou d'un apport alimentaire insuffisant.
- Pour l'alimentation par voie orale seulement (non destiné à l'alimentation par sonde).

Mises en garde :

- Non indiqué pour l'alimentation par sonde.
- Non indiqué pour administration par voie parentérale.
- Non indiqué chez les enfants atteints de galactosémie.
- Pour les enfants de moins d'un an, consulter un médecin ou un autre professionnel de la santé avant d'utiliser PediaSure Complete®.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Contient 9.3 g de protéines par portion de 235 mL.
- Renferme 1 g de fructooligosaccharides à chaîne courte (FOScc) par portion de 235 mL. Pour plus de renseignements sur les FOScc, consulter la page 83.
- Contient du DHA (4,3 mg/100 Cal), un acide gras oméga-3, et de l'ARA (1,4 mg/100 Cal), un acide gras oméga-6, qui contribuent au développement normal du cerveau et des yeux.
- Environ 5 % des lipides sont des triglycérides à chaîne moyenne, source de lipides faciles à digérer et bien absorbés[1].
- Procure 26 vitamines et minéraux essentiels.
- Bouteille refermable pratique.
- Trois délicieuses saveurs pour éviter la lassitude gustative et améliorer l'observance du traitement nutritionnel.

DONNÉES TECHNIQUES

	Prêt à servir
Densité calorique (Cal/mL)	1,0
Protéines (% de l'énergie totale)	16
Lipides (% de l'énergie totale)	30
Glucides (% de l'énergie totale)	54
Rapport Cal totales:g d'azote	160:1
Rapport Cal non protéiques:g d'azote	136:1
Eau (g/L)	830
Osmolalité (mOsm/kg d'eau)	600
Charge osmotique rénale (mOsm/L)	350
Viscosité à la température ambiante/lorsque refroidi	Clair/clair
Diamètre minimal de la sonde pour l'alimentation par gravité/pompe (Fr)	S. O.
Hyporésiduel	Oui
Sans gluten	Oui
Cascher	Oui
Halal	Oui

PRÉSENTATION

Prêt à servir

62491-526	PediaSure Complete®, vanille	Bouteilles de 235 mL	4 emballages de 4/carton
62490-526	PediaSure Complete®, chocolat	Bouteilles de 235 mL	4 emballages
62831-526	PediaSure Complete®, fraise	Bouteilles de 235 mL	4 emballages de 4/carton

RÉFÉRENCE :

1. Duggan C, Watkins JB et Walker WA. Nutrition in Pediatrics: Standard and Specialized Enteral Formulas. BC Decker Inc. Hamilton. 2008.

INFORMATION NUTRITIONNELLE

ÉNERGIE

	Par 100 mL	Par 235 mL
ÉNERGIE (Cal [kJ])	100 (419)	235 (984)
PROTÉINES (g)	4,0	9,3
% de l'énergie totale	16	
Arginine (mg)	163	383
Cystine (mg)	37	87
Histidine (mg)	96	226
Isoleucine (mg)	193	454
Leucine (mg)	375	881
Lysine (mg)	293	689
Méthionine (mg)	91	214
Phénylalanine (mg)	187	439
Tryptophane (mg)	50	118
Thréonine (mg)	178	418
Valine (mg)	222	522
Taurine (mg)	-	-
Carnitine (mg)	-	-
Source	Concentré de protéines de lait, isolat de protéines de soya, concentré de protéines de lactosérum	
LIPIDES (g)	3,3	7,7
% de l'énergie totale	30	
Acides gras polyinsaturés (g)	1,7	4
Acide linoléique (g)	1,3	3,0
Acide arachidonique (ARA) (mg)	1,4	3,3
Acide linolénique (g)	0,19	0,45
Acide docosahexanoïque (DHA) (mg)	4,25	10,0
Rapport oméga-6:oméga-3	6,2:1	
Acides gras monoinsaturés (g)	1,0	2,4
Acides gras saturés (g)	0,55	1,29
Cholestérol (mg)	4	9,4
Source	Huile de soya, huile de canola, huile de triglycérides à chaîne moyenne (TCM)	
Huile de TCM (% des lipides totaux)	5	
GLUCIDES (g)	14,0	33,0
% de l'énergie totale	54	
Fibres alimentaires (g)	-	-
Fructooligosaccharides à chaîne courte (FOScc) (g)	0,43	1,0
Galactooligosaccharides (GOS) (g)	-	-
Source	Saccharose, maltodextrine de maïs, FOScc, gélifiant cellulosique	
Acésulfame-potassium (mg)	-	-
Sucralose (mg)	-	-

VITAMINES

Vitamine A (ER [UI])	100 (333)	235 (783)
Vitamine D_3 (mcg [UI])	0,3 (10,2)	0,6 (24)
Vitamine E (UI)	1,0	2,4
Vitamine K_1 (mg)	0,003	0,006
Vitamine C (mg)	5,1	12,0
Thiamine (mg)	0,14	0,33
Riboflavine (mg)	0,18	0,42
Niacine (mg)	3,0	7,1
Vitamine B_6 (mg)	0,18	0,42
Acide folique (mg)	0,030	0,071
Vitamine B_{12} (mg)	0,0001	0,0002
Acide pantothénique (mg)	0,6	1,4
Biotine (mg)	0,012	0,028
Choline (mg)	28	66
Inositol (mg)	-	-

MINÉRAUX

Sodium (mg [mmol])	38 (1,65)	90 (3,91)
Potassium (mg [mmol])	191 (4,90)	450 (11,54)
Chlorure (mg [mmol])	87 (2,45)	204 (5,75)
Calcium (mg)	106	250
Phosphore (mg)	106	250
Magnésium (mg)	23	55
Fer (mg)	1,0	2,4
Zinc (mg)	1,4	3,3
Iodide (mg)	0,015	0,036
Cuivre (mg)	0,15	0,36
Manganèse (mg)	0,5	1,1
Sélénium (mg)	0,004	0,010
Chrome (mg)	0,004	0,010
Molybdène (mg)	0,008	0,019

Information nutritionnelle pour PediaSure Complete®, vanille, bouteille de 235 mL

COMPOSITION

PediaSure Complete®, vanille :
Eau, saccharose, maltodextrine de maïs, concentré de protéines de lait, huile de soya, isolat de protéines de soya, concentré de protéines de lactosérum, fructooligosaccharides (FOS), huile de canola, citrate de potassium, arômes naturel et artificiel, gélifiant cellulosique, phosphate de magnésium, triglycérides à chaîne moyenne (huiles de copra et [ou] de palmiste modifiées), phosphate calcique, chlorure de potassium, phosphate de potassium, carboxyméthylcellulose, chlorure de sodium, chlorure de choline, carraghénine, monoglycérides, lécithine de soya, acide ascorbique, huile de *C. cohnii*, hydroxyde de potassium, huile de **M. alpina*, sulfate de zinc, sulfate ferreux, nicotinamide, acétate de *dl*-α-tocophéryle, sulfate de manganèse, pantothénate de calcium, sulfate de cuivre, palmitate de vitamine A, chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate de chlorure de thiamine, riboflavine, acide folique, biotine, iodure de potassium, molybdate de sodium, chlorure de chrome, sélénate de sodium, vitamine D_3, cyanocobalamine.
* Source d'acide docosahexanoïque (DHA). ** Source d'acide arachidonique (ARA).
CONTIENT : Allergènes alimentaires prioritaires : Lait, soya. **Ingrédients associés à des intolérances et (ou) à des sensibilités alimentaires :** Maïs, huile de copra, arômes naturel et artificiel, lactose, autres composants du soya.

Ingrédient supplémentaire pour la saveur de chocolat : poudre de cacao solubilisée.
Ingrédient supplémentaire pour la saveur de fraise : colorant. **Ingrédients associés à des intolérances et (ou) à des sensibilités alimentaires :** colorant.

Les valeurs sont sujettes à changement. Pour connaître la liste la plus récente des ingrédients, des allergènes et l'information nutritionnelle, consulter l'étiquette ou l'emballage du produit.

PEDIASURE COMPLETE®
Supplément alimentaire
Pour les enfants de 1 à 13 ans

NOTES :

PRODUITS SPÉCIALISÉS

DANS CETTE SECTION

Pedialyte®	96
Pedialyte® (SAH)	98
Polycose®	100
Eau glucosée à 5 % Similac®	102
Eau stérilisée Similac®	103

PRODUITS SPÉCIALISÉS

TABLE POSOLOGIQUE

Cette table indique la dose quotidienne en millilitres de Pedialyte®. La quantité nécessaire dépend du poids de l'enfant (habituellement 100 à 150 mL/kg ou environ 1,5 à 2,5 bâtons glacés/kg). Pedialyte® doit être administré fréquemment, en quantités tolérées. L'apport quotidien total doit être ajusté pour satisfaire les besoins individuels, en fonction de la soif de l'enfant et de la réponse au traitement. Les apports recommandés pour le maintien de l'équilibre électrolytique dépendent des besoins en eau pour les dépenses énergétiques ordinaires[1].

La table posologique ne s'applique pas aux nourrissons âgés de moins d'une semaine. Les enfants de quatre ans et plus peuvent prendre plus de deux litres par jour (32 bâtons glacés ou plus). En cas de fièvre ou de vomissements ou si la diarrhée persiste plus de 24 heures, consulter le médecin de l'enfant.

Poids corporel	**Pedialyte®** (mL/jour) pour le maintien de l'équilibre électrolytique†
3 kg (6,6 lb)	300 - 450
4 kg (8,8 lb)	400 - 600
5 kg (11,0 lb)	500 - 750
6 kg (13,2 lb)	600 - 900
7 kg (15,4 lb)	700 - 1050
8 kg (17,6 lb)	800 - 1200
9 kg (19,8 lb)	900 - 1350
10 kg (22,0 lb)	1000 - 1500
11 kg (24,2 lb)	1100 - 1650
12 kg (26,4 lb)	1200 - 1800
13 kg (28,6 lb)	1300 - 1950
14 kg (30,8 lb)	1400 - 2100
15 kg (33,0 lb)	1500 - 2250
16 kg (35,2 lb)	1600 - 2400
17 kg (37,4 lb)	1700 - 2550
18 kg (39,6 lb)	1800 - 2700
19 kg (41,8 lb)	1900 - 2850
20 kg (44,0 lb)	2000 - 3000

REMARQUE : 4 Bâtons glacés = 250 mL = 1 tasse.

† L'apport en liquides équivaut aux besoins totaux en liquides comblés par une solution buvable pour le maintien de l'équilibre électrolytique, une préparation ou d'autres liquides, mais ne tient pas compte des pertes d'eau continues par les selles. Les pertes hydriques par les selles doivent être compensées par la consommation d'une quantité additionnelle de Pedialyte® égale à la quantité d'eau évacuée par les selles, venant s'ajouter à l'apport en liquides indiqué dans la table posologique pour le maintien de l'équilibre électrolytique. Les produits Pedialyte® doivent être utilisés en association avec d'autres liquides appropriés pour aider à prévenir la déshydratation.

RÉFÉRENCE :

1. Extrapolation d'après Barness LA, Curran JS: Nutrition, dans Nelson WE (dir. principal), Behrman RE, Kliegman RM, Arvin AM (dir): Nelson Textbook of Pediatrics 15e éd. Philadelphia: WB Saunders Co, 1996, pp 141-3.

PEDIALYTE®

Solution buvable pour le maintien de l'équilibre électrolytique

INDICATIONS D'EMPLOI

- Pour les nourrissons et les enfants à risque de déshydratation.
- Pour les nourrissons et les enfants souffrant de diarrhée et (ou) de vomissements.
  - Pour aider à prévenir la déshydratation.
  - Pour aider à combler les pertes d'eau et d'électrolytes dues à la diarrhée et aux vomissements.
  - Pour maintenir l'équilibre hydrique et électrolytique à la suite d'un traitement parentéral.
- Pour l'alimentation par voie orale ou par sonde.

Mises en garde :

- Non indiqué pour administration par voie parentérale.
- Pour les enfants de moins de deux ans, consulter un médecin ou un autre professionnel de la santé qualifié avant d'utiliser Pedialyte®, car les nourrissons et les jeunes enfants sont plus à risque de déshydratation.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Conçu pour prévenir plus efficacement la déshydratation que les boissons ordinaires du commerce.
- Contient du glucose afin de favoriser l'absorption du sodium et de l'eau.
- Mélange équilibré d'électrolytes afin de combler les pertes électrolytiques durant la diarrhée et ainsi aider à prévenir la déshydratation.
- Solution buvable non aromatisée offerte pour les nourrissons.
- Délicieuses saveurs afin de favoriser l'observance du traitement nutritionnel chez les nourrissons plus âgés et les enfants.
- Bouteilles de plastique refermables de 1 000 mL, pour mesurer et verser plus facilement.
- Les Bâtons glacés (62,5 mL de Pedialyte® par enveloppe de plastique) sont offerts en quatre saveurs.
- Prêt à servir – aucun mélange ni dilution nécessaires.

DONNÉES TECHNIQUES

	Prêt à servir Non aromatisé	**Prêt à servir Aromatisé** (incluant les Bâtons glacés)
Densité calorique (Cal/mL)	0,10	0,10
Protéines (% de l'énergie totale)	S. O.	S. O.
Lipides (% de l'énergie totale)	S. O.	S. O.
Glucides (% de l'énergie totale)	100	100
Rapport Cal totales:g d'azote	S. O.	S. O.
Rapport Cal non protéiques:g d'azote	S. O.	S. O.
Eau (g/L)	978	973-975
Osmolalité (mOsm/kg d'eau)	250	270
Charge osmotique rénale (mOsm/L)	100	100
Viscosité à la température ambiante/lorsque refroidi	S. O.	S. O.
Diamètre minimal de la sonde pour l'alimentation par gravité/pompe (Fr)	S. O.	S. O.
Hyporésiduel	Oui	Oui
Sans gluten	Oui	Oui
Cascher	Oui	Oui
Halal	Oui	Pedialyte® à saveur de raisin : Oui Pedialyte® à saveur de fruits et Bâtons glacés (toutes les saveurs) : Non

PRÉSENTATION

Prêt à servir

0E626-803	Pedialyte® non aromatisé	Bouteilles de plastique refermables de 1 000 mL	8/carton
54676-803	Pedialyte® à saveur de raisin	Bouteilles de plastique refermables de 1 000 mL	8/carton
00365-803	Pedialyte® à saveur de fruits	Bouteilles de plastique refermables de 1 000 mL	8/carton
00245-189	Bâtons glacés Pedialyte® (saveurs variées†)	16 enveloppes de 62,5 mL	8/carton

†† Raisin, cerise, orange et framboise bleue.

INFORMATION NUTRITIONNELLE

ÉNERGIE

	Bâton glacé de 62,5 mL	Par 100 mL	Par 1000 mL
ÉNERGIE (Cal [kJ])	6,3 (26,4)	10 (42)	100 (420)
GLUCIDES (g)	1,6	2,5	25
% de l'énergie totale	100	100	100
Source	Dextrose	Dextrose	Dextrose

ÉLECTROLYTES

Sodium (mg [mmol])	64,8 (2,8)	103,65 (4,5)	1036,5 (45)
Potassium (mg [mmol])	48,8 (1,3)	78,0 (2,0)	780 (20)
Chlorure (mg [mmol])	77,8 (2,2)	124,35 (3,5)	1243,5 (35)
Citrate (mg [mmol])	118,1 (0,6)	189,0 (1,0)	1890 (10)

AROMATISÉ SEULEMENT

Acésulfame-potassium (mg)	9,4	8,5	850
Sucralose (mg)	12,5	40	400

Information nutritionnelle pour Pedialyte®, 1 000 mL et Bâton glacé Pedialyte® de 62,5 mL

COMPOSITION

Pedialyte® non aromatisé :
INGRÉDIENTS MÉDICINAUX : Sodium (chlorure de sodium, citrate de sodium), potassium (citrate de potassium), chlorure (chlorure de sodium). **INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX :** Eau, dextrose, acide citrique.
CONTIENT : Ingrédients associés à des intolérances et (ou) à des sensibilités alimentaires : Acide citrique.

Pedialyte® à saveur de raisin :
INGRÉDIENTS MÉDICINAUX : Sodium (chlorure de sodium, citrate de sodium), potassium (citrate de potassium), chlorure (chlorure de sodium). **INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX :** Eau, dextrose, acide citrique, arôme artificiel de raisin, sucralose, acésulfame potassique, AD&C rouge nº 40 et AD&C bleu nº 1.
CONTIENT : Ingrédients associés à des intolérances et (ou) à des sensibilités alimentaires : Acide citrique, colorants, arômes naturel et artificiel.

Pedialyte® à saveur de fruits :
INGRÉDIENTS MÉDICINAUX : Sodium (chlorure de sodium, citrate de sodium), potassium (citrate de potassium), chlorure (chlorure de sodium). **INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX :** Eau, dextrose, acide citrique, arômes naturel et artificiel de fruits, sucralose, acésulfame potassique, AD&C jaune nº 6.
CONTIENT : Ingrédients associés à des intolérances et (ou) à des sensibilités alimentaires : Acide citrique, colorants, arômes naturel et artificiel.

Bâtons glacés Pedialyte® (raisin, cerise, orange et framboise bleue) :
INGRÉDIENTS MÉDICINAUX : Sodium (chlorure de sodium, citrate de sodium), Potassium (citrate de potassium), Chlorure (chlorure de sodium). **INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX :** Eau, dextrose, acide citrique, carboxyméthylcellulose sodique, sorbate de potassium, benzoate de sodium, sucralose et acésulfame potassique.
CONTIENT : Ingrédients associés à des intolérances et (ou) à des sensibilités alimentaires : Acide citrique, colorants, arômes naturel et artificiel.

La saveur de raisin contient également : Arômes de raisin naturel et artificiel, AD&C rouge nº 40 et AD&C bleu nº 1.

La saveur de cerise contient également : Arômes de cerise naturel et artificiel et AD&C rouge nº 40.

La saveur d'orange contient également : Arômes d'orange naturel et artificiel, AD&C jaune no 6 et AD&C rouge nº 40.

La saveur de framboise bleue contient également : Arômes de framboise bleue naturel et artificiel et AD&C bleu nº 1.

Les valeurs sont sujettes à changement. Pour connaître la liste la plus récente des ingrédients, des allergènes et l'information nutritionnelle, consulter l'étiquette ou l'emballage du produit.

PEDIALYTE®
Solution buvable pour le maintien de l'équilibre électrolytique

PEDIALYTE®

Solution buvable pour le maintien de l'équilibre électrolytique

INDICATIONS D'EMPLOI

- Pour les nourrissons et les enfants à risque de déshydratation.
- Pour les nourrissons et les enfants souffrant de diarrhée et (ou) de vomissements.
  - Pour aider à prévenir la déshydratation.
  - Pour aider à combler les pertes d'eau et d'électrolytes dues à la diarrhée et aux vomissements.
  - Pour maintenir l'équilibre hydrique et électrolytique à la suite d'un traitement parentéral.
- Pour l'alimentation par voie orale ou par sonde.

Mises en garde :

- Non indiqué pour administration par voie parentérale.
- Pour les enfants de moins de deux ans, consulter un médecin ou un autre professionnel de la santé qualifié avant d'utiliser Pedialyte®, car les nourrissons et les jeunes enfants sont plus à risque de déshydratation.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Conçu pour prévenir plus efficacement la déshydratation que les boissons ordinaires du commerce.
- Contient du glucose afin de favoriser l'absorption du sodium et de l'eau.
- Mélange équilibré d'électrolytes afin de combler les pertes électrolytiques durant la diarrhée et ainsi aider à prévenir la déshydratation.
- Solution buvable non aromatisée offerte pour les nourrissons.
- Délicieuses saveurs afin de favoriser l'observance du traitement nutritionnel chez les nourrissons plus âgés et les enfants.
- Bouteilles de plastique refermables de 1 000 mL, pour mesurer et verser plus facilement.
- Prêt à servir – aucun mélange ni dilution nécessaires.

DONNÉES TECHNIQUES

	Prêt à servir Non aromatisé
Densité calorique (Cal/mL)	0,10
Protéines (% de l'énergie totale)	0
Lipides (% de l'énergie totale)	0
Glucides (% de l'énergie totale)	100
Rapport Cal totales:g d'azote	S. O.
Rapport Cal non protéiques:g d'azote	S. O.
Eau (g/L)	978
Osmolalité (mOsm/kg d'eau)	250
Charge osmotique rénale (mOsm/L)	100
Viscosité à la température ambiante/lorsque refroidi	S. O.
Diamètre minimal de la sonde pour l'alimentation par gravité/pompe (Fr)	S. O.
Hyporésiduel	Oui
Sans gluten	Oui
Cascher	Oui
Halal	Oui

PRÉSENTATION

Prêt à servir

50851-871	Pedialyte® non aromatisé	Bouteilles de plastique de 59 mL	48/carton

INFORMATION NUTRITIONNELLE

ÉNERGIE

	Par 59 mL	Par 100 mL
ÉNERGIE (Cal [kJ])	5,9 (24,7)	10 (42)
GLUCIDES (g)	1,5	2,5
% de l'énergie totale	100	100
Source	Dextrose	Dextrose

ELECTROLYTES

Sodium (mg [mmol])	61,2	103,65 (4,5)
Potassium (mg [mmol])	46,0 (1,2)	78,0 (2,0)
Chlorure (mg [mmol])	73,4 (2,1)	124,35 (3,5)
Citrate (mg [mmol])	111,5 (0,6)	189,0 (1,0)

COMPOSITION

Pedialyte® non aromatisé :
INGRÉDIENTS MÉDICINAUX: Sodium (chlorure de sodium, citrate de sodium), potassium (citrate de potassium), chlorure (chlorure de sodium). **INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX:** Eau, dextrose, acide citrique.
CONTIENT : Ingrédients associés à des intolérances et (ou) à des sensibilités alimentaires : Acide citrique.

Les valeurs sont sujettes à changement. Pour connaître la liste la plus récente des ingrédients, des allergènes et l'information nutritionnelle, consulter l'étiquette ou l'emballage du produit.

PEDIALYTE®
Solution buvable pour le maintien de l'équilibre électrolytique

POLYCOSE®

Préparation modulaire

Polymères du glucose

INDICATIONS D'EMPLOI

- Pour les nourrissons qui ont besoin d'un apport supplémentaire en calories provenant des glucides dans des régimes à faible teneur en protéines, en électrolytes ou en lipides.
- Lorsqu'une affection ou une intervention chirurgicale empêche un apport suffisant de calories provenant d'une alimentation normale.
- Lorsque le volume gastro-intestinal doit être limité.
- Peut être pris comme supplément glucidique entéral.
- Pour l'alimentation par voie orale ou par sonde.

Mises en garde :

- Non indiqué pour administration par voie parentérale.
- À utiliser sous supervision médicale.
- Non indiqué comme source unique d'alimentation, sauf sur les directives d'un médecin, car Polycose® ne contient ni protéines, ni lipides, ni vitamines et que de très faibles quantités de minéraux.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Faible charge osmotique rénale (7,1 mOsm/L).
- Longs polymères de glucose pour aider à diminuer l'osmolalité et ainsi minimiser le risque de diarrhée osmotique.
- Se mélange bien à la plupart des aliments et des boissons.
- Très peu sucré pour favoriser l'acceptabilité du produit.
- Absorption rapide (réponse glycémique maximale 30 minutes après l'administration).

DONNÉES TECHNIQUES

	Poudre
Densité calorique (Cal/g)	3,8
Protéines (% de l'énergie totale)	0
Lipides (% de l'énergie totale)	0
Glucides (% de l'énergie totale)	100
Rapport Cal totales:g d'azote	S. O.
Rapport Cal non protéiques:g d'azote	S. O.
Eau (g/L)	S. O.
Osmolalité (mOsm/kg d'eau)	S. O.
Charge osmotique rénale (mOsm/L)	7,1
Viscosité à la température ambiante/lorsque refroidi	S. O.
Diamètre minimal de la sonde pour l'alimentation par gravité/ pompe (Fr)	8/5
Hyporésiduel	Oui
Sans gluten	Oui
Cascher	Oui
Halal	Oui

PRÉSENTATION

Poudre

00746-336	Polycose® non aromatisé	Boîtes de 350 g	6/carton

PRÉPARATION

Pour mélanger à des liquides : Pour de meilleurs résultats, verser la quantité désirée d'eau ou de boisson dans un contenant suffisamment grand, puis ajouter Polycose® et le mélanger avec une cuiller.

Pour mélanger à de la nourriture : On peut mélanger Polycose® directement à la nourriture, comme des pommes de terre en purée, du gruau, de la sauce ou de la soupe.

Équivalences énergétiques approximatives

	Cal	kJ
1 c. à thé rase (2 g)	8	34
1 c. à soupe rase (6 g)	23	96
1/4 tasse (25 g)	95	398
1/3 tasse (33 g)	125	523
1/2 tasse (50 g)	190	795
1 tasse (100 g)	380	1590

INFORMATION NUTRITIONNELLE

ÉNERGIE

	Par 100 g
ÉNERGIE (Cal [kJ])	380 (1590)
PROTÉINES (g)	0
% de l'énergie totale	0
Arginine (mg)	0
Cystine (mg)	0
Histidine (mg)	0
Isoleucine (mg)	0
Leucine (mg)	0
Lysine (mg)	0
Méthionine (mg)	0
Phénylalanine (mg)	0
Tryptophane (mg)	0
Thréonine (mg)	0
Valine (mg)	0
Taurine (mg)	0
Carnitine (mg)	0
Source	S. O.
LIPIDES (g)	0
% de l'énergie totale	0
Acides gras polyinsaturés (g)	0
Acide linoléique (g)	0
Acide arachidonique (ARA) (g)	0
Acide linolénique (g)	0
Acide docosahexanoïque (DHA) (g)	0
Rapport oméga-6:oméga-3	S. O.
Acides gras monoinsaturés (g)	0
Acides gras saturés (g)	0
Cholestérol (mg)	0
Source	S. O.
Huile de TCM (% des lipides totaux)	0
GLUCIDES (g)	94
% de l'énergie totale	100
Fibres alimentaires (g)	0
Fructooligosaccharides à chaîne courte (FOScc) (g)	0
Galactooligosaccharides (GOS) (g)	0
Source	Polymères du glucose obtenus par hydrolyse contrôlée de l'amidon de maïs
Acésulfame-potassium (mg)	0
Sucralose (mg)	0

VITAMINES

Vitamine A (ER [UI])	0 (0)
Vitamine D_3 (mcg [UI])	0 (0)
Vitamine E (UI)	0 (0)
Vitamine K_1 (mg)	0
Vitamine C (mg)	0
Thiamine (mg)	0
Riboflavine (mg)	0
Niacine (mg)	0
Vitamine B_6 (mg)	0
Acide folique (mg)	0
Vitamine B_{12} (mg)	0
Acide pantothénique (mg)	0
Biotine (mg)	0
Choline (mg)	0
Inositol (mg)	-

MINÉRAUX

Sodium (mg [mmol])	130† (5,7)
Potassium (mg [mmol])	10† (0,3)
Chlorure (mg [mmol])	223† (6,3)
Calcium (mg)	30† (0,75)
Phosphore (mg)	15† (0,49)
Magnésium (mg)	0
Fer (mg)	0,095
Zinc (mg)	0
Iode (mg)	0
Cuivre (mg)	0
Manganèse (mg)	0
Sélénium (mg)	0
Chrome (mg)	0
Molybdène (mg)	0

† Au plus.

COMPOSITION

Polycose®, poudre :
Polymères du glucose obtenus par hydrolyse contrôlée de l'amidon de maïs.
CONTIENT : Ingrédients associés à des intolérances et (ou) à des sensibilités alimentaires : Maïs.

Les valeurs sont sujettes à changement. Pour connaître la liste la plus récente des ingrédients, des allergènes et l'information nutritionnelle, consulter l'étiquette ou l'emballage du produit.

POLYCOSE®
Préparation modulaire
Polymères du glucose

EAU GLUCOSÉE À 5 %
SIMILAC®

INDICATIONS D'EMPLOI

- Pour l'alimentation initiale ou comme supplément.
- Pour l'alimentation par voie orale seulement (non destiné à l'alimentation par sonde).

Mise en garde :

- À utiliser sous supervision médicale.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Prêt à servir – aucun mélange ni dilution nécessaires.

DONNÉES TECHNIQUES

	Bouteille
Densité calorique (Cal/mL)	0,2
Protéines (% de l'énergie totale)	0
Lipides (% de l'énergie totale)	0
Glucides (% de l'énergie totale)	100
Rapport Cal totales:g d'azote	S. O.
Rapport Cal non protéiques:g d'azote	S. O.
Eau (%)	96,6
Osmolalité (mOsm/kg d'eau)	S. O.
Charge osmotique rénale (mOsm/L)	S. O.
Viscosité à la température ambiante/lorsque refroidi	S. O.
Diamètre minimal de la sonde pour l'alimentation par gravité/pompe (Fr)	S. O.
Hyporésiduel	Oui
Sans gluten	Oui
Cascher	Oui
Halal	Oui

PRÉSENTATION

Prêt à servir

51002-871	Eau glucosée à 5 % Similac®	Bouteilles de plastique de 59 mL	48/carton

ÉNERGIE

	Par 100 mL	**Par 100 Cal**	**Par 1000 mL**	**Par 120 mL**
ÉNERGIE (Cal [kJ])	20 (85)	100 (418)	200 (837)	24 (100)
GLUCIDES (g)	5	25	50	6
% de l'énergie totale		100		
Source		Dextrose		

COMPOSITION

Eau glucosée à 5 % Similac®, prêt à servir :
Eau et glucose.

Les valeurs sont sujettes à changement. Pour connaître la liste la plus récente des ingrédients, des allergènes et l'information nutritionnelle, consulter l'étiquette ou l'emballage du produit.

EAU STÉRILISÉE SIMILAC®

INDICATIONS D'EMPLOI

- Pour l'alimentation initiale ou comme supplément.
- Pour l'alimentation par voie orale seulement (non destiné à l'alimentation par sonde).

Mise en garde :

- À utiliser sous supervision médicale.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Prêt à servir – aucun mélange ni dilution nécessaires.

DONNÉES TECHNIQUES

	Biberon
Densité calorique (Cal/mL)	S. O.
Protéines (% de l'énergie totale)	S. O.
Lipides (% de l'énergie totale)	S. O.
Glucides (% de l'énergie totale)	S. O.
Rapport Cal totales:g d'azote	S. O.
Rapport Cal non protéiques:g d'azote	S. O.
Eau (%)	100
Osmolalité (mOsm/kg d'eau)	S. O.
Charge osmotique rénale (mOsm/L)	S. O.
Viscosité à la température ambiante/lorsque refroidi	S. O.
Diamètre minimal de la sonde pour l'alimentation par gravité/pompe (Fr)	S. O.
Hyporésiduel	Oui
Sans gluten	Oui
Cascher	Oui
Halal	Oui

PRÉSENTATION

Prêt à servir

51000-871	Eau stérilisée Similac®	Bouteilles de plastique de 59 mL	48/carton

Les valeurs sont sujettes à changement. Pour connaître la liste la plus récente des ingrédients, des allergènes et l'information nutritionnelle, consulter l'étiquette ou l'emballage du produit.

NOTES :

ACCESSOIRES

DANS CETTE SECTION

Tétines	107
Biberon et bouchon de plastique Volu-Feed®	108
Biberon et bouchon distributeur	109

ACCESSOIRES

TÉTINES

Les tétines **Similac®** sont conçues pour être utilisées avec tous les biberons d'Abbott Nutrition, notamment :

- Bouteilles de 120 mL et de 59 mL du système d'alimentation pour hôpitaux.
- Biberon de plastique de 240 mL.
- Biberon Volu-Feed®.

Tétine et bague pour nourrissons Similac® Infant
N° 00079-125 (250/carton)

Description	Composition du produit	Sans latex
Tétine conçue pour les nourrissons nés à terme et autres nourrissons dont la force de tétée est développée.	Tétine : polyisoprène Bague : polyéthylène	Oui

Tétine orthodontiques et bague Similac® Orthodontic
N° 50512-125 (250/carton)

Description	Composition du produit	Sans latex
Tétine conçue pour les nouveau-nés (nourrissons nés à terme et prématurés). Ouverture faisant face au palais du nourrisson et concept orthodontique pour stimuler les exercices oraux pendant la tétée.	Tétine : latex de caoutchouc naturel Bague : polyéthylène	Non

Tétine pour prématurés et bague Similac® Premature
N° 00094-125 (250/carton)

Description	Composition du produit	Sans latex
Tétine conçue spécialement pour les nourrissons prématurés dont la force de tétée est moins développée. L'épaisseur réduite de la paroi de la tétine rend cette dernière plus souple et facile à téter.	Tétine : polyisoprène Bague : polyéthylène	Oui

Tétine à débit lent et bague Similac® Slow Flow
N° 53894-125 (250/carton)

Description	Composition du produit	Sans latex
Tétine conçue pour aider la coordination insuffisamment développée des mouvements de succion-déglutition-respiration chez les nourrissons prématurés ou de faible poids à la naissance. Permettent un débit mieux contrôlable par le nourrisson, comparativement aux tétines à débit plus rapide, pour une stabilité physiologique accrue et des mouvements de tétée plus efficaces[1].	Tétine : polyisoprène Bague : polyéthylène	Oui

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Faciles à utiliser.
- Toute la latitude voulue pour choisir une tétine qui correspond à la force de tétée ou aux besoins de chaque nourrisson.
- Tétines et bagues emballées séparément et prêtes à utiliser.
- Tétines et bagues forment un joint d'étanchéité pour éviter les fuites durant la tétée.
- Jetables – non réutilisables.

MISES EN GARDE

- NE PAS utiliser comme suce, car le bébé risquerait de s'étouffer.
- NE PAS réutiliser, car le caoutchouc pourrait se détériorer ou se désagréger et le bébé risquerait de s'étouffer.
- Garder hors de la portée des enfants.

RÉFÉRENCE : 1. Chang YJ *et al.* Effects of Single-Hole and Cross-Cut Nipple Units on Feeding Efficiency and Physiological Parameters in Premature Infants. *J Nurs Res* 2007;150(3):215-23.

BIBERON ET BOUCHON DE PLASTIQUE

Biberon de plastique
N° 00875-114 (144/carton)

Description	Composition du produit	Sans latex
Volume : 240 mL. Conçu pour être utilisé comme biberon.	Polypropylène	Oui

COMPATIBLE AVEC

- Toutes les tétines Similac®.
- Bouchon de plastique pour biberons.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Prêt à utiliser.
- Qualité alimentaire.
- Incassable; sécuritaire pour les pouponnières.
- Lavable au lave-vaisselle (panier du haut).
- Jetable.

Bouchon de plastique
N° 54080-125 (250/carton)

Description	Composition du produit	Sans latex
Grandeur standard finie de 40 mm.	Polypropylène	Oui

COMPATIBLE AVEC

- Bouteilles de 120 mL et de 59 mL du système d'alimentation pour hôpitaux.
- Biberon de plastique de 240 mL.
- Biberon Volu-Feed®.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Qualité alimentaire.
- Lavable au lave-vaisselle (panier du haut).
- Avant d'utiliser, le faire bouillir dans l'eau pendant une minute ou le mettre au lave-vaisselle dans le panier du haut.

VOLU-FEED®

Système d'alimentation volumétrique d'Abbott Nutrition

Biberon Volu-Feed®
N° 00180-099 (100/carton)

Description	Composition du produit	Sans latex
Volume : 60 mL. Lorsqu'on doit mesurer avec précision la quantité de lait maternel ou de préparation, surtout chez les prématurés et les nourrissons de faible poids à la naissance.	Polypropylène	Oui

COMPATIBLE AVEC

- Toutes les tétines Similac®.
- Bouchon de plastique.
- Bouchon distributeur Volu-Feed® (pour l'alimentation par sonde).

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Facilite l'alimentation des nourrissons qui se trouvent en incubateur.
- Jetable.
- **Lecture plus facile**
  - Mesure précise de la quantité de préparation.
  - Capacité de 60 mL avec graduations de 1 mL en partant du haut vers le bas.
  - Chiffres pairs d'un côté et chiffres impairs de l'autre.
  - Chiffres placés vis-à-vis le centre des traits de graduation.
  - Caractères plus gros et plus faciles à lire.
- **Écriture plus facile**
  - Espace réservé à l'écriture doublé.
- **Plastique plus léger**
  - Économies de 22 680 kg (50,000 lb) de plastique par année (12,5 % moins de plastique par biberon).
- **Prêt à utiliser**
  - Emballé individuellement dans une pellicule scellée pelable.
  - Prêt à recevoir la tétine.

Bouchon distributeur Volu-Feed®
N° 00081-125 (250/carton)

Description	Composition du produit	Sans latex
Pour maintenir la sonde de gavage en place dans le biberon Volu-Feed®.	Polypropylène	Oui

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Usage unique.
- Prêt à utiliser – emballé individuellement dans une pellicule scellée pelable.
- Jetable.

COMPATIBLE AVEC

- Biberon Volu-Feed®.

NOTES :

SYSTÈME D'ALIMENTATION ENTÉRALE

DANS CETTE SECTION

Dispositifs pour l'alimentation par gravité	113
Pompes et dispositifs pour l'alimentation	114
Contenants pour l'alimentation entérale	116
Sondes pour l'alimentation entérale et raccords Flexiflo®	117

SYSTÈME D'ALIMENTATION ENTÉRALE

SYSTÈME D'ALIMENTATION ENTÉRALE

Dispositifs pour l'alimentation par gravité

DISPOSITIFS POUR L'ALIMENTATION PAR GRAVITÉ

SYSTÈME OUVERT

Option 1	Sac Easy-Feed (1 000 mL) pour l'alimentation entérale avec dispositif monté pour l'alimentation par gravité	N° 00056A30
Option 2	Sac Top-Fill (1 000 mL) et fiche perforante pour l'alimentation par gravité	N° 00090024 N° 00059024
Option 3	Dispositif d'alimentation par gravité avec capsule à vis et contenant Flexitainer de 1 000 mL ou contenant Flexitainer de 500 mL	N° 0F533030 N° 0M240030 N° 0M241030

SYSTÈME FERMÉ†

Option 1	Dispositif d'alimentation par gravité avec fiche perforante	N° 00059024
Option 2	Dispositif d'alimentation par gravité avec capsule à vis	N° 0F533030

N° 00059024

N° 0F533030

N° 00056A30 (1 000 mL)

† À utiliser avec une préparation prête à suspendre d'Abbott Nutrition.

SYSTÈME D'ALIMENTATION ENTÉRALE

Pompes et dispositifs pour l'alimentation

DISPOSITIFS D'ALIMENTATION POUR LA POMPE COMPANION[MC] CLEARSTAR[MC]

POMPE COMPANION[MC] CLEARSTAR[MC] POUR L'ALIMENTATION ENTÉRALE

N° M771-001

SYSTÈME OUVERT

Option 1	Sac (500 mL) avec dispositif monté pour le patient ambulatoire et étui de la pompe pour le patient ambulatoire	N° 00507N30 N° 00504001
Option 2	Sac Top-Fill (1 000 mL) avec dispositif d'alimentation monté	N° 00071030
Option 3	Dispositif d'alimentation avec capsule à vis et contenant Flexitainer de 1 000 mL ou contenant Flexitainer de 500 mL	N° 00086030 N° 0M240030 N° 0M241030
Option 4	Dispositif d'alimentation avec fiche perforante et sac Top-Fill (1 000 mL)	N° 00088030 N° 00090024

SYSTÈME FERMÉ†

Option 1	Dispositif d'alimentation avec fiche perforante	N° 00088030
Option 2	Dispositif d'alimentation avec capsule à vis	N° 00086030

N° 00507N30

N° 00088030

N° 00071030

N° 00086030

N° 00504001

† À utiliser avec une préparation prête à suspendre d'Abbott Nutrition. **Suite à la page suivante**

DISPOSITIFS D'ALIMENTATION POUR LA POMPE PATROL®

POMPE POUR L'ALIMENTATION ENTÉRALE PATROL®

N° 52034-001

SYSTÈME OUVERT

Option 1	Sac Top-Fill (1 000 mL) avec dispositif d'alimentation monté	N° 0M224030
Option 2	Sac Top-Fill (1 000 mL) et dispositif d'alimentation avec fiche perforante	N° 00090024 N° 0M306030
Option 3	Dispositif d'alimentation avec capsule à vis et contenant Flexitainer 1 000 mL ou contenant Flexitainer 500 mL	N° 0M221030 N° 0M240030 N° 0M241030

SYSTÈME FERMÉ†

Option 1	Dispositif d'alimentation avec fiche perforante	N° 0M306030
Option 2	Dispositif d'alimentation avec capsule à vis	N° 0M221030

N° 0M224030 (1 000 mL)

N° 0M306030

N° 0M221030

† À utiliser avec une préparation prête à suspendre d'Abbott Nutrition.

SYSTÈME D'ALIMENTATION ENTÉRALE

Contenants pour l'alimentation entérale

SAC TOP-FILL POUR L'ALIMENTATION ENTÉRALE

N° 00090024 (1 000 mL)

CONTENANTS FLEXITAINER® POUR L'ALIMENTATION ENTÉRALE

N° 0M241030 (500 mL)

N° 0M240030 (1 000 mL)

SYSTÈME D'ALIMENTATION ENTÉRALE

Sondes pour l'alimentation entérale et raccords Flexiflo®

SONDES POUR L'ALIMENTATION ENTÉRALE AVEC EMBOUTS-RACCORDS EN Y FLEXIFLO®

DIAMÈTRE 8 FRENCH

N° 00471010
92 cm (36 po)
de long, stylet et bolus
préassemblés

N° 00473010
115 cm (45 po)
de long, stylet et bolus
préassemblés

DIAMÈTRE 10 FRENCH

N° 00476010
115 cm (45 po)
de long, stylet et bolus
préassemblés

DIAMÈTRE 12 FRENCH

N° 00474010
92 cm (36 po)
de long

N° 00475010
115 cm (45 po)
de long, stylet et bolus
préassemblés

EMBOUTS-RACCORDS FLEXIFLO® EN Y

EMBOUT-RACCORD FLEXIFLO® EN Y DE DIAMÈTRE 14 FRENCH OU 16 FRENCH

À utiliser avec une sonde pour gastrostomie de diamètre 14 French ou 16 French. Couleur : jaune.

N° 00835010

EMBOUT-RACCORD FLEXIFLO® EN Y DE DIAMÈTRE 18 FRENCH OU 20 FRENCH

À utiliser avec une sonde pour gastrostomie de diamètre 18 French ou 20 French. Couleur : orange.

N° 00836010

NOTES :

www.AbbottNutrition.ca
1 - 8 6 6 - 7 6 7 - 7 4 1 1

© Laboratoires Abbott, Limitée
00321 - ANI2012-11-13

Abbott Nutrition